

Coracias garrulus L.

- 28-VII-43 - Me traen vivo el 1º que veo ¿de Palencia?
- 10- V-47 - La Fraila. Vemos el 1º del año. Ese mismo día en Monte la Reina vió ^{hubo} un par de ellos.
- 18- V-47 - A orillas del Adaja. Parece haber un nido en un chopo seco, inclinado hacia el agua. No logramos descubrirle. Por la orilla se vieron varias parejas.
- 3-VII-47 - Boecillo. Varios posados en los cables. Prefieren los lugares despejados y llanos, cerca de pinares o arbolado, a orillas de los rios y en el páramo, especialmente. Vistos en Villanueva de Duero, Tudela, La Parrilla, Puente Duero, Montemayor, Boecillo Herrera de Duero, etc. No creemos aniden en La Fraila.
- 15-V-48 - Puente Duero. Me dice Blanco que ya hace días que les ha visto.
- 19-VII-48 - Monte de la Reina, Zamora. Aún les hay.
- 9-VIII-48 - Me tren un ♂ en plena muda, con plumas más verdosas en el pecho y oscuras en el dorso. Hacía el día 10 les vió Luis en el Boecillo, en los cables. El día 20, no encontró ninguno Oller. Agosto.
- 28-VI-49 - Toro (Zamora), a orillas del Duero, en chopo seco en nido de Picus de 3 ms. de altura, crias.
- 8-IV-50 - El Pinarillo (Vemos el primero del año).
- 22-IV-50 - Cerca del Adaja, junto al puente uno.
- 23-IV-50 - Volviendo de La Fraila, por Pedraja, Boecillo, solo vemos uno en los cables, cerca del último pueblo, Luis le ha visto allí común.
- 2-V-50 - El Pinarillo. Una pareja y otro suelto, en el árbol en que anidan.
- 6-VII-50 - Medina del Campo. En un chopo junto a la carretera, un nido, en piquera, 3'50 ms. de altura. Parte seca, algún chopo y olmo entre dos pinares.
- 11-VIII-50- Uno en el camino viejo de Simanchas. Por ahora no hay paso en La Fraila, sino dispersión.
- 17-VIII-50- Todavía no se ven bandos en paso, Ya hay dispersión.
- 22-IV-51 - Ya hay bastantes en el Pinarillo.
- 12-V-51 - Tordesillas. Me trean un ♂, óvulos desarrollados. Desde por lo menos el día 8, hay una pareja establecida en La Flecha. (hoy 17). Parece ser que en conjunto que abundan en la zona baja S. W. llegando escasos a los alrededores de Valladolid, son comunes en Toro, Medina del Campo, Boecillo, Tordesillas.

Coracias garrulus

21-22-VIII-51- Valladolid - Simancas.

Observados solo de pasada.

Habitat:

En los grupos de viejos álamos, elevados y un poco claros, sobre todo en bosquecillos de soto bosque poco denso. Puede decirse que no hay grupo de estos árboles sin al menos una pareja, ni azulejos sin álamos.

Vi dos nidos ciertos, ambos en piqueras, alturas 6-8 m. y ambos en la misma orilla, otro probable en álamo también, a unos 4 m. y distante 20 del río. Las perchas de espera y vigilancia son ramas secas o bastante peladas, a alturas de 10 m. líneas de tendido, etc.

Hasta la parte en que termina el arbolado denso y desde la Flecha, había las siguientes parejas.

- 1 - la del nido dibujado, exterminada hace un mes.
- 2 - la ya conocida, a unos 100 m. más allá. Nido conocido. Estos pájaros cazan sobre todo en la misma orilla del río, sobre la finca de Sta. Ana, desde los cables y a unos 500 m. del nido.
- 3 - En el primer gran bosquecillo de álamos, y en unos 100 m. de soto, a 1 km. largo de los anteriores, hay dos o tres parejas. Una al menos con juvs. volanderos.

Este bosquecillo es el más cerrado a trozos, con un claro posterior. Anida allí un Dryobates que reclamaba muy asustado y cebaba Pica a un Clamator completamente desarrollado. El cazadero en ambas riberas es extenso, los puestos, un chopo que se inclina sobre el agua, otro más bajo y la copa de dos solitarios de la orilla frontera.

- 4 - Una pareja al menos casi enfrente de Arroyo a ¿1 km.? de los dos anteriores.
- 5 - En unos grandes álamos dispersos, orilla izquierda del río (las anteriores a la derecha), a lo largo de los cuales corre un tendido, hay quizá 3 parejas. Hacia el pueblo se extiende la alameda dispersa, excelente habitat. Pasan en ambas orillas, deben cazar en aquella. Posaderos, los cables y ramas a veces. Un nido en el primer cogollo de las ramas de un álamo.
- 6 - Otra pareja en unos álamos grandes de la orilla derecha, pasadas las cuevas de la ribera izquierda.

En total una densidad de población de 8-10 parejas al menos en unos km. de soto.

No ocurre esto río arriba, aunque no faltan álamos. ¡Si faltan pinares próximos!

¿Es posible que al ver una gran selva, aunque poco propicia, les induzca a establecerse en sus proximidades? Sus cazaderos son siempre tierras rasas con buenos observatorios.

Coracias garrulus

21-22-VII-51- Valladolid- Simancas.

Ecología:

A uno le perseguía ardentemente un ♂ de Oriolus, siguiéndole en sus evoluciones por el bosquecillo. Este Oriolus anidaba allí mismo. Puede suponerse por tanto que las persecuciones hayan sido continuas durante el verano. En otro punto, idéntica persecución, menos ruidosa y más corta.

Los padres chillaban dando pasadas sobre nuestras cabezas al aproximarnos. Se oye a menudo su carragueo, corto y gritos variados. Se aproximan mucho ahora, temerosos por los polluelos. Cuando matamos uno que se arrancó, un padre le acompañó en su vuelo y dió una pasada al cadáver flotante.

Cria:

Una pareja con pollos que volaban bien, se cobro uno, los pollos gritan de forma extraña. Estaban posados en los chopos y álamos, a bastante altura. Fué de 11 a 2'30 h. Al menos otra pareja debía tener juv. dispersos, en el resto seguía la ceba en nido. Una ♀ con

Alimentación: Examinados 2 estómagos.

♀ Cobrada, que llevaba cebo a juv. volanderos.

Cont. est. -

- Restos de 8 acrididos, género Tettingia, probable la especie T. que es la más común de las cigarras aquí. El recuento ha sido hecho por los ojos y rostros que se conservan bien. Había una casi entera y dos cabezas nuevas, por cuyos restos se hizo la determinación (Amigo). Además otro insecto del que quedaba una como pinza de cangrejo de esta long.

Juv. volando en ceba, hijo de la anterior.

Cont. est. -

- 2 Cicadidos, probablemente la misma especie que la anterior, es decir Tettingia. Al menos los ojos son indiferenciables.

Estado plumaje:

En la ♀, perfecto aunque bastante gastado. Ha perdido los colores vivos que tenían en Junio.

En el juv. Cola corta, todas las remiges con cañones; igual ocurre con las plúmas de las espaldillas, más desarrollados, casi sin vestigios de ellas, las coberteras ya bien.

Colorido:

Igual que en el ad. pero más pálido excepto en el añil profundo de las alas; las rectrices están bastante estropeadas del roce en el nido, las centrales del color verde azulado sucio, las otras uniformemente azul pálido que se desvanece hacia las exteriores ligeramente. Patas color de carne y no amarillas. El azul añil del patagio poco acentuado y casi vestigios en el obispillo. En conjunto parecen más grises y no tienen en el campo los reflejos azulados de los padres. Parecían como en estos.

Coracias garrulus L.

- 30-V-51 - La Flecha. Vemos uno.
- 15-VII-51- " " Una pareja en la finca de Barbara, nido en álamo, sobre el rio, piquera Picus 4-5 ms. de altura, a 1 m. otro -- Passer montanus. pareja, unos 500 ms. frecuentan cables, pasan el rio continuamente, tienen distrito claramente delimitado e itinerario.
Otra pareja, nido a 150 m. anterior, probablemente piquera en álamo 6-8 ms.
Carrasquean bastante. Ver notas sueltas.
- 23-VIII-51- Yo no les vi por Simancas (Puente-confluencia) por lo que creo han abandonado lugares de cria. En La Fraila.
- VIII-51- La Fraila. Allí no deben anidar. Se las vió en bandos y sobre todo al atardecer, ocupados en la caza de hormigas voladoras (Ver alimentación F. subbuteo), con alcotanes y cernícalos los días 11 (2 a 4, con familia de cernícalos) y 18 (8 a 10, con 7-8 alcotanes) y algunas más sueltas. A estos bandos hay que referir los sin fecha de otros años, en paso allí. Una vez - las perseguían Oriolus, ya observado en otra ocasión allí, -- hace años y en otros sitios.
- 3-IX-51 - En Laguna, vi uno, en paso claro, al parecer ad. por brillante colorido.
- 14-IX-51 - Hasta Villa Ester, ya no queda ninguno, a pesar de ser una de sus localidades favoritas
- 19-IV-52 - Pinarillo. Aún no se les ve.
- 13-V-52 - Pinarillo. Hay 3 parejas, una en el nido del año pasado.
- 14-V-52 - Nido, 4 huevos frescos. Medina nota, o ya puesta.
- 14-V-52 - o ya determinada puestas.
Cont. est. -
- 1 coleóptero, probablemente copofago.
- Unos 12 acrididos
- 1 Gryllus
- 1 Coleopterospequeñito, esbelto verde claro dorado.
- 28-VII-52 - No veo en la
- 28-VII-52 - No veo en la finca de Barbara, donde han criado este verano.
- 6-VIII-52 - Monte Blanco, visto uno.
- 18-VIII-52- La Pedraja, Boecillo. Unos 10 solitarios y en pares.
- 18-VIII-56 - La Pedraja, Boecillo, unos 10 solitarios y en pares.
- 28-VI-51 - No carrasquean. Nido en chopo a 6-7 m. sobre el rio, de Picus. Antes de entrar se posa como Picus, apoyando la cola.

Coracias garrulus

- Poco común. Se establece en lugares llanos y despejados, cerca de pinares y arbolados, en las orillas de los ríos y en el páramo especialmente, donde no desdén instalarse a veces a lo largo de las carreteras que encuentra casi únicamente con los tendidos eléctricos como punto de observación. Los hemos visto en -- Herrera de Duero, Villanueva de Duero, Puente Duero, Tudela, la Parrilla, Montemayor de Pililla y en tierras palentinas, no siendo desconocidos en la capital de Burgos.

Hemos encontrado azulejos desde el 8 de Abril, ya emparejados el 10 de Mayo. pocos días más tarde, hasta el 10 de Agosto, en Boecillo, localidad que volvimos a visitar el día 20 sin encontrarlos. Un individuo muerto el 3 del mismo mes estaba en plena muda.

Hemos descubierto un nido de azulejos, en una piquera de un chopo seco, a unos 3 m. de altura, en Monte de la Reina (Zamora) a orillas del Duero y a muy poca distancia del cauce. Otra pareja anido probablemente en el soto del Adaja, junto a una colonia de Sturnus unicolor.

11-VII-52- ♂ ad.

Plumaje. Predomina el viejo en general.

♂ ? - Bien emplumado. Boqueras manifiestas. Pico más corto y curvo, con la base del culmen amarillenta. Base más pálida, lívida, y color general más claro que el ad.

♂ ad. cont. est. -

- 1 Grillotalpa entero
- 1 Grueso locustido verde, o, entero.
- 7 acrididos (Saltamontes verdes pardo grandes de prado) 4 enteros.
- Restos de otros 7 (mandíbulas) al parecer todas de acrididos.

♂ ? juv. Cont. est. -

- Lleno a medias de restos de coleópteros negros (entre pequeños y medianos), sobre todo de ese que parece a Blaps. en pequeño, liso esbelto.
- Un piñón de negro.
- (hay algún coleoptero rayado, negro, y otro punteado).