

Buteo buteo L.

- 2-I-44 - Conseguimos vivo un individuo que acababa de cazar un Ephimis norvegicus en una alcantarilla, en las orillas del Pisuerga y al pie de una casa habitada. Nunca les hemos visto acercarse tanto, Se le espantó pero volvió a la presa y le atontaron de una pedrada.
- III-46 - Ha permanecido un individuo durante 15 días en las orillas del Pisuerga, frente a la población, tirandose de vez en cuando a las tierras, desde las ramas.
-
- 27-IV-47 - Puente Duero. Capturado uno, con las plumas muy roídas o desgastadas. Saco fotos. Cesar, el 5-V-47.
- 15-VI-47 - La Fraila. Un individuo volando bajo.
- 20-VIII-47 - Madrid. Me envían un ♂ probablemente.
Cont. est. -
- Lacerta ocelata pequeño.
- 3 lagartijas y 6 chicharras.
Ala, 377 mm.
- 12-XII-47 - Un ♂, en Valladolid.
- 26-XII-47 - Medina del Campo. Ala estirada 376 mm. Ala normal, es decir cuerda de arco, 361 mm.
- 2-II-48 - Villanueva de Duero. Dos parejas.
- 15-II-48 - Viana de Cega. Uno suelto, perseguido por cernícalo y chovas (C. frugilegus)
Un individuo muerto en Junio tenía el estómago lleno de chicharras.
Anida en La Fraila (Montemayor de Pililla).
- 20-III-48 - Santovenia. Un ♂.
Cont. est. -
- pelos de topillo (al parecer)
- varios grillos
- una oruga.
Ala, en la cuerda, $38\frac{1}{3}$ cms.
- 16-V-48 - La Fraila. Un ♂. Cont. Est. -
- 1 ó 2 Lacerta ocellata.
- 28-V-48 - Medina del Campo. En un pino alto un nido de palos y forma plana. Contenía 4 crias en plumoncillo, en el nido había un conejo medio comido, la cria está perfectamente emplumada el 25-VI, y vive bien. Empezaron a volar a mediados de junio.
- 26-VIII-48 - Me traen un ♂, sin cont. est.
- 24-X-48 - Valdestillas. Algunos individuos en laderas de encima de pinares y soto del Adaja.

Buteo buteo.

- 6-II-49 - Puente Duero. Un individuo con el plumaje muy raído ya, mucho más estropeado que el del ♂ de primeros de Enero del 49.
Cont. est. - Según Miranda, -
- un pájaro pequeño.
- 5-IV-49 - Mudado, sin sexo. Ala, 360 mm. Bastante pálido.
Cont. est. -
- Una Scolopendra.
- 6 Grillotalpa
- 1 culebrilla ciega.
- 5-V-49 - Puente Duero. Entra al cáramo un ♂ recién mudado, de precioso plumaje. Cont. est. -
- 1 Lacerta ocellata.
- pelo de mamífero (rata de campo)
en sitio de m cho conejo.
Ala, 370 mm. en fresco
- 8-V-49 - Medina del Campo. Me trae Luis un huevo roto, de tres que - había en un negral alto, en rama saliente. Con duda. El huevo muy fresco.
- 29-VIII-49 - Puente Duero, un joven grande y perfectamente emplumado.
Ala, seca, Un conejo; ~~Las~~ plumas muy sedosas y moteadas de claro.
- 9-XI-49 - Una a orillas del río. Empiezan invernantes?
- 13-XI-49 - A orillas del Pisuerga una pareja, Invernantes.
- 6-I-50 - Quintanilla Sobre Sierra. (Burgos). o. Long. T. 511 mm.
Enverg. 1280. Ala 405. Cola, 214. Sin cont. est., en piel.
- 9-II-50 - En el Sotillo, uno establecido.
- 6-III-50 - Puente Duero. En el monte se persigue una pareja en celo. De ¿otra pareja? cobramos una ♀. Según el guarda han llegado al monte donde crían hace unos pocos días. Mutans.
Ala, Cola, ● óvulos.
Cont. est. -
- plumas de un Passere.
- 7-IV-50 - Puente Duero. Un ♂. Mutans.
Cont. est. -
- Un gazapo grande.
- 23-IV-50 - La Fraila, veo una perseguido por C. corone, en el Pinar, todos los años anidan algunos, según Justo. Lanzaba el maullido - corto.
Agosto. Una rana, un pitymyas, un ofidio y Pica.
- 4-VIII-50 - La Fraila, Se ve alguno y una pareja, pocos y localizados. Es la única rapaz grande que hay.
- 6-VIII-50 - Un individuo ¿joven? naciendo plumas, bien emplumado.

Buteo buteo

- 6-X-50 - Santiuste (Burgos). ♂ Cont. est. -
- 2 Tropidonotus
- 3 acrididos (examinó 1)

Santiuste (Burgos). ♂ Cont. est. -
- restos de culebras.

Este y el de la misma localidad y fecha, en el soto del río.

- 19-XII-50 - Valdeestillas. Se ven dos o tres. Uno devora casi una paloma semidomestica que mató Mariano.

- 24-XII-50 - Una ♀ ad. abdomen calloso, fasciatus muy pinteada y clara. (Palencia). - Cont. est. -
- un conejo

- 24-III-51 - Adaja, junto al M. Blanco. Ya están emparejadas y establecidas en sus puntos estivales, les atacan los cernicalos.

- VIII-51 - La Fraila. Se ven en parejas y sueltos. No se ven familias. Dispersas y algo comunes, como siempre. A una le ataca alcotan el día 14.

- 15-X-51 - Monte Blanco. Creo que la misma pareja, el ♂ mas oscuro, me entra varias veces al águila, mal que tiroteo. Les oí maullar poco. Andan juntas y es como siempre la rapaz más común allí.

Ver nota de Monte Blanco, del 31-X. Creo que se han ido, quizá espantados por tiroteo a palomas tórcaces.

No les ven en Monte Blanco el 26-I-52, con gran nevada. Dice el guarda que ahora se vuelven a ver águilas.

Ultimos de Noviembre, y todo Diciembre, hay en el Habanero, posados en cables, y sobre las tierras bajas.

- 9-III-52 - Adaja, Monte Blanco, abajo. Un ♂ Mutans y bastante oscuro. Cont. est. - Anotado.

- 27-IV-52 - Monte Blanco, cobrado ♂, mutans. Nota. o la 1050. pyllus 5, pyllotalpa 4.

- 20-VII-52 - Juvs. independientes. Me traen a disecar.

- 10-VIII-52 - Laguna, orilla del Duero, uno posado en árbol seco, le atacan golondrinas. Vuela con otro.

Kii ha ha o Kiaa Kiaa. "in situ".

Nota color.

El juv. del día 20-VII, plumaje nuevo.

- Cont. est. -
- 1 roedor grande (Rata de agua o gazapo)
- 3 Epipigera.

- 30-VIII-52 - La Rozas (Gredos), traen ♂ ad. testiculos pequeños, plumaje regular-malo. Cont. est. -

- 1 Elyomis gymnesicus
- 1 ofidio (punta de cola)
- 1 acridido.
- 1 oruga gorda
- 7 grillotalpa.

4-IX-52 - No veo ninguno en Traspinedo. Aunque le conocen bien, debe ser raro.

1-15-I-55 - Palencia. Traen 3 en estos días, dos "mutans" y 1 "fasciatus"



Buteo buteo.

9-XII-51 -
MEDINA

El nido estaba hecho sobre uno viejo de marica o grajo, completado con ramera y acolchado con trozos de saco y cuerdas.

Fueron cogidos 2 crias a fines de Julio.

Un pino albar a unos 12 cm. de altura, en un bosquecillo cerca de la linde del pinar y a menos de 200 ms. de un nido de grajo.

Pinares de Medina del Campo.

Al pie del nido, en visita efectuada a primeros de Diciembre encontré:

Conejo. Patas de atrás de 2, un cráneo y región lumbar. Total 2.

Lacerta ocellata } cráneo

Alcaravan } pata

Pica pica. } cráneo

Además una sogá y media docena de egagropilas, 2 de escamas, 2 de empedrado de Julus y 2 de pelo.

Examinados encontré:

Uno o dos pollos de Coturnix, o pollos de Alectoris (más bien esto puesto que Coturnix es muy rara allí). Gran cantidad de restos de Julus. Restos de bastantes insectos, abundan Tenebrionidos, un Pentatomido, unos probables epiphigera, Grillido.



Egagropila,
Tamaño natural

Abundancia de restos de reptiles, las escamas parecen de culebra (abundan allí Coluber, Tropidonotus, natrix, viperinus y Lacerta sp. entre ellos Lacerta ocellata, común o muy común.

1^{as}. I-51- Buteo buteo, var. mutans.
Herrera del Pisuerga (Palencia)

Cont. est. -

- 1 Gryllotalpha
- ± 1 bicho dorante negro vulgar.
- 1 larva de ¿coleoptero?
- 2 Acrididos rosados.

22 larvas apodas como de gusanos de carne pero con un máximo de unos 6 cms. (estiradas por la maceración)



Buteo buteo

-IV-51- Nidificante en todas las regiones arboladas que hemos visitado. Durante el verano es más común que cualquier otra rapaz de su tamaño.

En la Fraila anidan algunos años en los negrales, aunque suele ser destruida la cria por los piñeros. Hemos visto dos nidos en los pinares de Medina, ambos en pinos negrales y en las ramas gruesas que arrancan de la parte más baja de la copa. Uno de ellos tenía tres huevos frescos el 5 de Abril. En el otro fueron encontradas el 28 de Mayo, cuatro jóvenes aún en plumón que vimos un mes más tarde perfectamente emplumados, jóvenes ya independizados a fines de Julio y en Agosto.

Habitat en verano.

Común en pinares no muy extensos o en los límites de estos; en montes de encina, siempre que cuenten con algún pino elevado para nidificar. Con querencia a los montes de las laderas, cerros, lomas o páramos, siempre que estén bien arbolados.

Habitat en invierno.

Terrenos abiertos y desnudos del valle, con algún árbol que les sirva de atalaya. Encuentran estas condiciones en los sotos de los rios, canales y acequias, carreteras, líneas de cables, etc. donde son comunes, ledares peladas de viñedo o cereales inclusives coronadas por hileras de almendros. Terrenos bajos con cultivos hortícolas, salpicados de grupos de chopos y olmos. Riberas cubiertas de pinar y montes de caza.

Invernante.

Empieza a notarse la afluencia de Buteo a primeros de Septiembre. Probablemente durante este mes y Octubre muchos de los individuos que se ven son de paso. En Noviembre ya se aprecia el establecimiento de algunos individuos cuyo campo de acción es muy poco extenso si se le compara con el de Milvus milvus. Varias veces hemos visto individuos que permanecían durante dos o tres semanas en un bosquecillo o linde sin desplazarse apenas, durante los meses de Noviembre a Febrero. Las nevadas traen al soto del Pisuerga algún aguila ratera que sigue durante cierto tiempo en el lugar elegido, a veces tan próximo a la población que hemos podido cobrar un individuo que se arrojó contra una rata de alcantarilla (Ephimis novergicus) al pie mismo de una casa de vecindad.

A primeros de Febrero aún hemos visto alguno de estos individuos invernantes. En 1950 comprobamos la llegada de los estivales o quizá solo su retorno a los puntos de cria, ya que es muy probable que este ave sea en gran parte subemigrante (monte - valle en otoño y lo inverso en primavera), a primeros de Marzo. Encontramos entonces parejas en celo presenciando persecuciones y riñas.

El 29 de este mes fué capturada en España un aguila ratera alemana.

No hemos notado la afluencia o paso en bandos que señala Castellarnan en Segovia, pero coincidimos con sus fechas de llegada. Podría explicarse como migración regional, descendiendo a las mesetas los individuos que se reproducen en las montañas.

Hemos examinado en mano 22 aguilas rateras, 2 de Santander, 3 de Burgos y 5 de Madrid. El resto de Valladolid y posiblemente alguno de Palencia. A excepción de dos de ellos cobrados en Valladolid

Buteo buteo

IV-51 - (un ♂ apareado y establecido) y Madrid (Octubre, El Pardo) todos los demás pertenecían a la forma Fasciatus. La forma Mutans, se ve tan frecuentemente en los museos y colecciones que es fácil sacar conclusiones equivocadas si no se tiene en cuenta que muchos de ellos son naturalizados precisamente por su poca abundancia. En los individuos observados en libertad con gemelos, aparece también Mutans en raras ocasiones.

Las medidas de ala en fresco de seis individuos.

| | | | |
|---|---------------|------------|---------|
| ? | - Valladolid. | Diciembre, | 376 mm. |
| ♀ | - Burgos, | Enero. | 405 mm. |
| ♂ | - Valladolid, | Marzo. | 383 mm. |
| ♀ | - " | Abril. | 360 mm. |
| ♂ | - " | Mayo | 370 mm. |
| ♂ | - Madrid. | Agosto | 377 mm. |

28-IV-52- Puente Duero, ♂ 378 mm Cola, 198, Mutans.



17-VIII-52- Se levanta uno en de encima de un conejo semidevorado (conejo juv. ya grande) en La Fraila. Es la 1ª vez que encuentran presa a las aguilas rateras.

23-III-56 - Valladolid. mutans

♂ ad. Cont. est. -

- 1 Pimelia
- 2 Peloterus rayados
- + 1 Grillos



E. buteo. Mutans



JAV





JAV



JAV



JAV


"AGROMAN" Empresa Constructora, S. A.

Pl. Onésimo Redondo, 6.—VALLADOLID

Cuero. del nat.

A-63-V

Voladestillos 12-IX-52



JAV

buranda (butes butos)



alo bien hecho

JAV

ESPAÑOLAS S.A. - 1.ª
OFICINAS
Teléfono 0 28 2 1 1 1 1

Representante exclusiva

TEXTIL CASTILLA S. A.

Blanqueos, Tinte, Apresado y Acabados de tejidos

Carretera de Madrid
Km. 10,5 - 28010 - Madrid

Carretera de Madrid
Km. 10,5 - 28010 - Madrid

VALLADOLID

NOTA DE ENTREGA

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR | OTROS |
|-------------|----------|--------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

med. la 7,8. 12.

una area budo.

rapio suento.




lado rapio
 la espina.
 ~ med. junio 53.

una part

JAV

Nisactes fasciatus




JAV

subjecting = putrescens.



JAV



19-20-05

JAV