

Coturnix coturnix.

- 20-VI-43 - Dos individuos, una en plumón y otra con plumas apuntando en Montemayor de Pililla.
- 14-VIII-47 - Camporredondo. Una nidada tardía recién nacida.
- 24-X-47 - Laguna de Duero. Observamos una. Siempre quedan retrasadas.
- 15-IV-48 - Llegan a Valladolid, o al menos ese día los observamos por primera vez.
- 27-VI-48 - No ve ningún pollo Mariano, buscando con perros en el valle de Esgueva.
- 11-VII-48 - Valle de Esgueva. Una cria ya emplumada que volaba.

A fines de Julio y primeros de Agosto parece observarse ya una disminución de individuos, sobre los de mediados de Julio. Quizá ya hayan sido cazados.

- 15-VIII-48 - Generalmente salen en parejas. Hay oo que no tienen barba.  
Cont. est. -  
- Únicamente granos de trigo.

X-48 - A primeros de Octubre hay todavía algunas.

- 10-X-48 - Zaratán, dos individuos en el Valle.
- 24-XI-48 - Me traen un ♂ adulto que han cazado. Anidan en abundancia en Renedo.

29-IV-49 - Burgos. San Mamés. Oye Tonono una. Otra el día 22 en el penal.

18-VI-49 - Burgos. Un nido con 10 huevos.

7-VIII-49 - Hay muy pocos ya en Valladolid, lo mismo parece ocurrir en Salamanca, donde por carta

21-VIII-49 - Aun les hay.

A fines de Agosto, según los cazadores hay muchos de paso (20-31)

24-VIII-49 - Burgos. Hacia pasan muchos sobre la capital, por la noche.

20-IX-49 - A fines de Septiembre dicen los cazadores que están en paso por Valladolid.

30-IX-49 - Vemos en La Maruquesa. Septiembre.

Alguna a primeros de Octubre.

A primeros de Diciembre se están matando bastantes cerca del cementerio.

En Herrera de Palencia dicen que las codornices crían en Valladolid y apenas segado suben de Palencia, donde crían pocas, -- ocultándose en los sembrados. Parece ser opinión general.

Zaratán, las codornices anidan en los arroyos y en las alfalfas y prados.

Coturnix coturnix.

- 17-IV-50 - Se oye una en la otra orilla. La primera del año,  
Dicen que ha habido paso hacia el veintitantos de Mayo (20-28),  
los cazadores. Casi todo Mayo ha llovido.
- 4-III-51 - Ver notas. Veo una en el Habanero.
- 1-IV-51 - Las oigo en la otra orilla.
- 4-IV-51 - Las oyen en Zaratañ.
- 15-V-51 - Torremormojón. Palencia. Me dicen de nido completo en alfalfa.
- 25-V-51 - Zaratañ. Común por la parte baja del monte, cantan mucho los ♂♂.
- 1-VIII-51- Cantan bastante aún.

La desaparición general coincidente con la terminación de la -  
siega y gran matanza, ha tenido lugar en los 10 primeros días  
de Septiembre aproximadamente. Hoy (14) aún quedan en las vi-  
ñas algunos pocos. A fines siguen viéndose. Todavía el día 23  
se cobran 6 en Cabezón (las únicas vistas). El día 3 de Octubre  
en el mismo sitio se ven. El día 14 todavía ven una en Posaldez.

- VIII-51 - La Fraila. El día 18 traen dos crias vivas de muy pocos días.
- 1952 - Me dijeron que se les oye por primera vez en Marzo. No se nada  
seguro.  
Se oyen sin duda hacia el 25 de Abril.

Ver periódicos de fines de Abril y primeros de Mayo, con bando  
que cae en Valencia.

- 10-VIII-52- Zaratañ.  
Garganta negra, 8 o o  
" blanca 5 Extremos, en garganta oscura.

Tipo A. menos intenso, hay otra  
Tipo B. de mancha más extensa hay  
otra.  
Las restantes son intermedias, con  
las laterales de la mancha más o  
menos moteadas. Testículos interme-  
dios.

Todos ellos en muda, la que más  
plumaje viejo conserva es la A.  
sobre todo en el dorso cuyas plumas  
viejas no tienen línea blanca cen-  
tral. Pecho rojizo en todos.

Garganta blanca o o.  
Coloración de cuello y pecho. Hay 3 tipos.  
Tipo A. Densamente moteado sobre fondo más grisáceo que las otras;  
manchas redondas. Hay 2. o juv.  
Tipo B. Menos densamente manchado, con líneas longitudinales en  
lugar de redondas, sobre fondo más pardo-avena. Solo hay una.  
Tipo C. Con la garganta sin mas manchas que las raquis blancas.

Coturnix coturnix

2-IX-51 - Villanueva de los Infantes.

Alimentación.

Examinados 5 buches a dif. horas, únicos con contenidos de 21 cobradas.

1ª Trigo..... 37 granos.

2ª Trigo ..... 60 granos.

3ª nº 5 ..... unos 60 granos  
nº 15 ..... 6 granos  
Trigo ..... 9 granos.  
Una hojilla verde.

4ª Trigo ..... 74 granos  
nº 15 ..... 4 granos  
nº 5 ..... 10 granos.

5ª Trigo ..... 8 granos  
nº 16 ..... 25  
nº 15 ..... 17  
nº 5 ..... unos 50.  
nº 11 ..... unos 100. y 35 como cálices verde tierno  
y 35 como cálices verde tierno, con hojillas  
amoratadas de 6 mm. de longitud.  
nº 17 ..... unas 6

Coturnix coturnix

10-VIII-52 - Zaratán.

Todas mudando las alas ( a partir de las 1as secundarias hacia atrás y hacia adelante. En general solo faltan de mudar las 4 primeras primarias y últimas secundarias.

Trae Luis de garganta negra 2 (más manchada que B y casi tanto como A, pero más difusa).

de garganta blanca, 2 tipo A y una intermedia entre A y C.

Deduzco lo de ♂ y ♀ por el examen de 5 aves, 4 ♂ y una ♀.

- Cont. est. - Solo miro uno.  
- Trigo.... 22 granos.  
- nº 3 .... 11 "  
- nº 5 .... 25 "  
- hormigas ... 1  
- una hojita verde diminuta.

Villarmentero, Luis. Encuentran poquísimas codornices. Hace unos días abundaban mucho, pero ya ha partido la mayoría.

El 7 de Agosto, los serenos de Valladolid cogen media docena de codornices en las calles, en paso claro.

Val de Cerros. Carlos. Encuentra abundancia. Una fam. de polli-  
tos que ya volaban.

Luis ve una fam. que no volaba y otra el plumón pluma tamaño curruca (examinó 2). Julio aller 2' fam.

31-VIII-52 - Fuensaldaña - Villanubla.

Cobra Luis 29. Repetidas. 6 ♂ viejos ninguno garganta como A. ya mudados. 6 o juv. 11 o de ellas unas 8 ad. y 6 pollos sin barba negra, a medio desarrollo (en paso) y uno con al cabeza amarillenta.

Los adultos han terminado de mudar ya. Hay 3 codornices heridas de antes en las patas. Se han visto unos 50, lo que quiere decir que no han partido aún.

Plms 13

gorgonita negra, ♂ ♂  
Blanca, ♀



A

B

al. mancha fondo  
oscura de plumaje viejo,



Todos ellos en vida, la que más plumaje viejo conserva es la A, solo todo en el dorso cups plms viejos no tienen línea blanca ventral. Pecho rojizo en todos

tres, en gorgonita,  
seme  
Tipo A. mas interna hay otra,  
tipo B. de mancha mas exten-  
sa hay otra.  
los restantes son interme-  
dios, don las laterales de la  
mancha + o - rotadas. testi-  
culos intermedios

gorgonita blanca, ♀ ♀

coloracion de cuello y pecho. Hay 3 tipos.

- tipo a. : permanentemente moteado solo fondo mas grisáceo que los otros; manchas redondas. Hay 2. ♀ juv.
- tipo b. : Mas desmenuadamente manchado, con líneas longitudinales en lugar de redondas, solo fondo más fondo-oscuro. solo hay una
- tipo c. : con la gorgonita sin más manchas que las raquis blancos.

Todos moteando las alas. (a partir de las 12 secundarias hacia alas y línea adelante. En general solo faltan de morder las 4 primeros primarios y últimas secundarias.

Codorniz.

~~XX~~

174

tres his de ~~gambusia~~ nepe 2 (mas unicolor que b y con tanto como A. pero mis defunc.)

de gambusia blavis, 2 tipo a y una intermedia entre a y c.

[ pediremos los de ♂ y ♀ por el examen de 5 aves, 4 ♂ y una ♀ ]

Cont. et. solo uno uno.

Trips. 22 juvenes.

nº 3 — 11 "

nº 5 — 25 "

hormigas — una

una hofita verde diminuta.

10-VIII-52.

his. Villanueva. Encuentran porquisinas codornices. Hace unos dias abundaban mucho, pero ya ha partido la mayoria. El 7-VIII los serenos de Vall. coguen media docena de codornices en las calles, en favor claro.

Codorn. Val de Carros. Encuentro abundancia. una fauna de pollitos que ya volaban.

his una fam. que no volaba y otra de plumas nuevas tamaño curruca (examen 2). Julio calles 2 fam.

31-III-52.

Fuencalduña - Villanueva.

Colme his 29. Reptidos — ninguno ninguno gambusia como A. ya mudados.

6 ♂ viejos. 6 ♂ jivs. 11 ♀ de ellas una Pad y 6 pollitos sin bamba nepe, a medio desarrollo con pero) y uno a un la cabeza amarillenta.

los adultos han terminado de mudar las alas ya. Hay 3 codornices heridas de estos en las naves. Si han visto unos 50, lo que quiere decir que no han partido aun.

Coturnix coturnix L. endornix.

JAV

Bastante común como indigena en todos los  
pueblos envidados de la provincia que ofrecen condiciones favora-  
bles. Es particularmente abundante en los extensos <sup>cultivos</sup> ~~campos~~ del  
valle del Esqueva. <sup>se extiende</sup> su area de distribución a lo  
largo del Duero, remonta el río Pinerufe y penetra por los  
cauces del lega, Adaja y Eresma y los estrechos ~~costados~~  
de sus ~~varios~~ <sup>tributarios</sup> tributarios.

~~En los alrededores de los rios, aunque se pueda decir que no son comunes. En el  
N.O. de la provincia crean, abundantemente segun afirman  
en San Pedro de Latarce, de donde nos han enviado huevos, y  
en todos los pueblos de los alrededores. Los campesinos aseguran  
tambien que crece en el N.O. por tierras de Medina de Rioseco.  
Lo que consideramos muy probable por la ~~abundancia~~  
gran dispersion manifestada en el resto de la provincia.~~

~~En los alrededores de los rios ~~se~~ ~~ve~~ ~~una~~  
mucha ~~de~~ ~~las~~ ~~alfarbas~~ ~~que~~ ~~son~~ ~~siempre~~ ~~de~~ ~~cultivo~~ ~~pretando~~ ~~desde~~ ~~se~~  
se ~~ve~~ ~~en~~ ~~su~~ ~~entre~~ ~~feverencia~~. Hemos ~~ya~~ ~~en~~ ~~los~~ ~~campos~~ ~~de~~ ~~los~~~~

No parece un ~~pro~~ aventurado considerar a los cuartos  
como representantes del oriz nortista, considerando la erosión  
que hemos notado al N. de la cordillera cantabriga, concreta-  
mente en el valle del Pas. Allí casi es excepcional. sin el costo  
de algún modo ~~no se puede el encontrar~~ ~~no siendo~~ veera-  
no ~~se puede~~ la coronar la cresta cantabriga y mirar hacia  
las llanuras del norte de Palencia para encontrarla en ~~abundancia~~  
que ~~se~~ la cina en algunas regiones de Andalucía viene a refor-  
zar esta posibilidad.

~~Preguntar Toranzo en Burgos.~~

.. ~~Atarazo y Luis en Salamanca.~~