

Alectoris rufa.

- Primeros de Junio. S. Pedro de Latarce. Anidan ahora estando en huevos la mayor parte.

22-VIII-48 - Me traen un pollo que no ha mudado las alas ni las coberteras escapulares.
A fines de Agosto aun hay pollo del tamaño de una codorniz, aunque la mayor parte sean igualones. A fines de Septiembre están en plena muda unas y otras ya casi mudadas. Todavía conservan remiges juveniles.

A primeros de Octubre las hay con remiges no mudadas de joven, y alguno en librea juvenil.

Los ♂♂ se distinguen de las ♀♀ en la mayor anchura del collarín y el tono más claro de las remiges y coberteras inferiores subalares, los ♂ juvenes tienen el color de estas partes tan claro como las ♀♀. Al segundo año las remiges que salen no tienen ya manchas blancas en los bordes externos. El espolón es indiferente.

Viven en cautividad 12 años. A los 7 años los ♂♂ empluman - mal y despacio, por lo que se cogen muchos a mano o con perros.

Desde el día 13 de Febrero parece que ya empiezan a cantar en plan de reclamo.

7-VIII-49 - Bandos de igualones, Cuesta Contiendos. Al día siguiente un pollo tamaño tórtola y otros en días siguientes.

A fines de Septiembre plumaje adultos, los juvenes. Conservan las últimas coberteras escapulares del plumaje juv. hasta el 20 de Octubre, por lo menos. En muda ahora.

II-50 - Primeros de Febrero. Cantan ya mucho.

Zaratán, anidan en los trigos, cebadas y avena, en linderones y arroyos secos de yerba alta y en los junqueros grandes.

6-IV-50 - Medina del Campo. Entre juncos, posado entre pinar, un nido con 10 huevos feto bastante desarrollado. Hay menos que alcavanes.

16-IV-50 - Zaratañ. Dicen de nido de perdiz con tres huevos.

23-IV-50 - Hasta La Fraila. Solo una pareja en el llano de Aldeamayor, campo cultivado.

15-VIII-50 - Hay juvenes codornices e igualones.

1-X-50 - La Fraila. Pollos tamaño tórtola. El día 27 de Septiembre había algunos como codornices.

25-V-51 - Zaratán. Solo oigo una, valle monte.

Ver notas de pollos en Agosto.

11-VIII-51 - La Fraila. Bando 2 familias, una con pollos tamaño codorniz y otra de igualones. Otra intermedia fué vista el día 19, todos acompañados por 1 padre. Una defendió (atacó) a un cernícalo que volaba encima de ellas.

Alectoris rufa

- El 3 de Octubre de 8 muertos en Cabezón se cobran 2 pollos cabeza sin mudar y cuerpo en el apuntan algunas plumas (línea ventral) de adulto. Tamaño aún muy inferior al de adulto. Uno de estos examinado en plena muda.

- 6-X-51 - Se cobran 9 en Posaldez, de ellos 3 pollos que empiezan a - adquirir el plumaje ad. en las líneas ventrales y aún de tamaño muy inferior al normal, los adultos en muda pero ya no muy - manifiesta.

- 1952 - Una pareja ya el primero de Febrero. Nota.
Nota semilla?. primeros de Mayo, 5 huevos (col 4).

- 20-VI-52 - Monte Blanco, 4 polladas, juv. como gorriones-codorniz.

Allectoris rufa

16-VIII-51 - Cortas de Blas.

Desde el tren y a la altura de Villanubla un bando de 11-14. Se ajeja apeonando. Parecían pollos ya igualones, acompañados por los padres. Silueta así, mientras huían.

Y en el monte, de la linde de un trigal, cerca de remolachas, salió una familia con pollos del tamaño de una codorniz. Al acercarnos se dispersaron saliendo al vuelo cada uno por un lado. El vuelo más largo sería de unos 50 m. Cobramos uno, long. 22 cms.

En una linde de encinas, entre rastros de trigo otra familia se levantó juntos y en la misma dirección. Dieron un vuelo de menos de 100 m. y otro más tarde, aún reunidos. Al caer ya agotados huyeron apeonando, escondiéndose entre piedras y matas. Logramos coger 2 vivos y uno el perro. Tamaño 27 cms.

Parece por lo tanto que estos bandos ya más grandecitos tienen más instinto gregario o se sobreponen más al desconcierto de la caza, y procuran salvarse reunidos. La huida individual se inició cuando ya estaban agotados, después de unos 150 m. de vuelo. El día era muy caluroso.

Nº 1. juv. 27 cms. Según la tabla de Bureau, tiene unos 32 días, tienen cañones los primeros 1ª, 2ª, 3ª y 4ª, de plumaje juv. y apunta la 8 con 9 y 10 bastante desarrollados, la última sin motear. Conserva 2 rectices laterales derecha y 1 izquierda, los demás apuntando para el plumaje nuevo. Apuntan o tienen ya aquí y allá plumas de ad. unos en el dorso. Cabeza ya mudada, con plumaje de semi-ad. Pico rojo, negruzco.

Nº 2. Juv. 22 cms. Tiene unos 24 días, por tabla Bureau. Creciendo todas las primarias excepto de 5ª a 8ª. Plumaje juvenil completo incluso en cola. Pico negruzco amoratado. Aspecto de una codorniz.

Alimentación.

Nº 1.- Trigo 73 granos.
Hormigas 109 contadas, quizá unas 10 más.
Semillas de la forma del dibujo, con 2 ó 3 filamentos en el extremo grueso, quizá fueran espinosos. Long. cuerpo 3-4 mm. con una semilla blanca, cónica, muy alargada, dentro unas 142.
Además un coleóptero, quizá coprofago o necrofago de unos 9 mm.

Nº 2.- Trigo 30 granos.
Hormigas unas 70
No se si había algo más.

Otros datos. El día de la apretura de la veda.

Enemigos.

Vi un Circus cyaneus que volaba y se posaba en las encinas sin salir de un pequeño corro y a escasa altura, sobre el sitio en que levantamos el bando de 27 cms. Indudablemente hacen grandes destrozos entre ellas.

Hace unos días, hacia el 10 de Agosto, en La Fraila, vio Justo un Cernícalo volando bajo sobre un trigo. De debajo de él salió verticalmente una perdiz adulta que le atacó con furia, obligándole a huir. Tenía pollos.

Alcedo rufus.

se aleja aporreado

Cortés de Blas. 16-III-51.

Dado el tien y a la altura de villavieja ~~hacia~~ un bando de 11-14 de calcepsá porreados. Poravian pollos ya iguales nes, acompañados por los padres.



librete an. nientos lucian.

Ya en el monte, dela linde de un trapal, cerca de remolachas, salio una familia con pollos del tamaño de una codorniz. Al acercarnos se dispersaron voliendo al suelo cada uno por un lado. El vuelo más largo seria de unos 50 m. cobramos uno, long. 22 cms.

En una linde de encinos, entre rastrojos de trigo otra familia se levanto justo y en la misma direccion. dieron un vuelo de nuevos de 100 m. y otro más tarde, aún reunidos. El caer ya agotados luzeron aporreado, escondiendose entre piedras y matas. logramos coger 3 rinos y uno el perro. tamaño 27 cms.

Parece por lo tanto que estos bandos ya más granditos tienen más instinto gregario o se sobreponen más al desconcierto de la caza, y procuran salvarse reunidos. la huida individual se inicio cuando ya estaban agotados, despues de unos 150 m. de vuelo. El dia era muy caluroso.

Nº 1. juv 27 cms., segun la tabla de Bureau, tiene unos 32 dias. Tienen caudales los juvenis 1º 24 3º y 4º, de plumaje juv. y apuntan los 8, con 9 y 10 bastante desarrollados, la última sin notes. Conserva 2 rectrices laterales debeles y 1 izquierda, los demas apuntando para el plumaje nuevo. Apuntan o tienen ya aqui y alla plumas gran de ad, mas de uno duro. Calera ya undada, con plumaje de semi ad. Pico rojo. negro.

Nº 2. juv. 22 cms.
Tiene unos 24 dias, pr tabla Bureau. Creciendo todos los juvenis excepto de 5º a 8º. Plumaje juvenil completo incluso en cola. Pico negro avocado. Aspecto de una codorniz.

Alimentacion.

Nº 1. — Trigo. ————— 73 grams.
 — Hornigas ————— 109. contadas, quise uno 10 más.



Semillas de la forma del dibujo, con 2 o 3 filamentos en el extremo grueso, quise fueran espinos. long. cuerpo 3-4 mm, con una semilla blanca, coñica, muy delicada, dentro. ————— 142.

ademas un coleoptero, quise copofago o necrofago, de unos 7 mm.

JAV

la Marie route au-dessus
 de vous héd héd héd
 affrète,
 au coco de



À LLEGE!
 aduete

he rue de la fontaine
 et le jeu parait
 et la source polouit
 qui chante jour et nuit.
 je de affrète blanche
 parait et héd héd héd
 qui est héd héd héd