

Aguila ratera - una.

Gavilan - uno, yo vi otro en el soto.

Torcaces - un bando de ~ 12 y otro de 3 ó 4 y sueltos. El 2 en Pesqueruela, cobró 3 de un bando de 80, los 3 cont. estl- alfalfa, una buche completamente lleno.

Se señaló un bando grande ya el 24-II. A primeros de marzo paso intenso.

Azulones - Unos 20 más de la mayoría en parejas, una vez 6 y otra 3. Ayer un grupo de ~ 14, dicen. El 9 en el Adaja unos 15. Se cobra un o. No hay cercetas y patos de otra clase.

Cigüeñas - 2 en las islas de Pesqueruela. Hoy en Valladolid, una llevando cespel al nido.

Garza - Una en la confluencia

Andarrios - Tres Ch. dubius, 2 en pedregal de Puente Duero y otro cogido en la presa de Pesqueruela.

T. ochropus - unas 6 parejas, probablemente paso. En la cascajera de Puente Duero una pareja de tamaño de ochopus y grises claro por encima ¿Crocettia??

25-Marzo- La Fraila

Llegada hacia las 3 h. - Partida a las 5'30 h. Ornitologeno escaso

Las diferencias con el pinar, (Laguna por ejemplo) del terreno sobre todo. Allí es de aspecto mas agreste. Roca caliza, agujereada, con oscuro manto vegetal. Profusión de estepas (jaras, cistus) a carros, tomillo. raras sabinas, punzantes rastreras.

Fecha de enorme pobreza ornitológica en La Fraila.

No hay más caducifolio que la alameda valle en que crió Cyanopica. Predomina en unas partes asociación de Enebras y P. pinea, en otras P. pinaster, no asociado, las sabinas con la primera asociación, más rala, en terreno más pedregoso, desigual. El pinar negral que recorrí, en la Unión, resinado, en bosquetes (algunos jóvenes, sin pájaros) análogos a Pozo Rubio, pero con tierras intermedias en que pacen ovejas ahora.

En la total, juniperus - P. Pinea.

23-Marzo - La Fraila

P. cristatus - Unas 4 parejas al menos. Es ahora el ave más común, todas en enebros, creo que le prefieren a el pino. Cobrada pareja, en piel, ♂ test. ♂. Se han separado de las asociaciones y prob. ya tienen elegido nido.

P. major - Casi en el mismo número que el anterior, pero no en pinar. Por la tarde en asociación manifiesta y dispersos por el bosque de P. pinaster.

Pica - Veria unos 7 u 8, entre ellos 3 juntos, uno cerca de Clamator.

Corvus corones - 2 - 2 - 3 - y algunos más, los vi perseguir a Buteo. Aun no anidan, me dice Justo.

Verdecillos - 1 cantó, algunos más (muy pocos) en comparación con el pinar bajo del 25-III.

Pinzones - En la Unión, P. negral, encuentre una asociación. Era un corro denso de pinar, con suelo de tamujo, ideal para ardillas. Había unos 20 pinzones, uno de los cuales cantó varias veces. Unos 2 parejas (quizá más) de P. major y Certhia brachydactyla, al menos uno. Crep que lo menos 2 mosquiteus. En la ladera oí un bandito de pinzones.

Phy. trochilus - Cobre uno en la asociación de P. negral.

Certhia - Vi una asociación.

Turdus ericetorum? - Vi uno, quizá chorla.

Clamator glandarius - Uno en la ladera, chillando, parecía q, cerca de marica. Otro, ♂ en el pinar. A la vuelta, fuera de La Fraila pero en páramo, uno salió de un bosque de albares llegando oruga en el pico. (Comparando el nº de orugas y de Clamator de La Fraila con el de pinar de Laguna, inferioridad para la primera, y menor densidad en ambas, 25-III-52).

Abubilla - Vi una, por la tarde otra en la casa,

Picus viridis - Oí al menos en 3 sitios. Es común allí.

Buteo - Uno, posándose en pinos (juniperus - Pinea), y otro en el valle. Perseguido por el grupo 1º:

Athene - Vi 2 en diferentes puntos, pero cerca de espacios descubiertos. No debe frecuentar el centro del pinar más que en terreno rocoso.

Me dijo Justo:

Otis tetrax - Han llegado hace unos 15 días los primeros, pero no les hay aún en nº normal, sino unos pocos.

Cyanopica - no vi. Me dijo Justo que en otros pinares les vió parasitizados por Cuculus, pero nunca por Clamator.

Cuculus - me dice es conocido allí y en el sitio anterior, pone en nidos de pajaros de pardo terreno, (Alaudidos?, Oenanthe?) El Cácaro se oye allí alguna vez. (Dice Cesar que ha visto Cuculus todo el verano)

Valv. 1952

23-III- Valladolid - La Fraila

Recorrido - en el que se pasa de la tierra desnuda al valle, pinares del valle hasta los páramos calizos cubiertos de pinar ya geográficamente segovianos. En el se aprecia bien la variación del paisaje

Un buen día, con sol nublado a ratos por alguna nube y una brisa ligera. Salida de Valladolid hacia las 10'30 h. y llegada a La Fraila hacia las 13 h. Tomé notas en el camino, que amplio ahora.

- 1 - Valladolid, La Cisterniga. Llanura de cereales, con sotos. Hay nota de otra visita este invierno. A la izquierda cerros desnudos (S. Cristobal). Pocos pájaros ahora. Vi:

Galerida cristata - 1-1-2.

Pinzones - bando de más o menos 30, en almendros. Aquí en invierno hay maricas, alondras, etc. Es típica campiña de cereales desforestada.

- 2 - Bajada al valle del Duero, aparecen pinares (P. pinea) y pim pollares. Alguna viña. En el cañal, entre pinar, con línea de chopos, (idéntica a la de Laguna, notas de verano). Oí:

Lullula arborea - 1 en pimpollar. Ahí pude ornitologear la granja Conchita, a lo largo de la via, poca distancia a Laguna de Duero, todo pinares, y aspecto idéntico.

- 3 - Valle del Duero, bosquecillos caducifolios, tierras, granjas, regadio:

Pica - 1

- 4 - Soto Duero. Muy arbolado, caducifolio. El pinar ribereño. (es el sitio en que anidaban Charros)

Mirlo - uno junto a almendros.

Maricas - 2, en chopos y viñedos

Jilgueros - bando de unos 10. Otro fringilido

Abubillas - 1

Golondrinas - en las casas del pueblo 1.

- 5 - Otra loma cubierta de pinar, y un valle abierto, con un par de manchas de P.pinea, amplias. Hay prados naturales y cultivos. Pocos chopos.

Pica - 2-2-1-1, en pinar.

Graja - 1-1, en cereales raros.

Fringilidos - 2

Cogujudas - carretera - 1 -1 *galimelabaria*

23-III - Valladolid - La Fraila

La carretera corre recta por entre los cereales. Hay regadío. Aquí he visto perdices, y parece un campo ideal para E. calandra. Cunetas con líneas de juncos, donde veo una Saxicola. En uno de los raros Crataegus, a la vuelta un Lanius excubitor.

La línea de las laderas, con pinar ralo (P. pinea) y bosques al pie de la falda, queda a unos 2 kms. a la izquierda al menos. Región interesante de ornitologear.

En mitad de la llanura de Aldeamayor. Torre alta, con nido de Cigüeñas.

Tordillos, (aquí he visto otras veces Coloeus, y cobrado tordillos).

Falco naumanni - en la torre al menos 5, cuyo cazadero, ya conocido es la línea de tendido. Tengo dibujo en algún sitio, iglesia y parte en que anidan primillas.

Se crían charros, cernícalos (en choperas y pinar respectivamente) y cárabos. Es pueblo típica de llanura. En sus campos se cobran muchas liebres.

Esta llanura es continuación de la de Boecillo, cuyas charcos hay que mirar. Son las estribaciones naturales de la cubeta S.W. de Medina, las crestas de pinar del páramo, semejantes probablemente a las que señala después. Encima de ellos es ya llanura segoviana, pero el terreno de Aldeamayor (recordar carretera Boecillo, sus cernícalos sobre todo abundancia de Coracias), es típico valle de cereales de cubeta.

Ahora sorprende por los pocos pájaros. Cerca del pueblo gorriones y el resto de los acostumbrados, paso a el campo Graja (influencia pinar) y Lanius excubitor por terreno reseco. Otras veces he visto ahí abundancia de Calandrella (pieles)

A la vuelta 2 cernícalos pasan al pimpollar

Pasado Aldeamayor sigue la llanura, a la derecha, donde descien- de el terreno hacia el valle del Cega, manchas de pinar.

Cogojudas - en la carretera (toda esta zona es la de Melanocorypha en verano). Típico campo de alauñidos, poco caducifolio.

- Las cuestas margosas y peladas del Portillo, la línea del páramo roza la carretera. Ha cambiado el terreno los edificios. Aparece la piedra y los escarpes. A ratos podría ser Zaratán, o Mucientes. Desde aquí la zona de Petronia caliza.

El pueblo remonta el cerro.

Coloeus - 2 - 1-2.

Un cernícalo ? o primilla.

Nos adentramos en el valle, ascendiendo algo, la cuesta se cubre de pinar a trechos, y sobre ella revolotean una pareja de Milanos reales, ya en Santiago, pasado el pueblo. (Recordar primero de Sta. María de Nieva (Thymus). Pinares arenosos. (Aquí otras veces Oedipodius)

23-III- Valladolid - La Fraila

Maricas - 2

Terreno bueno para pájaros, zona grande de pinar y tierras y (para Lullula) etc.

Calandrella - vi otras veces. Han aparecido los primeros negrales (P. pinaster), resinados, en el valle. P. pimea ocupa en bosque claro la ladera izquierda del estrecho valle.

Grajas - 2.

St. unicolor - Un bando de 12-14 en el pinar (en invierno charlas) Charros, aquí.

Cruzan la carretera líneas de procesionarias, que voy viendo desde que llegamos al primer pinar, lo mismo en albares que negrales, las procesionarias no fueron vistas en todo el camino hace 2 semanas, pero Carlos señaló las 1^{as}. a primeros de Marzo en el Adaja (a fines de febrero?).

7 - Santiago del Arroyo - Ver Milanos reales. Confundo descripción ambos valles y pueblos.

Golondrinas - 6-4, a la vuelta más.

Cernicalo o primilla - Nido de cigüeñas ocupado. Sigue el valle muy cerrado, con un arroyo aún en el centro.

M. alba - 1

A la vuelta bandos de Sturnus unicolor.

El pueblo de piedra, ya en plena zona caliza. Hay Petronia

Las laderas arenosas, arena fina, limpia, en la que hay algunas viñedos y tomillar. Pinares de P. pimea y P. pinaster. Campos de cereales.

Grajos - 2

Cogojuda - 1

8 - S. Miguel del Arrollo. En la Iglesia un nido de cigüeñas, (echada) a unos 7 ms. de altura. Grajos - 2-2. Golondrinas 10. Pueblo de Piedra.

Este pueblo ^{ve} tiene edificios muy altos, ni el anterior. Sin embargo la cigüeña, y grajos se adaptan a criar en poca altura. Otras veces vistas Petronia y Sturnus unicolor. Bosquetes de chopos.

9 - La subida al páramo, por arenales con viñas entre las capas calizas. Urraca 1, ladera con P. pinaster que se continua arriba.

Alto páramo entre Santiago y Montemayor, carretera transversal. Ya llanura soriana y en muchas partes de La Fraila, aunque hay aquí abundancia de arena (dunas al lado de la carretera) y el pinar es casi solo de P. pinaster, resinado.

Abundan procesionarias.

Dos primeras muy dife. correspondientes a ambas zonas.

Valv. 1952

23-III - Valladolid - La Fraila

A - Arenoso, sin juniperus, escaso o nada de sotobosque. P. pime-
ter en grandes extensiones. Abunda en Grajas. Hay charras y cucos
reales. Veo 11 Fringilidos (Jilgueros algunos). Hay muerdago y
por hende charlas? Probable abundancia de Oedicephus, aunque menos
que en pinar arenoso de la llanura.

B - Ver La Fraila.

A ratos aparecen canchales externos, caliza aflorando, con
Emb. cia? varios en invierno. He visto otras veces pardillos.
Quizá Acanthus?

Las tierras apuntando pedazos que forman montenes (atalayas cerní-
calos, perdices). Algún bosquecillo de albares, donde he visto
cernicalos otras veces. A la vuelta varios maricas, grupos de Gra-
jos con Clamator ♂, perseguido por marica y que había cogido una
procesionaria que llevaba en el pico (a las 18 h. en punto).

Montemayor. Pueblo de paramo sobre piedra y de piedra.
Grajinas - 15

Golondrinas 4-6, a la vuelta más.

Tordillos - unos 10.

Cogujadas - 2-2-1.

Maricas - 3-1.

Exteriores de cereales desforestados. Hay palomares y anidan Pe-
tronia. Un nido pequeño, al parecer reciente, cigüeña echada, en
en el alero.

Despues empezaron enebros, más piedra aflorante y viene La Fraila.

