

Valv. 1952

25-III- Laguna - Pinar

Buen día. Sol algo velado. Dentro de 3 días empiezan las lluvias.

Pinar hasta la Laguna. Recorrido de esta y prados. Mire orugas procesionarias.

Pinar
Chalets - Tordillos cantando. Gorriones y Verdecillos

Recorriendo el pinar, de 9'30 a 12 h:

Serinus - Grupitos pequeños y algunas parejas. Es el ave más común allí ahora. Vi casi todas ♀, pero los ♂ cantaban.

P. major - Unas 2 ó 3 parejas reclamando, localizadas ya. En el caducifolio carretera una debía tener nido, 2'50 ms., tronco viejo de chopo.

P. cristatus - Solo una pareja, en un árbol caducifolio, en mitad del pinar y tierras.

P. pica - Vi unos 3. Reclamando

Picus viridis - Oí, 3 ó 4.

Clamator - Oídos y vistos 2 ó 3. Solitarios, cerca de marica. Esquivos. No chillan mucho, pero si a ratos.

Ya no vi agrupaciones de Paridos invernantes.

Lullula - Una, dibujo, en la cúspide pimpollo, pareja cerca. No cantaban apenas. Oí otro al menos. Es una de las aves más comunes allí.

El aspecto, netamente diferente del de La Fraila, todo P. pinea, algún pimpollar. Un corrillo cercado de P. pinaster, plantado hace poco. Suelo oscuro, invadido a trechos por ¿thymus?, en otros desnudo o con hierbas. Escasos brotes de pinos.

Procesionarias - Extraordinariamente comunes. Un pimpollar, altura media 3-4 ms. recién podado, estaba parcialmente destruido, todos o casi todos tenían en el guion un nido que había devorado toda la hoja.

A esas horas no vi procesionarias. En 3 sitios, agrupaciones de orugas, formando montón informe, al pie de pinos, contanto de 20 a 50 insectos. ¿Procesionarias aún no formadas? en sitios soleados. Estos montoncitos son "ad hoc" para que pase un cuco real.

En pinos viejos menos abundancia de nidos relativamente. Al pie de cada tronco un círculo de entre 1-2 pies sin tamujo, más limpio, pero cubierto de excrementos de orugas, ¿le haran ellos al subir y bajar o la lluvia?

Valv. 1952

25-III - Laguna - Pinar

Al pie de 2 pinos unos pocos (8-3) orugas muertas o moribundas. ¿enfermedad? pronto?, los pinos viejos con mucha hoja, no sufren como los pimpollos. Entre estos los olivados llevan las de perder, comparando con los rastreros incultos, que pueden perder más hojas sin inconveniente.

Saltamontes, pocos, uno col.

Mariposas - de 2 clases. Una col. común a corros. Otra col. solo vi esa. Ambas cerca de thymus.

Reptiles

Blanus - Miré excavaciones análogas a los del crecimiento de setas, todos en terreno puramente arenoso y en las partes ligeramente más húmedas y desbrozadas. Una vez 2 juntos (a un pie) y en una no encontré nada (la más pequeña). En otra, cazando a 3-4 dedos de profundidad 2 Blanus, uno grande ad. que mordía al cogerle. Otro de unos 8 cms. Miré algunos montoncitos más no frescos, y no hallé nada, pero podían de tener Blanus, entre estos más profundos.

Por la abundancia de montoncillos, supongo que cada Blanus hará uno al amanecer para pasar el día. En ese caso es sp. común allí, lo que explica el hallazgo en estómago de Buteo, los sitios en que le encontré son:

Estómago de Buteo, Monte Blanco. En otro estómago de Buteo.

Arcas reales - Arena y arcilla sueltas, muy mezclado con humos laderilla proxima al pinar, húmeda, con algún junco. Estaban bajo piedras. Allí encontré una sps. de chalcides, una vez.

Huerta del Rey - Agujero de grillo, arcilla dura, no fácil de cavar. Abril o Mayo. En un lindero, entre campos de trigo y alfalfa. Lindero con vegetación herbacea.

Los montoncitos de Laguna, agrietadas superficie, aspecto de ser hechos ahuecando debajo. Median media cuarta en círculo o algo más. Ver bien.

Pinar - Laguna

Reptiles.

Lagartijas - una pequeña entre matas de thymus y pimpollos. No vi especie.

Pueblo

Sturnus unicolor - Un buen grupo en el tejado de la escuela (un solo piso) algunos rebasando tejos, probablemente praparan nido. O cantando. Otros tejado de la iglesia. Es francamente común. No creo haya ahora más que en invierno. ¿que viene de los bandos de otoño?. Una pareja y algunos más en los chopos de la carretera, alguno buscaba nido. No hay bando en el prado.

Cigüeñas - 2 parejas, ambas echadas ya. ¿Han puesto?

Primillas - en el prado pareja, probablemente anidan en torre.

Golondrinas - pocas y gorriones.

Valv. 1952

25-III- Pinar - Laguna

Laguna - Se ha secado casi del todo. Es un barrizal verde, con ovas desgajadas. Florecen ranunculos, deseminados en el centro, agrupados en partes que tardarán más en secarse. Hierbas acuáticas por doquier.

En las partes densas typha en los regatos centrales.

Acrocephalus - pequeños, vi unos 3-5, no se sp. Han llegado, no en scirpus de la laguna central.

Emb. schoeniclus - no salía apenas de las espadañas. Vi bien ♀, les llevé delante y salieron al fin unos 6, con pareja de Jilgueros que revoloteaban junto a typha.

Anas platyrryncha - 3 parejas. Estaban en barrizal herboso. Una separada, casa rincón, donde estuvo en 7-III, los otros 2 volaron juntos. Volvieron a tirarse. A estas horas no comen, las ♀ parecen muy claras.

Han desaparecido todos los otros patos.

T. ochopus - Vi 3 primero y luego uno o dos más. !Tonono en Burgos sólo uno o dos!

C. gallinago - Se levantarían unos 20 en total. Andan ~~unos~~ ahora entre typhas, en los bordes de los canales. Dice Tonono hay paso en Burgos.

Podiceps - probables zambullidas en el regato, espadaña densa, posición zatas y ranas, abundantes. Hay bando de unos 30 en Pampliega, oscuros ya, Tonono ve paso claro.

C. corone - andando entre el barro, todo el tiempo 2-4.

E. calandra - posado, canta.

C. frugilegus - No hay hace tiempo, pero ayer Tonono vió en Burgos bandito de más o menos 12.

Gallinula - Ni uno en los Barreros, que está arrasado, 2 parejas (quizá solo una) en laguna central. Se persiguieron 2 veces al vuelo un corto trecho. Vi 2 nadando.

Rallus o Porzana - Uno en Barreros, se escondió en matos de juncos y espadañas, cerca de Rubus.

El 26, a orillas del Duero, mata C. un P. porzana, ♀ ovarios débiles, que salió orilla del río poco después.

Vanellus - Solo vi 2, que desaparecieron. Podría haber alguna más. con Azulones y Gaviotas. Tonono no ve ninguna en Burgos. Ni Carlos ultimamente, ya partidas todas.

Larus ridibundus - 12 juv. muy manchados, alguno con capuchón incipiente. El 28 veo una sobre Valladolid, temporal de lluvias. No se nada del Habanero desde hace un mes casi.

25-III - Pinar - Laguna

Anthus praetensis - Como el de Tonono que se perdió. Pardo, más gris oscuri la cabeza, ceja clara. Tamaño grande. ¿patas cuerno? Un grupito orilla de charca y regatos. No se si habría otras sps.

Saxicola torquata - un ♂ cantando, not, in situ. ver Block. No vi hembra, posiblemente echada en el nido, entre juncos.

Accipiter nisus - Una ♀, volando en círculos, agachaba la cabeza a los ataques de golondrina,

T. ochopus - se levnató inquieto, alto, chillando cerca.

Reptiles, no vi.

Ranas-comunes, grandes, partes espesas. Croan ya. Sólo vi un so-mormujo muy pequeño (1) No vi cintas de huevos de sapo(1). El año pasado por esta fecha había millones de huevos. Hoy no miré bien.

Insectos - Multitud de hemipterus pequeñajos, parecidos a Notonecta Coll. Dipteros pequeños, oscuros, creo pican a millones.

Lymneidos - Muy comunes, grandes, en charquitos y laguna desecada.

Ratas de agua - Barro y charca seca, lleno los canales. Vi un par de ellos. Carlos mata una grande, en el Duero. (Hace 10 días se cogió herizo ♂ ad., lo tengo vivo, en el pinar)

No han llegado aún M. flava, busqué en vano. (El 26, primer Jynx torquilla.)