

Oriolus oriolus.

- 18-V-43 - Las tiró bien a orilla del río.
- 28-V-43 - Veo nido ya hecho.
- 2-VI-43 - Un nido con cuatro crias, apenas encañonadas, en un chopo. Estaba situado a unos 8 ms. de altura, en la punta de una rama fina. Los padres se acercaban mucho y no se movió del nido la madre hasta estar apenas a dos metros de ella. En la acequia del Pinarillo.
- 14-VI-43 - Montemayor de Pililla. Un nido con dos huevos en un pino albar.
- 8-VII-43 - En La Freila, Montemayor de Pililla (Valladolid) en pleno pinar, se encontró un nido, situado en la punta de las ramas de un pino albar. Las ramas eran tan finas que no se podía alcanzar el nido. Los padres protestaban al acercarse al pino. Colgaba el nido de la bifurcación de una rama, y estaba formado por raíces y hierbas mullido interiormente con pelusa. Contenia 4 huevos sin incubar aún.  
Ver nº 32 de la Ooteca.  
Los hemos visto perseguir a M. migrans, Pica pica, Corvus corone, Coracias garrulus, Coloeus monedula.
- 8-VIII-43 - Hay muchas.
- 2-VIII-46 - La Freila, en Montemayor de Pililla. Una cria recién salida del nido.
- 28-IV-47 - Las oimos por primera vez este año. Las hemos observado en los pinares y márgenes de los ríos, más abundantemente en esta últimas. Solo se la encuentra en lugares arbolados.
- 29-V-47 - Me entra un ♂ a reclamo Otus scops. No se tiraba al suelo.
- 14-VI-47 - Una ♀ con el vientre pelado en Montemayor de Pililla.  
Cont. est. -  
- Restos de ortópteros y dípteros principalmente. Quizá algún himenoptero. Un Martis de gran tamaño. Todos ellos eran alados.
- 5-IX-47 - ♂, adulto. Lo disequé.
- 25-IV-48 - Me dice Jolin que ha visto un ♂ en Laguna de Duero. Todavía no los hay a orillas del Pisuerga, en Valladolid.
- 6-V-48 - A orillas del Cega observamos bastantes, algunas parejas y los mas en grupos. Conseguimos dos ♂, con testículos bastante desarrollados y algo más delgados que las ♀, con ovarios poco desarrollados. Deben estar ahora en pleno celo, sobre todo los ♂♂.  
Cont. est. -  
- insectos y pequeñas orugas verdes.
- 5-VI-48 - Conseguimos nido nº 14 con huevos nº 92 de la Ooteca. El nido, a unos 5 m. de altura, en un olmo, en medio de los campos aunque cerca de una acequia, contenia 3 huevos frescos. Observamos el nido por primera vez el 25 del pasado. Cerca del Pinar.



Oriolus oriolus.

- 18-VI-48 - Se pegan dos ♂ y al fin acaba uno por acercarse al nido. No salió la ♀, por lo que la supongo empollando.
- 23-VI-48 - Un nido con 4 crias en cañones y plumón, en un álamo, a unos 6 m. a orillas del Pisuerga.
- 6-VII-48 - Una cria en familia, cerca del nido del día 23 de Junio, que está abandonado desde hace dos días por lo menos. Están ahora comiendo moras.
- 8-VII-48 - Conseguimos otra cria.
- 23-VII-48 - Laguna de Duero. Veo algunos individuos ♂ y ♀, desplazándose mucho. Alguno aún reclama.
- 27-VII-48 - Laguna. Una ♀.
- 1-VIII-48 - A lo largo del Pisuerga, familias acompañados por los padres, o al menos grupos, los ♂ reclaman aún y contestan.
- 3-VIII-48 - Laguna de Duero. Un joven que se tiraba a los campos. Dos días después se reclamaba una pareja.
- 6-VIII-48 - A orillas del Pisuerga conseguimos un ♂? joven!  
Cont. est. -  
- dos avispas y moras.
- 7-VIII-48 - Una familia en ceba y numerosos individuos sueltos.
- 18-VIII-48 - A orillas del Pisuerga cebaban los padres a una cria. No vi más crias, pero vi dos ♂♂ juntos en los frutales.
- 23-VIII-48 - Hay algunos a orillas del Pisuerga.
- 27-VIII-48 - Una ♀ adulta mudada.
- Poza de la Sal (Burgos). Hace 5 ó 6 años no se conocia esta especie en la región; la llaman "gayo".
- 2-V-49 - La primera del año o. El día 9 todavía no han llegado todas, los oo gritan algo.
- 28-VII-49 - Toro. Nido con 3 huevos, en un olmo de 4 ms. de altura. Otras 3 crias grandes. A fines de Julio hay crias en familia y sueltos abundantes. Los padres en los morales, se marchan. Un ♂ del 29-de Julio mudando ya, (20-30).
- 21-VIII-49 - Hay ya menos que antes, según Carlos, aunque veo muchos. Un ♂ acude a gritos pequeños, estaban juntos. Se ve alguna familia, y muchos sueltos. Cantan poco pero reclaman bastante. No se limitan a arcos pequeños.
- 28-VIII-49 - Hay ya muy pocos. Quizá desde mediados se nota disminución, los jóvenes tienen perfecto el plumaje.
- Hasta el 14 de Septiembre los vemos este año. Dice Floro que en Herrera de Pisuerga es muy raro y solo han visto un ♂ (Palencia).
- Aldeamayor de S. Martín. Anidan muchos en los pinares.



Oriolus oriolus

- 30-IV-50 - Dos oo en Zamadueñas. Hemos salido bastante ultimamente, (ayer, anteayer, el 27, etc.) y no los hemos visto.
- 5-V-50 - Aún no hay en el Pisuerga, pero bastantes en el pinarillo. Ayer vi uno en el poniente.
- 6-VI-50 - Medina. Hay pocas en el pinar.
- 16-VII-50 - Familia desperdigada, colicortas, en ceba, no volaban bien.
- 17-VII-50 - La Fraila. Hay casi los mismos o todos. A primeros de mes aun hay familias en ceba.
- IV-51 -- A fines de Abril, hay tórtolas, pero no se ven oropéndolas en la otra orilla.
- 14-V-51 - Las primeras del año, unos pocos en Zamadueñas. El 2 no les había. El 13 y el 15 no las vi en Las Contiendas ni en Laguna.
- 5-VI-51 - Soto Pisuerga, raro olmo, mucho chopo y álamo, el bicho grande más comun.
- 9-VII-51 - Crias grandes en nido nogal, a 3 ms. de altura.  
Fines de Agosto. Hay ya pocas el día 23.
- 10-VIII-51- La Fraila. Bastantes familias, los jóvenes vuelan ya todos - hace lo menos 15 días. Durante todo el mes se le vió comun, quizá más de lo normal por haber probable paso. De los últimos días faltan notas.
- II-52 - Imitaba su grito, a fines de Febrero, Sturnus unicolor.
- 24-III-52- El mirlo del Poniente metia el "que tengo frio" en el canto.
- 19-IV-52 - Pinarillo. La primera del año. Se ve una ♀ y se oyen varios. To ti to tio.
- 2-IX-56 - Pesqueruela. Vistos 3 jóvenes y 1 juv. o o.



1843.

13-VI-43. Un nido a unos 8 m de altura, en chozo, con 4 crías ~~en~~ en los que apuntaban apenas los cañones.

14-VI-43. Un nido con dos huevos recién puestos en un pino albar.

8-VIII-43. Un nido en un pino albar, 4 huevos frescos.

1946. 2-VIII-46. Una familia recién en ceba, que acababa de abandonar el nido.

1947. 14-VI-47. Una ♀ con el niñete peludo.

1948. 6-VI. ♂ terciuclo bastante desarrollado, delgado. ♀ poco o nada maduras.

5-VII. Nido tres huevos frescos. Ya estaba el 25.

18-VII. Dos ♂ se preparan. Tienen nidos. La ♀ empollada.

23-VI. 4 crías en cañones.

6-VII. Una familia. Han salido los críos del 23.

23-VIII. Se desplazan bastante.

1-VIII. Familias acompañados jóvenes. Los ♂ cantan aun.

3-VIII. Jóvenes independientes.

6-VIII. " " "

7-VIII. Fam. en ceba y muchos sueltos.

18-VIII. Ceban una cría. No veo fam.

23-VIII. Han desaparecido todos.

27-VIII. Veo última vez.

1949. 28-VI. Tres huevos en un nido. Otro con 3 jóvenes grandes.

Fines VII. Familias abundantes y jóvenes independientes.

29-VII. Un ♂ adulto mudando.

21-VIII. Ya hay menos. Familias y sueltos. Cantan pero poco reclaman.

28-VIII. Hay ya pocos. Jóvenes perfecto plumaje.

14-IX. El último del año.

AVP.



Llegada. *Oridus oridus*. L. *Oropendola*. pito.

28-IV-47. Oímos un macho.

25-IV-48. Un ♂ en laguna de Duero. No los hay en el Pisuerga. 6-V: Bastantes soto cega empredados

2-V-49. El día 9 de ven más, pero aún no han llegado todas. los machos cantan alps.

Partida. 1947. Hasta el 5 de septiembre.

En 1948 notamos ausencias muy manifiestas el 23 de agosto. 4 días más tarde los vimos por última vez, aunque no dudamos que muchos permanecerían algún tiempo más.

1949. Desde mediados de agosto ~~noto~~ apreciamos disminución en su número. Vimos aún un individuo el 14 de septiembre.

————— bien arbolados

Común ~~o poco común~~ en el los sotos de los ríos y muros de los pinares. En los primeros anida en alamos, chopos y más raramente en abnos, a alturas de 4 a 8 m. En la Fraiche hemos encontrado dos nidos, en pinos albares.

~~Hemos visto nidos con huevos el 14 de Mayo.~~

Puerta. 14-V-43. Un nido con dos huevos frescos.

5-VI-48. ~~Un~~ tres huevos recién puestos. Vimos ya el nido el 25 del pasado.

28-VI-49. Tres huevos. ~~fe.~~



## Reproduccion.

En 1943. a mediados de Junio un nido con dos huevos frescos y otros con 4 juvenes en los que apuntan los cañones.  
Otro nido el 8 de Julio con 4 huevos.

1948. a primeros de mayo los ♂ se peleaban algo entre si y tienen los testiculos bien desarrollados. ~~tan~~ Las ♀ no se aprecia madurez sexual. a fines del mes ya hay nidos terminados.

El 5 de junio tenia ya un nido tres huevos. a mediados siguen las ♀ incubando. El 22 hay crías en cañones, que habian abandonado el nido el 4 de Julio, aunque siguieron por las inmediaciones en ceba por lo menos hasta el 8. Durante todo este mes se ven muchas familias. los machos cuentan aun. a primeros de Agosto se ven juvenes completamente independizados que se van haciendo mas comunes de dia en dia. Hasta el 18 presenciabamos escenas de ceba, aunque ya son raras. Por entonces empiezan a desaparecer <sup>las oopendolas.</sup> sus antos. Es posible que desde primeros del mes haya una emigracion parcial que se acuso' claramente el 23.

1949. a finales de Junio <sup>dos</sup> nidos con 3 pollitos y 3 huevos respectivamente. a fines de Julio abundaban las familias en ceba y juvenes emancipados. Un ♂ adulto muerto el 27 estaba mudando. Hacia el 20 de Agosto ha disminuido el numero de oopendolas, pero aun hay algunas 2 familias en ceba.



*Oriolus oriolus*. L

Común en los sotos bien arbolados y menos en los pinares. En los primeros abunda en álamos, chopos, y más raramente en olmos, a alturas de 4 a 8 m. En la Fraila hemos encontrado dos nidos, ambos en pinos albares.

Llegada.

1947. El 28 de abril vimos el primer ♂.

1948. El 25 de abril vimos un ♂ en laguna de Duero. No habíamos llegado a Valladolid, donde eran ya algo comunes, en el soto, el 6 de Mayo; algunos emparejados.

1949. El día 2 de Mayo vimos al 1<sup>o</sup>, ♂. El 9 aún no han llegado todas.

Partida.

1948. El 23 de agosto es manifiesta la emigración. Hasta el 27 seguimos viéndolas, aunque indudablemente permanecieron aquí algún tiempo más.

1947. 5 de Septiembre.

1949. Apreciamos disminución desde mediados de agosto, 14 de Septiembre.