

Carduelis cannabina.

- 2-V-43 - Haciendo nidos en la 42 varias parejas en zarzales.
- 7-V-43 - Tren un huevo, del colegio Carlos, fresco.
- 28-V-43 - Traen huevos de pardillo, del colegio Salvador, Leneis.
- 22-II-48 - Un individuo muriendo en la nieve, a orillas del Pisuerga. Es raro ver pardillos junto al rio ahora.
- III-48 ♀ A fines de Marzo y primeros de Abril andan aún en bandos, aunque ya se vean parejas, los machos cantan. Hacia el día 20 de Marzo obtuvimos un pardillo con manchas rojas entre el lomo y la rabadilla, o. Me rompió la piel el gato.
- Los pardillos parecen los mas tardios para anidar.
- 15-V-48 - Andan en parejas todos, con nidos, aunque aún no han salido crias. El día 13 observamos un bando de algunos individuos.
- 7-IX-48 - En las laderas de las lomas, grupitos de 3 a 5 en la Cuesta de La Maruquesa.
- 11-IX-48 - Tres individuos. Estos días pasados se veia alguna pareja.
- 19-II-49 - Un grupito de 6 ó 8 en el Cabildo. A primeros de Abril ya llevah algunos pañas. Estan emparejados.
- 21-V-49 - Un nido con crias volanderas en la enredadera del Salvador.
- 27-IX-49 - Un gran bando en La Maruquesa.
- Hasta el día 11 de Octubre vemos grandes bandos en Valladolid, Cabezón, La Fraila, Villabrágima, etc. Hay probabbe gran paso ahora.
- Todo el mes grandes bandos en las viñas de Cabezón.
- Carlos. Invernan en bandos de unos 15, hay menos que Carduelis y Fringilla y Emberiza cirrus. Puede que elijan tierras mas -- abiertas, despobladas y rocosas. Muy localizados. Van mucho con Jilgueros. Según Luis, bandos de 30.
- 2-IV-50 - Un bando de 30. Finca Pinacho.
- 10-IV-50 - En bandos de unos Hay bastantes ahora.
- 11-IV-50 - Castañares (Burgos). Un bando de unos 100.
- 17-VII-50 - Cabildo. Se oyen crias en zarzamoras.
- 16-VIII-50 - La Fraila. Parejas en las viñas. Abundan bastante en este mes, es decir no se nota disminución.
- 24-X-50 - Un bando de 30 con 3 Petronia y 2 Jilgueros, en la Cisterniga, en los cables, y junto a viñas. Ven bandos de Fringilidae. Hay bandos de 15-30.
- 31-III-51- Laguna. Bandos de unos 12 en las tierras, y parejas que cantan y se posan junto a matorrales completamente desnudos. A primeros de Abril se van separando l s parejas, los ♂ cantan mucho.
- 14-V-51 -- Cuestad de las Contiendas. Veo unas 3-4 parejas al menos. Un nido con 4 huevos frescos. Otros quizá aún no habian puesto. Cantan El Fringilido mas común en la campiña.

- Carduelis cannabina

- 24-X-51 - Hasta fines de Octubre, no hemos visto bandos grandes. Ahora hay paso o llegada de Fringílidos, y probablemente de este.
- 24-II-52 - La Freila. Algunos en el pinar.
- 19-V-52 - Laguna. Un bandito de 4, en tapaculos, al menos dos eran machos. Otra pareja de Scipus - prado.

Tude esquivando. hembras anillos.

*Carduelis cannabina*, *cannabina*. (forma típica restringida Luscia).

Ocuída en toda Francia sobre en los Pirineos orientales. Sed, enat, o estival.

Poco regular primavera y otoño, sobre todo en el W. donde es invernante; invernante en crecepa?

~~Proceden~~ ~~consider~~ Diez capturas. cuatro de ellas reconocidas, en la costa oriental.

Solo una de ellas es francesa y del dep. de la Gironda, es decir con toda seguridad forma típica.

Las fechas de capturas, en las 8. que fue se reserba, son todas de paro, menos una invernando (19-I-93) en Valencia. Están comprendidas entre el 15-II y el 16-II. Se distribuyen así: - Barcelona, 25-I,

una en Barcelona. 25-I.

una en Barcelona misma fecha.

5 en Valencia. Entre ellas una invernante y otra de claro paro.

una en Alicante. 16-II.

una en Murcia misma fecha.

una en Córdoba. 3-II.

una en Vircepa.


Todos ellos en localidades situadas a ~~menos de~~ 500 m de altura.

Las capturas señalaban una clara línea oriental, seguida sobre la misma costa.

La presencia de invernantes (y la consideración de los franceses), vidíase que toda la costa es, ademas de ruta, enat de invernantes.

La presencia de un *canabina* típico en el valle del Guadalquivir indica casi seguramente existencia unipolar central, reproducida por la conducta de los franceses. Hay además cita de Bernis en los Sisargas.?

La captura en Vircepa y sus costas sobre paro e invernando. Hay referencias, no se puede pensar por ahora si Noviembre debe ser considerado mes de tránsito.



+ Paro  
± Noviembre.  
● invernante.

II-43. European anise on the Vega.

1947

IV-47. descubierta los nidos

V. 6. Nido 4 huevos en laguna.

VI. 12. Nido Katana hispanas.

~~VII. Medinas. Ya en la laguna.~~

VIII 1, 2 crías pequeñas

" 2, 3 " más grandes

4. Nido 4 huevos col. crías con pedregos

16. Nido <sup>con 4 huevos</sup> con crías grandes

1948.

1949

1950.

*Acanthis cannabina, mediterranea*

Pardillo.

Común en la vega del Pisuerga como nidificante, aunque ~~menos~~ menos que *Serinus*, *Carduelis* y *Chloris*.

Pasa en número escaso en los mismos meses que el jilguero. Anida preferentemente en viñas.

*Acanthis spinus* (L) Uvalo

De paso <sup>invernante</sup>. Poco común

Emigran siguiendo determinadas líneas de arbolado en las primeras horas de la mañana especialmente cuando se extiende una ligera neblina sobre los campos durante los meses de Octubre y Noviembre. Los pajareros conocen bien las líneas de paso de los pequeños bandos de *A. spinus* (que siguen también los más numerosos de *C. carduelis*) a lo largo de las charcas poco pobladas e orillas de acequias y canales, aprovechando para tender sus redes las faltas de continuidad del arbolado.

Algunos úvalos permanecen en bandos durante todo el invierno en grupos de alisos ribereños.

Hemos observado el paso primaveral, en bandos numerosos a veces, en los últimos días de Marzo y a primeros de Abril.

*Acanthis spinus* pasa todos los años, aunque en número muy variable

*Serinus canaria serinus*

Verdecillo

Es muy común de las Frías y de los estivos.

~~¿Sedentario?~~ Cria abundantemente en arboladas, huertas, carreteras y sotos.

En invierno nos encontramos reunidos en bandos heterogéneos con *E. corla* y *E. montanus*, diseminados por tierras salicadas de arbolado.

Empiezan a volar de los sotos de las cañales, sobre las charcas de agua, los cazan los pajareros

AVP