

Muscicapa hypoleuca.

- 2-IX-42 - Mata Luis dos capicos. Había bastantes.
- 28-IX-42 - Se mata otro.
Ver colecciones de pieles.
nº 12. o, 1-V-47 - Valladolid. Con plumaje estival.
nº 13, o, 2-V-47 - " . En paso.
nº 14, o, 3-V-47 - " " " ,

El paso en primavera que tiene lugar en los últimos días de Abril y primeros de Mayo, es mucho más corto que el de otoño. Durante el paso, que no es ni la mitad de abundante que en el otoño, se ven muchos individuos de librea blanca y negra, aunque son menos abundantes que el resto. He visto algunos de -- estos individuos ¿o? cantando alegremente. El paso lo realiza junto con el de M. striata.

- 25-IX-43 - Un capico muerto.
- 25-IX-43 - Hay bastantes. Tres muertos.
- 10-X-43 - Se mata uno.
- 17-X-43 - Se mata uno.
- 18-IV-47 - o, se ven algunos durante este mes, y algunos a primeros de Mayo.
- 19-V-47 - o, ala, 83 mm.

Durante el mes de Septiembre se ven a montones, aunque empiezan a pasar en Agosto. El 3 de Octubre se ven bastantes y a mediados de mes se han mezclado casi todos. Se ve alguno a fines de mes, aunque rarísimo. 26-X-47.

Mas bien que paso, considero la presencia de M. hypoleuca como de estancia provisional. He cazado a fines de Septiembre un individuo al que solté anillado. Se mataron en el mismo lugar de la suelta el día 9 del mes siguiente. Algún otro pájaro al que conocíamos por alguna señal particular, ha permanecido un mes en el mismo lugar. Durante el paso de esta ave, tenemos la certeza de encontrar a tal o cual individuo en un lugar determinado. Es de presumir que fuera el mismo individuo.

Se le encuentra por todas partes donde halla árboles y matorrales. No van en bandos, si no en grupos muy diseminados. Sin duda es el insectívoro más abundante, a excepción de Ph. trochilus, y se ven varios individuos donde quiera que se mire. Gusta mucho de posarse en las ramas bajas y limpias de los olmos, pinos y matorrales. Desde allí salta a tierra, coge un insecto se vuelve a su sitio u otro análogo. Persigue a los insectos revoloteando. No les gusta cruzar espacios abiertos, la distancia más larga que les he visto hacer ha sido la que separa los márgenes del Pisuerga, en Valladolid.

Muscicapa hypoleuca.

- 2-V-48 - Observamos algunos individuos sueltos, los primeros de este año. Se ven al mismo tiempo Mus. striata. Este año parecen ser más escasos que estos últimos.
- 3-VIII-48- Se ven algunos individuos a orillas del río, me pareció observarles el día 29-de Julio. Ahora tengo la certeza absoluta. Vemos hoy bastantes en Laguna de Duero. El paso es casi simultáneo con el de Phy. trochilus.
El día 13 de Agosto conseguimos el primer joven que veo, con el pecho manchado, y por esos días observamos alguno más, también joven. Les hay viejos, probablemente más jóvenes.
- 18-VIII-48- A orillas del Pisuega hay muchos, oyéndose su canto por doquier. No he notado jóvenes. El mismo "de gala" (come en primavera). Es el primero que hemos observado en otoño. Hay muchos corrientes allí.
A primeros de Septiembre hay muchos, se posan en los pinos muchas más que M. striata, que está ahora en pleno paso.
- 12-IX-48 - Hay muchos ahora, probablemente cuando más. A fines de Septiembre hay en abundancia. Todavía a primeros de Octubre se observan ya muchos menos. Hacia el 15, su número es aún menor.
- 20-X-48 - Vemos algunos individuos.
- 24-X-48 - Solo vemos un individuo, tras de haber mirado bien unos 3 km, del soto del Pisuega. No volvemos a verlo.
- 12-IV-49 - Nos pareció un ♂ en librea, imperan, uno visto en las Moreras.
- 18-IV-49 - Laguna de Duero. Vemos algún ♂ en la carretera. En los días siguientes siguen pasando por la orilla del río. Reclaman pero no los he oído cantar. Un ♂ muy grande (ver mediados) es de la forma típica, como otro de esta fecha.

El 23, estaban en paso muy cruzado. Es ahora común. Ningún año hemos visto tantos ♂♂ en librea imperial. Algunos tienen la frente negra, todos la forma típica. Hay quizá más o que o.
- 12-V-49 - Sigue el paso muy nutrido, probablemente el máximo. Dos días después ya no se veía ninguno apenas. El 7 no quedaba ni rastro de ellos ni de los otros pasantes. El día 12 aún se veía alguno.

Desde mediados de Julio vemos algunos, con duda. Alguno parecía o en librea de verano.
A mediados de Agosto, pleno paso.
- 12-VIII-49- Uno en librea de invierno, bien emplumado anillado.
RADOLFZELL GERMANIA H31241
- 21-VIII-49- Siguen en paso. No son muy numerosos.
- 28-VIII-49- Puede que haya cedido algo el paso.

A fines de Septiembre, gran paso.
- 3-X-49 - Villabrágima. Solo dos. ¿terminó el paso?
- 11-X-49 - Vemos aún algunos.
- 27-IV-50 - En el pinarillo, tres o cuatro o, librea de verano.

Muscicapa hypoleuca

1-V-47 ♀ Valladolid.

♂ en paso primaveral.

El obsipillo sin mudar. Remiges no mudadas tectrices alares no mudadas.

Ala derecha - 78 mm. Izquierda 78 mm.
Cola 51 mm. Ver dibujo con manchas

48 - Toro (Zamora).

♂ adulto, plumaje a medio mudar aunque predomina el nupcial.

Ala derecha 74. izquierda 73 mm. algo encogida en la preparación.
Cola 52 mm. Ver dibujo manchas.
Las primeras remiges están en muda.

La banda blanca de las remiges es mucho más ancha los dos "tipicos" de paso. Ver dibujo.

Las coberteras inferiores del ala son blancas y no amarillentas grisáceo como en los de paso primaveral.

21-IV-49 - ♂ en paso, más mudado que el de 1947, conserva plumas pardas en el obispillo y cabeza.

Ala derecha 82 mm. izquierda 82'5 mm.
Cola 54 mm. Ver dibujo manchas.



En el de 1-V-48, la mancha frontal igual. Remiges más manchadas.

Rectrices. 1ª derecha mucho más blanca.
2ª derecha bastante
3ª derecha negra.

Izq. dere. 1ª izquierda, negra.
2ª " algo blanco.
3ª izquierda, nada

La cola es mucho menos blanca que la del dibujo.


Muscicapa hypoleuca.

- 5-V-50 - En la otra orilla, algunos con plumaje nupcial.
- 23-VII-50- La Fraila. -primero amontonaron poco a poco, y ahora (17 -VIII) hay bastantes. Se notó más abundancia con la llegada de M. striata. Están en corrillos.
- 8-IX-50 - Todo el mes, poco abundante.
- 6-X-50 - No he notado disminución del paso Pisuerga.
- 18-X-50 - Aún no veo.
- 24-X-50 - No se ven en Tudela.
- 15-IV-51 - La Fraila. Un ♂, librea de verano.
A fines de Abril, en paso bastante denso.
- 14-V-51 - Paso aún bastante intenso, aunque hay menos que M. striata.
ultimamente todas las que se ven son ♀.
- 16-V-51 - Cobrada una ♀.
- 18-V-51 - Sigue viendose alguna ♀. Cobrada una.
- 19-V-51 - Ya no veo ninguno en el soto, pero siguen striata.
- 27-VII-51- Corcos, los primeros juvs., pecho manchado y ad. (Nota).
- 1-VIII-51- La Flecha, 2 establecidos en distinto sotos de unos 50 ms.
- Agosto: La Fraila. El día 10, había algunos, el 12, cada vez más numerosos y distribuidos. El 18-20 eran ya abundantes y se les veía en corrillos con Ph. phoenicurus, por todo el pinar. Hasta fines de mes creció aún más su número.
El día 23, se cazó un juv. con librea juvenil y se vió, sin fecha alguna, o ad. librea nupcial. Es difícil distinguir los juv. - librea juv. en el campo.
- En total se vió en paso desde el 27 de Julio, aumentado hasta la plenitud a mediados 20 de Agosto. Paso intenso hasta mediados de Septiembre, más bien hasta finales y cada vez menos común. a primeros de Octubre se vió aún uno el día 21 en Valdestillas, con duda.
- Durante todo el mes de Septiembre, muy comunes. A mediados vi muchísimos. A primeros de Octubre hay menos. Aún el día 13 se ven bastantes en el soto pero el 14, no les vi en el pinar ni - Monte Blanco. Con duda uno el 21 en Valdestillas. ~~Ya no los~~ días 28, Laguna y 31 en Monte Blanco.
- 1952 - Zaratañ. Según Luis, vió el primero el día 9 de Abril, no muy seguro.
- 2-V-52 - Un ♂ hibericae? Solo 1ª rectriz externa con blanco. Nota y piel.
- 18-V-52 - Cobrada ♀, en el sotillo, gorda, ovarios débiles, la única que se ve.
- 19-V-52 - Vista otra ♀ en el sotillo.
- 27-VII-52- Los primeros del otoño, dos en el soto del Gabildo.
- 30-VII-52- Hay ya bastantes.

~~XX~~

En el de 1-V-48. la mancha frontal
igual. Remiges + manchados.

Pectrices. 1^a derecha. medio blanco. (Fig. ~
2^a " " bastante. (v Fig.)
2^a " " Negra.



izq. 1^a izquierda, Negra
2^a " " algo blanco.
3^a " " nada.

lo color es mucho - blanco que lo del
dibujo.

Muscicapa hypoleuca

Muscicapa hypoleuca hiberiae. #

♂ adulto. plumage a medio mudar aunque predomine el nupcial.

Tovo (Zamora) 48.

Ala. 74 ~~derecha~~ ~~izq.~~ — 73. ~~mm izquierda~~, ~~pero~~ ~~ellos~~ ~~curvado~~ ~~en~~ ~~la~~ ~~preparacion~~

Cola 52 mm. Ver dibujo manchas.

Las nuevas rémiges están en mudre.

La banda blanca de las rémiges es más ancha los dos tipos de Javo. Ver dibujo.

Las coberturas inferiores del ala son blancas y no amarillentas grises como en los de Javo primitivo.