

Caprimulgus europaeus europaeus

- 12-VI-42 - La Fraila (Montemayor de Pililla) Dos huevos, con feto muy - desarrollado, yaciendo directamente en el suelo en una pequeñísima depresión. Ver Ooteca nº 20.
- En La Fraila se ven algunas parejas de C. europaeus durante el verano. Es desde luego menos abundante que C. ruficollis, quizá en una proporción de 1 a 5, aunque es muy aventurada -- esta cifra.
- Respecto a esta especie nada hay que añadir que no se haya -- dicho de C. ruficollis. No hemos apreciado diferencia en sus costumbres. Prefieren lugares más cerrados de matas.
- 13-VI-42 - Del huevo, que quedó en el nido descubierto ayer día 12-VI de 1942, ha salido un pollo ya.
- 27-IX-42 - A orillas del rio, junto a los corros, un individuo revoloteando. Lo tardío de la fecha y el lugar parecen indicar pertenencia a esta especie.
- 28-IV-47 - Se metió uno en la biblioteca de la Universidad. Es el más pequeño y negro que hemos visto, por lo que supongo pertenecerá a esta especie.
- 22-VI-47 - La Fraila. Una ♀. Conservo la piel, muy destrozada.
- 8-V-49 - Medina del Campo. Mató Luis en el pinar una.
- 10-VII-49 - Medina. Un nido con dos huevos frescos, nº 132, o o long. cola - 192. En un pinar una tierra abandonada junto a una juv.
- 7-IX-49 - Monte la Reina. Un individuo, ya mudado creo; en piel. Tres juntos. Están ahora en paso. Enviado a Bernis.
- 14-IX-49 - Resulto ser un típico. (Carta del 18-IV-50)