

Alcedo athys hispidus L.

- 7-V-43 - Descubro nido, pongo lazos. Puente Colgante.
- 17-V-43 - Cerca del P. colgante un nido donde chillan las crías.
- IV-47 - Primeros de Abril. Andan por donde suponemos está el nido.
- 5-VI-47 - Le parecen a Luis deshabitados.
- 10-III-48 - A mediados de Marzo andan haciendo tonterías por parejas.
- 18-IV-48 - Conseguimos 3 huevos, nº 80 en la Ooteca. El nido, a orillas del Pisuerga, en un terraplen arenoso bajo unas raíces y a 3 ms. del río, tenía la entrada cubierta de excrementos y muy húmeda. La cámara de fondo irregular y abovedada, tenía el piso cubierto de una capa de espinas de peces y restos de cangrejos de un par de cms. de altura, quizá, y muy secos, excepto en la parte donde ensuciaban las crías hacia el fondo. Contenía 4 crías, al parecer recién salidas, con los ojos cerrados y la mandíbula inferior algo más larga que la superior (un par de mm. a lo más). Al pie del nido una mosca y algunos moscones azules a la entrada, que podían haber muerto de frío, atraídos por el olor. No había restos de libelulas ni otro insecto, y las crías contenían pececillos (uno por barba) de unos 6 cms. gragados enteros, los huevos tenían el feto muy desarrollado. Al parecer, los padres están construyendo otro nido a poca distancia del robado, le empezaron a las tres días de destruirle el anterior.
- 23-V-48 - Un nido con 7 crías, en el tercio superior de un terraplen -- arenoso, a orillas del Pisuerga, la boca estaba seca, y en la cámara no se observaban restos de cangrejos, las crías en cañones, sin asomar la pluma que ya se veía dos días después. La entrada muy larga y la cámara espaciosa y regular. Terreno blando.
- 27-VI-48 - De aquí a Zamadueñas encontramos muy pocos a lo largo del río.
- VII-48 - Fines de Julio, los escasos individuos que se ven a lo largo del Pisuerga son muy desconfiados, a primeros de Agosto se observa lo mismo. Dos individuos persiguiéndose y casi todo el día juntos. Esto es excepcional ahora.
- IX-48 - A fines de Septiembre hay bastantes más que en otras épocas - en la isla de los Frailes. Durante la primera mitad de Octubre aún no ha terminado de mudar las auriculares. Están preciosos ahora.
- 1-XI-48 - A orillas del Pisuerga, matamos dos. Uno más grande con la pechuga manchada de gris y pico corto y globoso. El otro tenía una pluma en muda y era precioso. Durante todo este mes hay relativa abundancia. En el mes de Noviembre son bastante más abundantes que en otras épocas. Sólo en la tabla de arriba vemos 8 individuos, en parejas casi todos, el día 14.
- 6-III-49 - Una pareja haciéndose el amor en el Pisuerga, la ♀ posada en la orilla, mientras el ♂ da vueltas delante de ella a lo largo del río. Chillando continuamente.

Examinados el 7, encontramos.

♂, mayor tamaño, pico que la ♀. Color más azulado en el dorso y más anaranjado en el pecho. Testículos desarrollados. Base del pico negra.

o, menor inferior rosa asalmonado, vientre casi blanco y pecho muy claro. Mas verdoso el dorso. Ovulos desarrollados.

En ambos las patas de un naranja vivo, mucho mas vistoso que en ninguna otra época.

JAV

Alcedo athis hispida. L.

- XII-49 - Uno en el río, había comido muchas quiquillas, y algún pez.
- 6-III-49 - La longitud del pico en el ♂ es de 42 mm. (desde las plumas, fig.) y en la ♀ 43 mm.
- 14-III-49 - En la tabla superior una pareja y un solitario. Matamos una ♀ long. del pico.
- 16-III-49 - En la isla de los Frailes, una pareja ha empezado ya el nido, en un pequeño cortado. Matamos una ♀ de vientre muy rojo y patas menos anaranjadas que las otras, la mandíbula inferior sobrepasa en 2 mm. a la superior, que parece esta. longitud del pico, 45 mm. 47 en la superior. El nido empezado tiene 45 cms. de profundidad.
- 9-V-49 -- Llevan cebo los padres a un nido entre raíces a 1^h35 ms. -- sobre el río, cerca del Esgueva. Hoy otro nido en la Fuente de la teja.
- 15-V-49 - En la otra orilla nido con puesta fresca, 6 huevos. Ingresaron, nº 102.
- 7-V-49 - Viana. Llevan cebo los padres a un nido. Durante todo este mes están cebando las crías, en nidos.
- 10-VI-49 - Un padre con cebo. No parecen haber salido las crías.
- 15-VI-49 - Burgos?. Tres nidos con huevos, al parecer hueros. La ♀ les incubaba.
- VIII-49 - Hay pocos y muy espantadizos. No gritan casi nada y quizá solo al atardecer.
- 25-VIII-49 - Un joven del año mudando a librea adulto. Alas y cola en muda, pecho manchado, por las plumas arenosas que aparecen sobre los blancos. Pico negro. Conservan plumas junto al pico. ¿Seguro que juv. del año?. Era un ad. probablemente o.
- 7-IX-49 - Un adulto, muy buen plumaje. o
- 7-XI-49 - Joven del año? plumaje de adulto, muy bonito. Hay pocos pico enteramente negro y patas poco brillantes. o.
- 2-XII-49 - Unvo, pico inferior anaranjado, en las orillas del río, cambios de plumaje, conservo dibujos.
- 8-III-50 - ♀, ovulos poco desarrollados, Estan emparejados ya. A mediados de marzo otra ♀, ovulos poco desarrollados, las ♀ ♀ tienen todas o casi todas el pico naranja, los ♂ negro.
- 13-22-IV-50 - En el Adaja, con cebo en el pico.
- 6-X-50 - En parejas, muy bien emplumados, dos tabla alta. A fines de Octubre sólo mas abundancia tabla alta.
- XI-50 - Fines de Noviembre, vienen al charco del regato.

Han faltado del todo o casi del todo durante este invierno en las Moreras. No me han traído ninguno a disecar. Habrá habido desplazamientos? Fines de Marzo del 51.

Alcedo athis hispida L.

- IV-51- A primeros de Abril. Han anidado frente al Cubo, en el cortado.
- VIII-51- A fines de Agosto, en el Cabildo y hasta los 3 Hermanos, solo vemos uno, en dos tardes en barca, lo mismo de raro en juncos y arroyos. A parte su poca ostentabilidad ahora, creo que indudablemente hay pocos. ¿Donde demonios se marchan los juv? Porque hacen su aparición en Octubre, ya mudados o en muda.
- 19-IX-51- El Cabildo. Cobrado uno con la muda manifiesta en escapulares y espaldilla y sobre todo en la cabeza, principalmente en cañones. Peces pequeños, alrededor de 3.
- 21-X-51 - Valdestillas. Oigo uno.
- 15-XI-51- Valdestillas. Uno en la confluencia, Salix, después pequeña crecida del rio.
- XII-51- Hay uno en el regato nuevos a fines de mes 20-30, veo varios días pero cuando la nevada, que duró helada 3 días a fines de Enero unos 25, no le vi ya.
- 13-III-52 - Traen un ♂, testiculos, . . . Aún tienen una pluma vieja en el centro de cada ala y - las cob. escapulares.
Cont. est. -
- espinos peces. 3 Hermanos.
- 31-VII-52 - 2 ó 3 crias que se dejaban acercar a unos 4 ms. en el Cabildo, Overuela.
- 13-VIII-52- Cabildo.
o, pico negro, terminando muda de la cabeza y en plena del dorso y obispillo.
Cont. est. -
- 2 Rutilus, probablemente arcasi, se vieron 3 mas.



Martin pescador
Alcedo espicus

Valladolid.

12-44.