

Picus viridus

- 11-V-47 - Un nido con huevos en un chopo a poca altura.
- 4-VII-47- Una familia, a orillas del Pisuega. Volaban bien los juvenes.
- 10-I-48 - Un bando de unos 12 en Tordesillas.
- 6-V-48 - Un nido con 5 crias en un chopo, a unos 5 ms. de altura, en las orillas del Cega.
- 22-VI-48- En el pase de las Moreras un nido. Las crias completamente desarrolladas ya, asoman la cabeza por el agujero, y llaman incesantemente. Intentaban picar un abejarruco azul de la madera que se aventuraba mucho.
- 27-VI-48- Observamos bastantes individuos a lo largo de las orillas del Pisuega, hasta Cabezón. Abunda más que Dryobates major, del que no vi ninguno ejemplar.
- 9-VII-48- Hay al parecer crias juvenes. Andan dispersos por el soto del Pisuega y son muy numerosos relativamente.
- En Agosto hay pocos y muy escamados.
- 1-XI-48 - Valladolid. En el Cabildo vemos 7 casi juntos, próximos tres de ellos se persiguieron jugando, o bien emplumada. Cont. est. -  
- Hormigas aladas en cantidad.
- Enero. Duermen en los arbolados, rio arriba, donde se reunen tordos, maricas y multitud de pájaros, a orillas del Pisuega.
- I-49 - A mediados de Enero de 1949, en la Laguna de Duero, por el terreno y en pequeños grupos de unos 5 individuos. Durante el invierno frecuentan menos los arboles.
- III-49- Primeros de Marzo. Pocos a orillas del rio.
- A mediados de Marzo juegetean y chillan mucho. Indudablemente se están emparejando.
- IV-49- Primeros de Abril. Merodean ya alrededor de puntos limitados. El 10, en La Fraila topó uno junto en un agujero. Probablemente que huyen el nido.
- 20-IV-49- Burgos. Estepar. En un sauce a 1'50 m. un nido. La madre salió "Alrededor del nido un montón de serrín".
- 9-IV-49- Burgos. Otro nido. Salió o, o cerca en un álamo a 3 m.
- 8-V-49 - Medina del Campo. Solo un huevo muy fresco en un nido a
- 14-V-49 - Otro nido, con un huevo fresco.
- Por ahora, 15 al 25 de Mayo, puestas completas en Burgos.
- 13-VI-49- La Fraila, el primer joven que veo; o, con manchado plumaje juvenil y rojos cresta y bigotes. Hay por ahora muchos en Burgos.
- VIII-49- Solitarios a orillas del rio. Chillan poco.

Picus viridis

- 4-X-49 - Villabrágima. . En cañones pelechando. Otros dos vistos el 5.  
buen plumaje. Artero.
- 13-XI-49 - En la dormida, 6 en grupo. Muerto un ♂.  
Cont. est. -  
- hormigas negras  
Vemos parejas a lo largo del rio. Ala.
- 3-XII-49 - Palencia, o, ala.
- III-50- A mediados de Marzo, aún no deben estar emparejados.  
Según Justo, en La Fraila es bastante más común que Dryobates  
major.
- 23-IV-50 - Los nidos están muy rozados.
- 7-14-V-50- Un nido con huevos, feto bastante desarrollado.
- 13-VI-50- Un joven, ♂, bigotes muy rojos y plumaje manchado.
- 1-VII-50 - El Sotillo, un joven ♂, bigotes negros, con algo de rojo en los  
extremos.
- 8-VII-50 - Otra ♀, juv. en el mismo sitio. Sin rojo en bigotes.
- 15-VII-50- Otra o, juv. en el mismo sitio.
- 15-VII-50- Otra ♀, juv. en el mismo sitio. Sin rojo en los bigotes.  
Anda esta familia reunida. Son poco desconfiados relativamente.
- 4-VIII-50- La Fraila. Bastantes sueltos por las tierras.
- 13-VIII-50- Dos oo, joven y adulto. El último mudando plumaje desgastadí-  
simo, parece gris que predomina en el cuello. El joven con  
plumaje manchado que desaparecerá ahora sin duda.
- 3-XI-50 - A las 17:30 h. entra a dormir uno en una tumba.
- XII-50 - Ver charro
- III-50 - Se oye su grito con más frecuencia, lo mismo a fines.
- 2-V-51 - Salíó uno de un nido.
- 13-VI-51 - Yo veo una familia fuera. El 15 sospecho que otra, ese día nido  
con crias pequeñísimas.  
Ver notas de este verano.
- VIII-51 - Segunda quincena de Agosto, cobrados 2 ad. con el plumaje estro-  
peadísimo, empezando a mudar. Pocas aves se quedan tan feas -  
antes de la muda. (Hay notas).
- 14-IX-51 - Villa Ester. Cobramos un juv. medio mudado o ad. alternadas-  
en el pecho las plumas manchadas y uniformes.
- 2-X-51 - Sotillo. Cobrada una ♀ juv. de este año, aunque solo le que-  
dan ya del plumaje de joven manchadas en las nalgas (los tie-  
nen también los viejos). Conserva cañones, ya desapareciendo,

Picus viridis

- 2-X-51 - en todo el cuerpo sobre todo en la cabeza que aún no está -  
bonita. En las alas están en crecimiento (apuntando) la 1ª  
y 2ª remiges ya muy crecida y las coberteras inferiores.  
El vivo verde de las remiges es más pardo dorado que en las  
tectices y coberteras escapulares. Cola perfecta. Iris par  
do con borde blanco no muy visible.
- 19-IV-52 - Entran en 2 nidos en el Pinarillo. El día 20, otros en nidos,  
La Fraila.
- 2-V-52 - Cogido un ♂ en nido, anillado, con 7 huevos algo incubados, -  
Ooteca nº 182.
- 16-V-52 - El Sotillo. Un nido con crias, que no se examinan.
- 19-V-52 - Sotillo. Parece tocarse huevos en el nido que robamos el 2-V.  
Serán de pico el 20 ingresan ooteca nº 182 B. los 6 huevos  
puestos del mismo nido. El ♂, se coge con lazo, El día 25 de  
Junio, vuelve a tener huevos el nido, 6 frescos.
- 5-VI-52 - Nido pero robado 2 veces con 6 huevos frescos.

♂ ad. Plumaje bueno.  
Cont. est. -

- Hormigas pequeñísimas, de color miel oscuro.  
Imposible contarlas, pero agrupando en blo-  
ques de unos 30 me salen 2100, más bien con  
exceso. Pongamos 1800.  
También una pata de coleóptero.