


Gyps fulvus

- 1-X-48 - Zaratán. Unos 20 en una mula muerta. Al tercer día de echarla ya no tenía carne.
- En Noviembre encontramos bastantes en Zaratán en ganado muerto.
- 26-XII-48- Villabañez. Una ♀ adulta, con carne, junto a una mula muerta. Conservo piojillo, que sujeta las liendres, unicamente en las pequeñas coberteras inferiores del músculo del ala, en ambas.
- 15-IV-49 - Burgos. Uno entre los Neophron del Penal, probablemente Gyps, quizá Aegypius. Sigue allí a fines del mes.
- 21-V-49 - Zaratán. Muchos, mas que alimoches. en un mulo muerto. Bando de unos 60.
- 13-VI-49 - La Fraïla. Pasa uno rozando la ladera al atardecer. Parecía oscuro. Probable Aegypius.
- Mesa de Oña (Burgos) cerca de los M. obarenes o en ellos, vio Felix una colonia anidando en repisas, de un cortado. En San Pedro de Arlanzon, donde los vio Leneis, me dicen anidan, En ambos sitios hay Pyrhocorax.
- 26-X-49 - Poza de la Sal. Me mandan un ♂, long. T. 1155. Enverg. 2632 mm. Ala 680, cola 290 mm. Abundan allí. Completamente mudado el cuerpo, algunos (3 ó 4) remiges nuevos aunque las otras no estan muy desgastadas. Cabeza pequeña, cuello y cabeza muy emplumados, coloración muy canela. Cola desgastada. Probablemente joven.
- 24-XII-49- Un ♂ juv. Ala, 710. Cola 312.
- 9-IV-50 - Zaratán. Hay 6 en una mula. Hace 7 ó 10 días hybo bastantes. Villalba de los Alcores (Palencia). Van muchos. Villanueva de los Caballeros (Valladolid). Van muchos.
- 31-IV-50 - S. Pedro de Arlanzon. Se reunieron hasta 16 sobre los nidos. Ver Fotos. Entraban en ellos. Van muchos.
- 9-XI-50 - Cabezón. Tres solitarios.
- 5-V-51 - Torremormojón. Me traen uno de un bando de unos 20 que se reunieron sobre una mula muerta. Menos de 10 alimoches.
- Altos de la Horca (Santander), con ganado. Teverga (Asturias) disminuyeron cuando se echó estricnina a los lobos, en el 34 ó 36.
- Burgos. Pancorbo, anidando Gyps, La Mesa de Oña, anidando 20-40 parejas.
S. Pedro de Arlanza.
Vemos 3 cerca de Torquemada, Palencia, fines de Noviembre. (Ver fecha por pieles de jilguero. A primeros de Enero me dicen se tiran a un nido en Quintenilla de Onésimo.
- 10-V-52--- 6 volando sobre las cuevas de Fuensaldaña. Ahora más en alguna mula muerta.
- Valdelateja. Posados en los cantiles y volando en fechas 3-IX-50, 11-VII-49 y 9IX-49. Probablemente anidan. 15-VII-50.
- 8-IX-56 - Uno volando sobre S. Martín de Valben.



color de la parte
detrás del cuello

color de los
tórax

Gyrfalco fulvus
Valladolid 27-XII-48.


JAV



7.

Gyps fulvus. juv. 21-III-53.

El pico corto y globoso en
principio se ve alargando



Gyps fulvus, demando
22-III-53

W

Gyps fulvus.

22-11-53



22-11



24-II-53.

actitud de
mediosidad

May. 22-V. de un pequeño F. anser, plumas.

anapularias; quindos con secundarios completos 2 o 3 filas.

Remes 1^{ra} y 2^{da} con intermedias (A)

Intermedias 4 o 5, cola.

Das líneas del marco (c-c). Parte sup. de la goba.

y en las partes inf. los dos medios del pecho.

los empiezan los ocupulares, la goba y los remes. Todo
 7 días de coque ya está así.

Este es el estado de desarrollo del quinde al
 coque, pero sin tanta así. ya que este está retornado por
 mala alimentación.




Cygnus fulvus.

Les nageoires d 29-III-53.




activité de nageoires.

24-III-53.



24-III-53.
Cygnus fulvus.





Yellow-billed
Cuckoo
1958




Gyps fulvus
polo.

1953.


Geopelia striata ♀ ad.

212


522 ~



entre muscles et
squelette de
squelette




del uat.



JAV

long. p. [1] teste
= long. partie tressée.



laque de buco,
23-III-53.

hirsute

la long. total. corne [1].


JAV

22. III. 53



JAV

La coltura, es la del n^o 7.



Ver detalle de esto.



CC-11-53

JAV'

Laque
22-III-53.

22-III-53



casi este pote.

Cahallo, medio comido
por los perros y gupis.

[JAV

est

Arlos 25
quid / pueris

Gyps fulvus. 2-X-50.

Capote. E los Jaamicos. Un bardo de 8, sobre dos nubes, el 1er dia.

Capote. Un bardo de uns 50-100 en Villakor, al tier 18 orpis muertos.

long. - 111'2 cms. $\xrightarrow{\quad}$ 255 cms \leftarrow ala 703 mm Cole. 31'2.3 cms.

Puntas alas despartidas, medida rapis. Ala codo - colecteus escapulares 7 anniger.

Fulvipes d 2-X acc bectue.

350 pts.


Felis Nicto. S. Felipe Neri. 345.

2-X. Castro. Hizo.


Fig. 5
avis defectiva




1^a




2^a



2^{ab}



4^a




4^{ab}


F.B.

Fig. 6

1ª




2ª




aculado y calvo

4ª



manchas a lo largo!

5ª



F.B.

capia defectuosa