

Streptopelia turtur, L.

- 7-IX-42 - Hay tórtolas.
El mismo día una en el canalillo.
- 1-X-42 - No se ven en ningún sitio.
- 29-X-42 - Una pareja el día 1, no tengo anotado "no se ven tórtolas", lo que indica que es excepcional la cita.
Ve Luis 2.
- 15-20-IV-43- Las vemos por primera vez en Valladolid, una pareja.
- 14-VIII-43- Sobre un sauce, a unos 4 ms. de altura sobre el río un nido bastante visible con dos crias en cañones. Es la primera que crío. Ya tarde para crias.

Un nido con crias apenas emplumados. Salix.
- 13-V-43 - Hay muchas a orillas del río.
- 5-IX-43 - Las vemos en bandadas.
En La Fraila (Montemayor de Pililla) anidan en los pinos -- bajos en bastante número. Parecen anidar más tarde en el páramo que aquí, en el mismo Valladolid. A mediados de Agosto hay bastantes nidos con crias y aún huevos, junto con C. palumba es el que más tarde anida.

En Septiembre se reúnen en bandos de casi un centenar de individuos, aunque generalmente solo son de 20-30. ¿Estos bandos están localizados en los lugares de cría? En Octubre, con la llegada de las de paso, se extiende por todos lados, a lo largo de los ríos, etc.
La Fraila, un individuo muy pálido en Septiembre. Ala seca, 162'5 mm. Dice un payes que son todos así en Baleares.
- 28-IV-44- Las vemos por primera vez. ila.
- 3-IV-46 - Cría en cañones en La Fraila.
- 20-IV-47 - Se las ve en parejas. El
- 10-V-47 - Muy abundantes a orillas del Pisuerga. Deben estar en pleno paso.
- 20-V-47 - En parejas.
- 3-VI-47 ♀ En el paseo de las Moreras hay parejas e individuos sueltos en las ramas altas.
- 10-VI-47 - Varias parejas a orillas del río. Vi un nido empezado.
- 11-VI-47 - Arrullándose, seguramente en el nido. La pareja llamaba desde la punta de un chopo cercano.
- 12-VI-47 - Un huevo roto, en las Moreras.
- 4-VII-47 - Una pareja. Aún no hay crias.
- 8-VII-47 - Herrera de Duero. Un nido con un huevo.
- ~~15-VII-47 - En los pinos en cañones, en pinos en cañones.~~

Streptopelia turtur. L.

- 12-VII-47 - Un nido con dos huevos.
- 16-VII-47 - Dos pollitos chiquitines, en plumoncillo.
- 17-VII-47 - Una cria bastante emplumada.
- 18-IV-48 - Una pareja, los primeros de este año, en Laguna de Duero.
- 4-V-48 - Observamos pequeños bandos, probablemente de individuos en paso, en las orillas del Pisuerga. Hay ya parejas sedentarias.
- 9-V-48 - Un bando con numerosos individuos en el camino de Simancas. Quizá hubiera unos 50 ó más. El día 13 se vieron una media docena en el mismo sitio.
- 16-V-48 - Laguna de Duero. Un nido en un olmo joven con un solo huevo, a muy poca altura. Este domingo o el anterior un bando a orillas del río, con duda.
- 23-V-48 - Hay muchas parejas haciéndose el amor a orillas del Pisuerga.
- VI-48 - Junio debe ser el mes de incubación, aunque se ven a menudo parejas.
- 27-VI-48 - Observamos un nido con huevos. Para esa fecha todavía no he visto ningún pollo. A lo largo del Pisuerga hasta Cabezón, observamos abundancia de Streptopelia. Quizá sea el ave más frecuente.
- 15-VII-48 - Un nido con dos huevos bastante empollados. Todavía no se han visto crias volanderas, ni siquiera emplumadas.
- 24-VII-48 - Laguna de Duero. Se ve alguna pareja y se oye su arrullo, aunque muy poco. Hace una semana se veían y oían más.
- 28-VII-48 - Arrullan.
- 1-VIII-48 - Se ven bastantes individuos jóvenes, solitarios. Algún individuo arrulla, probablemente adulto, que quizá este en cria. Hay pequeños grupos, de 4 ó 5 individuos, que creo no son familias. Conseguido un individuo joven.
Cont. est. -
- 45 granos de trigo
Una ♀ adulta. Cont. est. -
- 7 granos de trigo, 24 yeros.
- 7-VIII-48 - Un nido con dos pollos en plumón y cañones a orillas del Pisuerga, en un matorral de olmos jóvenes a dos metros de altura y muy tenue, viéndose los tortolillos a su través.
- 13-VIII-48 - Los tórtolos del nido están ya emplumados, una de ellas casi volandera. El día 15 todavía no están reunidas en bandos.
- 18-VIII-48 - Toro (Zamora), las tórtolas andan sueltas.
- 23-VIII-48 - A orillas del Pisuerga, ya no arrullan ni salen de matas bajas. Todavía andan sueltas, en parejas o tríos.
- 28-VIII-48 - Vuelan muy bien, pero no he visto bandos.

Streptopelia turtur. L.

- 23-IX-48 - Una pareja a orillas del Pisuerga. Dos días más tarde se ven más a orillas del río.
- X-48 - A primeros de mes hay todavía bastantes.
- 4-IV-49 - Cogen una muy mansa en la huerta de Naqui, la primera del año. Parece acostumbrarse a la gente. Posible sea huida. Por el comportamiento de días posteriores, indudablemente estaban en cantidad.
- 19-IV-49 - En el Penal (Burgos), cuatro, los primeros del año, seguían allí un par de días más tarde. El mismo día vimos los primeros en Valladolid, (Laguna de Duero).
- 23-IV-49 - Veo bastantes en el río ya, solitarios.
- 3-V-49 - Estos días hay ya muchas.
- 7-V-49 - Encontramos una en el estómago de Strix aluco, o criando. Dicen hay huevos a finales de Mayo y primeros de Junio.
- Al parecer no abundan en Burgos a mediados de junio.
- 26-VI-49 - Un nido en un olmo a 3 ms. con huevos.
- 11-VII-49 - o, ala, 167 mm. Nido con huevos en una acacia 5 m. junto a la carretera de las Moreras.
- 15-VII-49 - Nido con dos huevos fresco, colección.
- VIII-49 - Entre los días 3 y 6, ponen las dos huevos en un nido a orillas del río.
- 6-VIII-49 - Toro (Zamora). Nido con dos crias emplumadas, plumón en la cabeza. Mañana se abre la veda.
- 8-VIII-49 - Ala, 171 mm.
Todos adultos, a orillas del Pisuerga.
- 17-VIII-49 - Siguen en los mismos puntos.
- 21-VIII-49 - Vemos un grupo de 6, a las 9 h. solares, bajan al río y se posan, solitarios. Solo vemos una pareja. Casi todos jóvenes. Antes casi todos en los campos, y más agrupados. Aún no hay grupos ni bandos.
- 29-VIII-49 - Aún están, creo que todos.
- 7-IX-49 - Toro, matan una.
- 12-IX-49 - Aún hay muchos. Dos juvenes, alas 161 y 160 mm.
- 16-IX-49 - A orillas del Pisuerga.
- 28-IX-49 - Aún hay bastantes en el soto.
- 1-X-49 - Aún hay aquí y en Burgos. Un joven poco emplumado.
- 5-X-49 - Villabragima. Ve aún dos Artero.

Streptopelia turtur ♀.

- 27-IV-50 - Un bando de 5, las primeras del año en el Pinarillo de Carnero. Es un sitio muy querencioso en paso primaveral.
- 5-V-50 - Bastantes en la otra orilla. No arrullan ni las creo emparejadas.
- 2-VI-50 - En las orillas del río. Un nido con 2 huevos muy frescos, en un olmo, junto a Ruber. Otro en Ruber sobre el río también, a un m. o menos de altura, sin huevos, la ♀ en él. Tenía huevos el día 17, a las 10'30 h., la ♀ no empollaba, el pollo pequeño, - con plumoncillo. El día 30, pollo grande, emplumado.
- 8-VII-50 - Un joven que volaba cae del nido. Campo Grande. Se me escapó el día 16.
- 10-VII-50 - Descubro 4 nidos vacíos en el sotillo, pero no veo ni un joven independiente o familias. Arrullan ya poco los padres.
- 15-VII-50 - Un nido, haciéndole en el Cabildo.
- 17-VII-50 - Otro nido en construcción en el Cabildo.
- 23-VII-50 - La Fraila. Nido con dos pollos ya grandes.
- 4-VIII-50 - La Fraila. Dos nidos en un enebro de 2 y 4 ms., crias grandes. Hace 6 días, otro, con huevos, abandonado el 1 de Agosto, en pino albar a 8 ms.
- 17-VIII-50 - La Fraila. Un nido con huevos o pollitos recién nacidos.
- 1-X-50 - Un bando de unos 40. El 6 veo todavía un grupo de 4 parejas y solitario en el río, con aspecto normal. Último día de Septiembre un bando de unos 80.
- 20-X-50 - Una en la otra orilla.
- 21-X-50 - Mata Luis un pichoncillo. Ya casi quedan.
- 15-IV-51 - La Fraila, la primera del año. Ala Long. T. 289. Ala, 169'5 C. 108; T. 27'5.
En el mismo día ya ve 4 Carlos en el Cabildo. En La Fraila solo esa.
A fines ya los hay a orillas del río. No oigo arrullos.
- V-51 - Durante los primeros quince días de Mayo, paso intenso, bandos de hasta 150 en Valdestillas. Del 12-20, abundantísima durmiendo en el soto del Pisuerga. Se levantan solas.
- 25-V-51 - Zaratañ. Ni una en el monte.
- VIII-51 - La Fraila. Es allí mucho más escasa que en los sotos y ligeramente más común que la torcaz (más o menos). Durante todo el mes no se observaron variaciones de número. Más tarde, con el paso, se hacían más abundantes otros años. No hubo agrupamiento en el mes.

Streptopelia turtur. L.

- 1951 - Ver notas sobre su partida en Agosto y Septiembre (comunes a primeros, escasas el 14, raros el 23, aún vistas el día 27.
- 1-I-X-51 - Aún hay algunos, a juzgar por los que se cobran.
- 14-X-51 - No vi ni una en el Monte Blanco, aunque abundaba la torcaz.
- 21-X-51 - Me dicen que hace días. (Nota). No vi ni una.
- 28-IV-52 - Monte Blanco. Pinar. Un grupo, los primeros del año. Aún no hay en la otra orilla, donde no se ven hasta el 1 de Mayo. El guarda del monte dice les vió la semana pasada (hoy es lunes, es decir hacía el 25 como mínimo).
- V-52 - Hacia el día 10 llegan ya en cantidad al Sotillo. Nidos. (Ver notas de verano del 52).
- 28-VII-52 - Un nido con dos huevos frescos. Otro el día 22.
!Abren la veda el día 10!
- 1952 - Primera decena. En el monte aún abundantes.
- 30-VIII-51-Soto del Pisuerga. de 17 h. a la noche. Cabildo-3 Hermanos, en barca.
- 1 - ♂ ad. Long. T. 289. Ala, 178-79. Cola, 105
Tarsos, 25. Pico, 11'5.
- 2 - Juv. independiente. Long. T. 264. Ala, 168. Cola, 98'5.
Tarsos, 23'5. Pico, 11.
- 3-jJuv. independiente. Long. T. 269. Ala, 160. Cola, 193.
Tarsos, 22'5. Pico, 11.
- El nº 3 está aún en crecimiento. El ad. testículos atrofiados.
- Alimentación:
La medida inf. de polvora 480 gramos del nº 6.
- 1 ♂ ad.
Trigo ... 130 granos
Nº 13 ... 22
- 2 juv. independiente. alrededor de 2500 granos (5 medidas 1/3) del nº 6.
- 3 Juv. independiente.
Trigo . . . 94 granos
Nº 19. . . 12 "
Nº 14. . . 2
4 caracolillos blancos de hasta 14 mm. de Ø.
- 31-VIII-51 -La misma localidad y horas 16 noche, que el día anterior.
- Alimentación:
juv. independiente.
Trigo limpio . . . 267 granos.
4 ó 5 diminutos granos de ladrillo, confundidos probablemente con semillas.

Streptopelia turtur

31-VIII-51 - Soto del Pisuerga.

Juv. independiente. (5 $\frac{1}{2}$ medidas) del nº 6, alrededor de 2650 granos
nº 18 granos.

Las tórtolas llegaban al empezar a aflojar el sol, hacia las 5 h. Durante una hora llegan solitarios o en grupos de hasta 7 individuos con vuelo alto y procedentes de los campos aún muy lejanos.

Creo entran directamente a los árboles o matos para dormir. Todos los reseñados con el buche lleno.

Los dormideros preferidos son espesuras bajas de Salix y Alnus, sobre todo en los canalillos de las dos islas. Parecen exigir pues; agua piscina que les garantice tranquilidad por un lado y por otro soto bastante denso o islas no frecuentadas.

Los dormideros más importantes vistos eran.:

Unos alisos; 6 ms. sobre el río. Dormirían en uno, unos 20 y en los otros, otros tantos más dispersos.

Un canalillo bordeado de mimbreras; 4 ms. al máximo, levantaríamos unos 60.

Otras en mimbreras dispersas unos 20 mas. En conjunto unas 120 tórtolas, (seguramente cerca de 200) en este tramo. Aún no ha empezado la inmigración creo. No hay bandos grandes.

Duermen la mayoría a una altura sobre el agua de 2-3 ms.

del Viro.

Sheptopelia juv.

22-8-5

juv.



ad.



JAV