

Philomachus pugnax.

- 21-VIII-47 - Laguna de Duero. Había bastantes; ingreso uno, el primero que tengo con el nº 89. o.  
Cont. est. -  
- algunos gusanos.
- 18-III-48 - Laguna de Duero. Extraordinariamente abundantes. Es el ave que se ve mas ahora. Conseguimos dos individuos. Hace ya - unos 16 días que los hemos visto. Uno de ellos ♂ tiene de - ala 18'8 cms. y la hembra mucho más pequeña y oscura 15'4 cms. El ♂ tiende a tener un collar blanco y tiene manchas negras - en las espaldillas. Ver piel en la colección. Un bando de - unos 40 a 50.
- 24-III-48 - Laguna de Duero. Un bando de media docena con otras especies entre ellos.
- 4-IV-49 - Ver T. totanus.

Claustra arvensis.  
Difere de Tichursty p puerus un bien Pierre.

Phylloides pugnas. 1  
Una ♀, con plumaje de invierno.

Un ♂ ~~con plumaje~~ en el que apuntaban que los plumos blancos del ~~del~~ cuello y manducos del dorso, observaban en el regiones dorsales, junto al gris, lo que junto con la ancha indudablemente que empobrecer a un tanto de plumaje juvenil.

Esta denominada *bulbula arvensis* Hartent.  
Improbable *setecimus*. C. Bonduclis.

JAV