Otis tarda L.

8-II-48 - Montemayor de Pililla. Un individo.

23-IV-48 - Me traen el primer individuo que tengo. ♂, con testículos grises, desarrollados. A juzgar por una pluma clara en la cola (una rectric central) tiene un año de edad.
Cont. est. -
- restos vegetales unicamente. Son plantas de hoja redonda y tallo largo, a lo largo del cual van - alternados? aquellos.
Muerto cerca de Tordesillas.

30-VIII-48 - Me traen un pollo grande, en muda. El día antes 4 ó 5 individuos en Velilla. A fines de mes un grupo de 4 en La Mudarra, se mató un ♂ viejo.
Anidan en la provincia, principalmente hacia Rioseco.

30-X-48 - Meneses. Un bando numeroso (de 20 a 100) en tierras.

En Octubre y Noviembre se ven parejas y algún trio en Medina d del Campo, donde no les había antes.

Alcedo, se ven algunas.

22-V-49 - Serrada. Cogen nido, traen un huevo no muy empollado.

20-VII-49 - Villabrágima. Un bando de 25 en un barbecho? Otros dos bandos el día 25 de Septiembre, en barbechos. !!Artero!!

27-VIII-49 - Mucientes. Una pareja en el Paramillo.

31-X-49 - Mucientes. Una pareja.

28-XII-49 - S. Pedro Latarce. Un bando de 20. Se distinguen un par de machos, en barbecho.

Sta. Eufemia, lindando con Zamora. Anidan. Alcalde descubrió un nido con 2 huevos en un trigal, los huevos estaban apitonados En una lindera, en el páramo junto a un trigal. No las hay en Aldeamayor de S. Martín.

Medina del Campo. No debe anidar allí.

En Mucientes se han cogido pollos. Crian allí, pero de todas formas deben ser mucho más comunes en el N.O. En Zamora muy comunes.

15-VIII-50 - Villanubla. Grupo de 4 en los montes Torozos.

28-IX-50 - Un joven a disecar, de un bando de

Octubre. Ver disecados, abundan este mes, pleno paso.

2-X-50 - Villamena del Campo. Un bando de unos 60 y otro de 30 en pajas y en viñedo y barbecho.
Anidan muchos en Torremormojón, en sembrado, barbecho (trigo y cebada), No hay páramo allí. Cerca de Bobadilla hay siempre. Me dicen que en Torremormojón las cogen en otoño poniendo -- lazos en los surcos de los carros. Van a ellos cuando crece - el verde en el fondo y les siguen, perdiéndose en los lazos.

JAV, JAV

Otis tarda

24-VII-51 - Páramo de Matallana. Villalba de los Alcores.

juv. Examen de estómago y plumaje.
Restos vegetales:

Maiz . . . . 68 granos
Cebada . . . 32 "
Arvejas . . 1

Restos animales: Gryllotalpa 1, se conservan los antebrazos
Ephippigera, restos bastantescompletos de 10 mandíbulas de otras 23, total 33.
Pentatoma, 11 de ellos 4 enteros.
Aelia, 1 solo el corselete.
Pimelia de 45 a 60. He contado hasta 43. De ellos una docena enteros, el resto casi todo en abdomenes enteros, que se conservan mejor que torax (de estos solo 31).
Zonabris. Calculo un mínimo de unos 40, pero seguramente pasaban. Estan muy destrozados excepto 3 ó 4; los élitros se rompen y el caparazón es tan pequeño que resulta imposible encontrar todos.
Meloe, 3 corseletes
Tenebrionidos diversos. Encuentro 110 corseletes repartidos entre:

Parecido a Blaps, tamaño Akis. 4
" " , muy pequeños
lisos y brillantes. 32

Nº 1
Nº 2 . . . 15
Nº 3 . . . 3
Nº 4 . . . 2
Nº 7 Unos 3

Solo examen de élitros, sacar proporción, exceptuados los nº 4 y quiza nº 3, en el resto de Tenebrionidos.

Había 3 ó 4 corseletes angulares negros. Conservo todos excepto Pimelia, Meloe.

La primera noticia que tengo de este juv. es que ha sido cogido vivo en el páramo de Matallana, conservado 1 día. Fué ¿cebado? con maiz, cebada y garbanzos verdes, de los que tenía media docena en la garganta. Sin embargo la presencia de tantos insectos me hace sospechar que se alimentó solo. ¿Donde?

VI-51 Cont. est. de ♀, de Junio, plumaje bueno.

Restos vegetales: Plantas horticolas y alfalfa.

Totalmente lleno, excepto lo poco que ocupan los insectos.

Restos animales:

Meloe majalis, con líneas anaranjadas (Amigo) ... 2 enteras. Cráneos de otros 3, el Meloe sp.
Blaps. 1
Akis, Sin protuberancias dorsales muy azules? . 1
Nº 9 Aelia. Hemíptero (Amigo) . . . . . 5 quizá uno de ellos Pentatonia.
Nº 8 Capnodis Tenebrioides (Amigo) . . . . . 2 uno entero

El coselete se conserva bien

JAV 48

Otis tarda

VI-51 - Páramo de Matallana. Villalba de los Alcores. (sique)

Restos animales: (sique)

Nº 10 Elateridos (pardo oscuros). . . 9

Corculionidos 2

Tenebrionidos con nº 2 . . . . 13, Había más.

nº 11 Solo conservo protorax . . . . 5, Del ala adjunta, unos 4 ó 5, no se si pertenecen al mismo.

nº 12 Buprestido (Amigo) 2,

Zonadris (Amigo). De corselete verde, conté unos 95. Había bastantes más

Zonadris ? De corselete más blando, anaranjado conté 2, pero había muchos más.

Coleóptero verde brillante, delgaditos, como cantarida una media docena.

Hormigas 1

Nº 13 Solo ese abdomen 1

3-IX-5 - Bando 12, con un pollo grande en el jaramiel, en el páramo, (hay garbanzales).

JAV,

Otis tarda L.

2-II-51 - El Pinarillo. Un trio, un grupo de 7, una pareja y algunas sueltas salian entre las matas de encina,

26-V-51 - Torremormojón. Palencia. Me dicen que han partido con esta fecha un nido con tres huevos.

2-VI-51 - Torremormojón. 2 huevos bastante incubados. Ooteca.

14-VI-51 - Villabrágima. Cobran ♀, bien emplumada, algo pelado los lados del cuello, sup. Ovarios atrofiados. Ya ha debido terminar - la incubación.
long. T. 830. Enverg. 1313. Ala 482. Cola 220. Tarso
Pico 55 mm.

26-VII-51 - Juv.. en las Cortas de Blas. Ver nota. Cont. est.
Mudando remiges y rectices cañones, pelusa dorso. Plumas entre veradas en cabeza y cuello, pecho, escapulares y coberteras - alares. Muda plumaje juv. a ad. Tamaño de una gallina grande.

21-X-51 - Valdestillas. Veo 2 que parecian ♂ y ♀. Nota. Indudablemente es algo común en toda esta parte.

XII-51 - D. Joaquín de Prada, me dice:

1º - Hay migración clara. Ahora no se verán mas de unos 2 bandos de 20 avutardas en una localidad (la he observa do, creo que cerca de Pañafiel? o Tordesillas) en que a fines de verano hay más de 100. Esta es migración normal comprensible.

2º - A mediados de Junio incremento grande debido a la llegada de aves extremeñas (pasando por el Alagón), las recien llegadas se acantonan en el triangulo Rueda,
en bandos numerosísimos, que sube a miles. También se agrupan en ciertas regiones de Salamanca con - Otis tetrax. Causa, la sequedad de Extremadura en estos meses.

Ha observado (fecha?) bandos formados unicamente por o, que según él llegan antes.
Migración improbable por estar en plena cria de pollos. Según él la cria en Extremadura es más temprana y de ahí la posible migración.

1952 - Las primeras noticias que recojo. Blanco vio una o dos en en monte, a mediados de Marzo. Pedro en Quintanilla hacia el día 18 de Abril.

6-V-52 - Levanta 3 en el Montico (Tordesillas), Julio.

5-I-55 - Laguna de Duero.
♀ juv. con una pata rota de antiguo.
Cont. est. -
- Coleópteros . . . 7
- Hojitas de diferentes plantas, mayoria retoños tiernos. - Una gran masa.

JAV



JAV

JAV



JAV





JAV