

Julio.

Fringilla coelebs - En crias grandes, parece formar bandos, mas abundante ahora que en ninguna otra época de el verano.

Chloris chloris - Vaga en parejas o grupitos, como todos ellos, con crias en banditos.

Serinus y Carduelis - Hacia mediados y fines parece haber disminuido el número de Sylv. communis y Hy. poliglotta, cosa nada lógica.

P. coeruleus y major no van en familia probablemente poco a primeros de messe ven grupos de Orites a lo largo del pinar

Oriolus - Ha sacado ya las crias a principios y quizá hacia el 23 se dispongan a marchar, creo que está viniendo ya Ciconia, reunidos en bandos los individuos de cada pueblo y enseñando a volar a las -- crias o a hacerlos fuertes.

Sturnus unicolor - Se reúne ya en grandes bandos, al menos para dormir.

Streptopelia - No es muy abundante. Aún no he visto crias sueltas y arrulla algo.

Acrocephalus arundinaceus - Completamente desarrolladas las crias. A primeros de mes.

Sylv. borin - Pollitos jóvenes comen moras de orillas del rio, y a fines empiezan a llegar Ph. trochilus, jóvenes.

Es abundante a orillas del Pisuerga.

Emb. cirrus - Se ve desde mediados en el soto, donde no les había antes.

En Laguna de Duero, unas Emberiza Galandra, de piar característico se ponen en los cables de la carreteras en parejas sueltas.

M. alba y cinerea y flava - Siguen con crias grandesso bien padres y crias sueltas.

P. pica - Se ve poco en familias a fines y lo mismo Upupa epops.

M. migrans - tiene crias ya sueltas este mes.

Caprimulgus sp. - suelto por La Laguna y allí mismo se acerca un bando de ___ a 10.

F. tinunculus y F. subbuteo - En parejas y solitarios