

Valv. 1951

## 30-En. Visita a la Rubia, finca del Habanero.

Desde el 29-XI-50 han cambiado mucho las cosas por allí. Buen día, sol, con leve neblina que se disipa a las 1. 11'30-2'30. No hay viento.

Passer domesticus. Un gran bando bajo un cobertizo. Unos 80 al menos. Estan establecidos en el gallinero y por las cuadras.

Anthus trivialis. Levanto sueltos y en grupitos muy dispersos por la alfalfa. Salen gritando.

Galerida cristata. Un bando de 5 y sueltas. Se dejan acercar mucho.

Oigo y veo C. corone, algunos, pequeños grupos de Coloeus, alguna Motacilla alba, etc.

Phylloscopus collybita. Veo uno reclamando en los almendros. Hoy ve Luis bastantes en las Moreras.

Pica pica. Ya no veo grupos. Luis ve uno de 6-7, que se perseguían. Algunos separados en parejas, entrando a los nidos mientras el compañero se posaba fuera.

Sturnus unicolor?. Probablemente. Un bando de unos 120, quizá más, se levantaba de entre las remolachas en que se reunían Vanellus y gaviotas. Se posaban en los cables eléctricos. No parecían temer a Milvus.

Vanellus vanellus. Llegados a mediados de Enero (ver notas), se han establecido en los terrenos llanos en convivencia con Larus. El bando mayor contaba con 60 después de separarse varios. Había grupos más pequeños, calculo que con un total de unos 150 en el trozo que he mirado. Correteaban entre los bandos posados de Larus, o dispersos en grupos y corriendo agilmente por las tierras, tienden a reunirse siempre en pequeños bandos específicos cuando se encuentran. No gritaban.

Larus ridibundus. Al pasar por el P. colgante y ya allí he intentado hacer una ligera estadística. Calculé el número en unos 500, repartidos así:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Salida P. colgante...     | 60                 |
| Presa P. colgante...      | 60                 |
| Desagüe matadero....      | 40                 |
| Un bando de.....          | 150 en las tierras |
| Otro de unos 1.....       | 100 "si" "         |
| Por el rio y dispersos... | 80                 |

Total... 490 en un espacio que no excede del Km. Sumando Vanellus, resulta una densidad realmente notable. superior al de Noviembre.

Las tierras que se araron en Noviembre, cerca del rio, están llenas de excrementos en manchas extensas. Casi toda la huerta tiene gran cantidad de excrementos que junto con los egagropilos deben contribuir valiosamente al abonado del terreno.

De estas egagropilas encontré 2. Ambas restos de pescado, muy probablemente marino y procedente de los desagües una de ellas. Observé uno de los bandos, posado entre las remolachas y tierra. No tengo nada que añadir, exceptuado que Vanellus correteaba entre ellas, siempre en menor cantidad, los bandos grandes de esta última estaban algo apartados, muy poco, las gaviotas no comían (ver anterior).

En una tierra junto al rio encontré una ad., herida en la punta de un ala, que resistió valientemente, contestando a picotazos, dos ataques frontales de un milano, le traje a casa. Hay dibujo de él para ver cabeza. **FOTOGRAFÍAS (1).**

(1). - Autogodo papavera. Campo Grande - Vicio > 2 años, empujando lombrices.

30-En. Todavía no han empezado a arar, (lo haran a mediados de Febrero). Me confirman que prob. por entonces acudirán a docenas detras del arado. Por ahora parece que su alimentación se reduce exclusivamente (o casi) a lo que encuentran por el rio. Cuando el milano atacó a la herida, y al gritar cuando lo apresé, acudieron otras que volaban.



SILUETAS NAT. CON GEMELOS.

Siguen posándose en parejas en los alamos en la misma punta y en las torres de tendido.

Algunos llegan a las cuestras. No hacen caso de Vanellus ni L. ridibundus. Vanellus.silencioso.

L. ridibundus.grita muy poco.

Cuento un bando más 7 Milvus al mismo tiempo, pero no dudo que lleguen a la docena. Presenció una persecución y el ataque de un indívduo que se había posado en el soto, contra una gaviota. Vi tres rapidos picados, giró después sobre ella y en vista de la defensa de la gaviota volvió a su próximo observatorio. Probablemente eran ataques de tanteo.

Volaban sobre los campos como siempre, giraban una amplia visita y volvian al rio, la persecución, el posarse dos veces juntas una pareja, cambiando de lugar, y los gritos quizá indican ya el celo. En el gallinero de la finca me informaron de que las "aguilas" se apoderan con cierta frecuencia de pollos, sobre todo en verano, la referencia era muy imprecisa, pero apuntaba a M. migrans. Sin embargo ahora me afirmaron que se asustaban mucho las gallinas y tenían recogidos los pollos en prevención de segundos ataques.

Buteo buteo. Solo vi uno, posado en un depósito de cemento e inmovil. Vigilaba remolachas y alfalfas.

31-En. Notas a la gaviota libertada en el campo.

La solté por la tarde a las 16 of, sobre el agua. Empezó a nadar con la cola a ras de agua (posiblemente se le mojaba el plumaje estropeado y sucio). Nadaba bordeando el estanque buscando el lugar a propósito para tomar tierra. Había entonces una docena de patos domesticos, criados allí y otra docena de pavos reales en el borde del estanque.



Cooo - io - iooo  
Kiooo - Kio - Kio  
Kiiü - ü - ü - io

Notación del grito tomada sobre el terreno. Lo repiten a menudo tanto al vuelo como posados. El primer Kiooo se alarga en la o (o en la ü francesa que también suena a eso) Vienen seguidos inmediatamente los otros dos (el último algo alargado aunque menos que el 1º separados por un leve intervalo. Recuerda al grito de los pollos aunque este es más modulado.