

27-feb. Finca del Habanero. La Rubia.

10 a 14 h. casi todos en el puesto. Viento frío remontando el río. Han terminado las avenidas, pero el agua aun baja turbia y rápida - poco más alta del nivel de la invernada. Indudablemente esta es la causa de la desaparición de las gaviotas y milanos que pueden verse por comparación con las notas de días anteriores. Es probable que distinguan peor los restos animales entre el agua turbia y se alejen, quizá definitivamente o puede que solo hacia las lagunas y ríos no en crecida.

Milvus milvus. Solo vemos dos en toda la mañana, y únicamente entro uno al buho, aunque no le tiramos. Frecuentan menos la salida de - aguas. Es posible que hacia Arroyo haya alguno más.

La fecha coincide con la desaparición de los migrantes. Es de notar que el individuo que entró parecía juv. por lo amarillento y que no - vimos persecuciones ni gritos en los dos. Quizá los adultos que ya manifestaban celo (ver notas ant.) hayan partido con algún bando en paso. El dueño de la finca nos dijo que había visto hace unos días veintitantos milanos en bando.

Causas posibles de desaparición.

- 1ª Formación de parejas que emigran o se dispersan por los montes.
- 2ª Llegada bandos en paso que arrastran a los invernantes.
- 3ª Desaparición de la fuente alimenticia o disminución marcada por las crecidas

Vanellus vanellus. Había algun grupito de una docena o más, dispersas no vi. Recorrian las tierras independientes de las gaviotas. Vi alguna posada con estas. Calculo que en la finca habria unas 30-40 avefrías.

Coincide también este año la desaparición de invernantes con la presencia en Villanubla en grandes bandos. Definitivamente esta localidad es sólo un alto en el camino de la emigración al N. Hace dos días que vió Luis andarius prob. Ch. capricasius acompañándolas en el aerodromo.

Larus ridibundus. L. Ya no quedan mas que unas 40 en el bando de las tierras y muy pocos en la presa o desagüe. No creo que en conjunto llegen a las 200. La partida es muy manifiesta y atribuible a la -- crecida.

Algunos de los adultos (no he visto ningun joven) tienen la cabeza - negra y aunque no creo que completamente, en conjunto si que lo parecen.

17-Mar. De los alrededores de Valladolid. El Río.

Sigue lloviendo aunque desde el 15 no ha cedido el frío. El río viene turbio, con crecidas esporádicas que lamen todo a lo largo en mullon. La salida de aguas superior desagúa ahora. El agua penetra tambien en el tunel, por donde salen miles de mosquitos que descienden flotando. No hay un pájaro que les ataque.

Motacilla alba. Es menos abundante quizá arrojada de la orilla por - las crecidas.

Actinoides hypoleucus. Desapareció el único invernante de este trozo, probablemente a raíz de las crecidas.

Larus ridibundus. Durante los primeros diez días al menos han venido algunos al desagüe del Cubo. Hay algunos individuos recorriendo solitarios el Pisuerga, ya en vuelos preemigratorios.

Ardea cinerea. El día 14 todavía levantamos al anochecer el individuo invernante de su punto favorito, la boca del tunel, es probable que encontrando aquí condiciones particularmente favorables, haya - permanecido más tiempo que otros.