17-Mar. Podiceps ruficollis. Hoy he visto una pareja cerca del tunel, segura mente se preparan ya para establecerse.
Hay que añadir una nueva especie. Hirundo rustica. Hoy ví una solitaria y un grupo de media docena volando bajo sobre el agua roja.
Es extraño que el rio sea siempre el punto donde antes se vé y del que tarda más en desaparecer.

Anthus spinoletta. Seguia aquí el día 10. Hoy no lo he visto, pero no lo he buscado.

Buen día, claro con sol y sin una nube. Por la tarde un leve viento W WS.

Recorro con cuidado regatos y charquitas, atravieso la laguna y trillo el rincón A. Examino los sifones (Gallipates, triton. R. sculenta, Pelobates y B. calamita). Mas tarde fui al pinar (15'30-18 h.) y vuelta por la falda colina. 12-18'30

La laguna esta muy llena. Apuntan por doquier hierbas, cuyas puntas dobladas a ras de agua le comunican de lejos tonalidad verdosa. Typha seca, juncos aun como en invierno. Empiezan a florecer Ranunculos, y otras plantas bajas adquieren todo su desarrollo orladas de millones de renacuajos, en parte aun unidos a sus cordones o bolas. Ya hace 15 días de buen tiempo y en el prado apunta la yerba. No han echado aun las vacas. Pytimis, en las crestas del prado trabaja mucho. En el borde de aca penetra la hierba hasta el agua por el declive. Hay muchos mosquitos en el prado alto.

Populus y Olmos sin hojas. No veo un solo reptil, aunque les busco con cuidado entre el pinar y carretera.

Anthus spindelta. (Me ref. al.gris). Me parecieron de esta sp. casi todos los que levanté de los juncos. Solitarios. Era algo común aún.

Saxicola torquata. Unas pocas parejas y solitarios por las partes más accidentadas del prado. Creo que hay poca difé. del mimero de verano a invierno. La nidif. es ya probable.

E. calandra. Canta aunque no con mucho celo, posada en los cables y en grupitos.

Galerida cristata. Hace tiempo que se emparejó y canta a más y mejor. Los muscicapidos faltan aún. Esta en paso estos días Phy. collybibita, muy común y pronto empezará Ph. trochilus (dia 5-IV cobré el 1º) si es que no lo ha hecho ya.

Ph. phoenicurus. Estaba hace 10 dias en paso en el Pinarillo y no lo veo.

Ph. ochrurus. veo un cantando estremeciendo la pechuga de un negro aterciopelado.

Acrocephalus sp. Solo levanto 2 de los juncos y ambos me parecieron Shoenoboenus. Van a comer al prado, como siempre, bandos 20-80 St. unicolor, ahora muy prietos. Algunos cantan al atardecer en los cables. Pica pica muy dispersos. Al pasar por el pinar vi3 Clamator glandarius persiguiendose. Al menos dos de ellas eran c. 01 su grito repetidas veces; C. corone emparejada.

Acanthus cannabina. Empieza a separarse en parejas. Pero aún hay -bandos de 10-20. Hacia el 5 me dice Carlos que ya están separados en Villanubla, lo mismo debe pasar en Serinus. Fringilla ya desapa reció, aunque permanecen las escasas parejas de estivales.

Motacilla. no veo, el l dicen que habia ya una amarilla. Como Cinerea ya ha desaparecido. (En el Pisuerga con las crecidas a mediados) lo supongo flava. A confirmar con notas posteriores.

Milvus migrans. Un solitario recorre la laguna. A primeros de -Abril y en los últimos días de Marzo ya es normal su núemro y loca
lización.

15-Mayo. Otis tetrax. Levanté una o en la ladera y quizá el 8 poco antes. Busque nido en vano, aún no ponen.

Alectoris rufa. Levanté una de la yerba más alta del prado. No ani daban allí.

En el camino, encontré a lo largo de la carretera Passer montanus y Serinus muy comunes, algunes parejas de Hypolais y ruiseñores y una Sylvia común, esta en la vía y en sitio más abierto Upupa. Todos cantaban.

