

14-Mayo. Cuestas de las Contiendas.

8:30 - 12 h.

Trigos verdes y ya altos, los arboles acaban de echar hoja. Buena mañana con viento N.

- Pica. Un bando de 9, en los "Crataegus" de lo sumo, atacaban al milano negro volando sobre él. Una pareja suelta. Había un nido en una torre metálica de tendido, arriba.
- Coloeus. En un montón de abono caballar humeante había unos 12, otros dispersos por parejas y en el cortado. Total unos 20.
- Sturnus unicolor. Anidan en chalet de las eras. Andaban en grupos diseminados por el llano.
- Acanthis cannabina. Vi en la cuesta 4-5 parejas, en matorrales de espino puñal, Rosa, etc. Es el único fringilidae. Encontré un nido, en Rosa, bajo la copa superior de hojas con 4 huevos frescos. Otras parejas aun no debieron haber puesto. Cantaban los ♂♂
- Calandrella. Muy común. Había muchos, los ♂♂ cantando su canción breve y repetida tantos en las tierras como en los cerros. En las partes desnudas era el único pajarero que se veía.
- Galerida cristata. Oí alguna en el llano, pero no arriba. Me han dicho que allí se ven poco.
- Sylvia communis? Solo vi una de espaldas, en la parte baja. Podía ser borin, (mas bien lo parecía)
- Ph. phoenicurus. Vi un ♂ y una pareja que salieron de un mato, junto al único árbol. No le oí cantar.
- Oenanthe hispanica. Vi dos o tres parejas, los 2 ♂♂ bien vistos aurita. Cantaban bastante, Tirorari-rorarirori. En partes más despejadas que Acanthis y menos que Calandrella (notación "in situ"). Igual que el de Stapacina en la Frailla, al oído, la notación es diferente. No vi O. oenanthe, que solo debe anidar dispersa aquí y allá.
- Hirundo rustica. Dos parejas en lo alto, cantando. Deben criar en las granjas.
- A. apus. Sobre la campiña en dirección a Zoratan, volaban unos pocos.
- Upupa epops. Solo vi una, que fué a posarse a un olmo solitario, quizá criaba allí.
- Falco naumanni. Posaban en el campo hasta el cortado. En él una pareja me dió la impresión de anidar por el vuelo, pero no ví señales de nido. Deben extender el cazadero de la Huerta del Rey hasta el pie de la cuesta.
- Milvus migrans. Bordoó uno varias veces la ladera, atacado por las urracas al llegar al matorral en que se reunían estas.
- Columba livia. (Domestica probable), levanté una pareja cerca del cortado o en él, tampoco vi señales de nidificación. Pasaban grupitos y solitarios, de la ciudad.
- C. coturnix. Canto alguna, más hacia la parte de Zaratan. Buscó el perro por los trigos en vano.
- Merops apiaster. Oí un bando hacia la Residencia sacerdotal. No le localice.

14-Mayo. Por detras, el paisaje triguero con escaso arbolado ralo en cerros toda la ladera de los Torozos pelada excepto en el Monte Zaratan. La Verga, destaca bien como el unico bosquecillo caducifolio importante.
A mirar, Laderas occidentales de la Maruquesa y monte Zaratan.

15-Mayo. Laguna de Duero.

Salida de casa 8'30 h. hasta las 17h. andando unos 10-16 kl. El primer día despejado y no frio de Mayo. Viento bastante fuerte del N. La Laguna está seca en su mitad septentrional. Los canales centrales con espadaña rala y poco desarrollada. Ha disminuido mucho el número de renacuajos ya grandes y ranas.

Corvus corone. No veo; atención momentaneamente al reparto desigual de invierno-verano.

Sturnus. Bandos muy dispersos y solitarios llevando cebo.

E. calandra. Abundaban en toda la parte no demasiado seca de juncos. Están posados, quizá sólo los ♂, las ♀ pueden estar incubando, en los extremos de matitas de junco y cantan mucho por la mañana. A media día menos, aunque se oye alguno. Toda la llanura esta llena de sus trinos. Cuatro individuos se persiguen haciendo un Kiek Kiek, como cuando pían de alarma, probablemente porque al espantarles yo invadieron el dormitorio de otros. Cada pajarito visible se mueve en un radio de unos 100 ms., a veces mucho menos, volando pesadamente en paracaídas con un ruido de aleteo particular y las patas colgantes para posarse en otros juncos donde empieza a cantar de nuevo.

No consigo localizar nidos, aunque parece que deben estar en los pequeños montículos y probablemente entre los juncos.

Motacilla flava iberiae. A lo largo del canalillo, en el montículo gredoso, levanto una pareja cada uno a 25-30 m. Hay muchos en la parte de prado húmedo.

Las parejas están muy juntas, las ♀ incubando y el ♂ posado a pocos metros, canta desde lo alto de cualquier ramita fina. Encuentro un nido, puesta completa, fresca entre unos cardos y plantas verdes del ribazo, los pastores cogen otro, con 4 huevos. Probable por el mal tiempo se ha retrasado algo la puesta. No lleva cebo ningún padre y me da la impresión de estar todas las ♀ incubando.

Acrocephalus scirpaceus. Probablemente de esta especie levanto uno en la charca, pero aun pueden estar en paso. No veo arundinaceus ni les oigo, pero no visite sus charcas.

Tampoco he visto Saxicola. No hay ninguna pareja en el extremo Sept. y W.

Milvus milvus. A medio día uno magnifico visito aquello.

M. migrans. Pasa varias veces un solitario.

Circus sp. Uno pardo oscuro. Sin blanco sobre cola, no veo manchas claras, revoloteo

F. naumanni. Solo uno, 4-5 al maximo. Debe haber un par de parejas en la torre.

F. tinunculus. Probablemente lo eran, hacia el pinar, alguno.

