

16-Jun. Valv. 1951
La Flecha. Finca de Barbara.

Callejon de Alcoholera, soto finca.

8:30 - 14 h. Buen días despejado, solo un ratito cubierto.

Pusimos el Carabo o y se nos ahogo, por estar dos h. al sol, a pesar de haberle bañado.

C. corone. Una pareja que rondaba por allí permaneció una hora inmóvil en ramas copa de chopos, separados 100 m. uno de otro - viendo al cárabo.

El pico parece amarillo o con boque- ras de este color. Casi no grazna- ban. Encontrado el nido, se oían piar crias grandes, en un pino albar a gran altura el día 20. Solo hay esos dos pinos por allí.

Pica pica. Muy pocas y en distrito muy pequeño de 10 -14 h.

Oriolus. Muy común, noté un ♂

Serinus.

Passer montanus. Un nido en álamo 5 m. grieta, muy profundo, solo de yer- bas con 4 huevos. Distaba 1 m. de - otro de Coracias, abundaban algo en el soto.

Luscinia megarhynchus. Común cantan- do bastante y muy disperso. Ahora - estan con crias los nidos. (ceba, hallazgo huevo roto). El 20 muchas fam. sueltas en ceba.

Hypolais poliglotta. Solo en uno o dos puntos más densos, al bor- de del agua, pero debía haber allí un par de parejas; entre Salix. Cantaban mucho los ♂, sin persecuciones. Es algo escaso ahí, aun que abunda en los setos de los alrededores. pit-pi-rii- pii-pip piee- pip-piee-pip-piee- chrereee.

Phylloscopus b. bonelli. Encontré bastantes en el soto claro, entre matas de olmo raquíticas, los machos cantan mucho, haciendo un teo-lo-lo o algo parecido muy señalado. Reclaman puit pero - menos que los ruiseñores.



JAV

JAV

Valv. 1951

16-Jun. Encontre un nido a menos de 6 m. del rio en un ribazo herboso ralo, a tres dedos sobre el suelo. Estaba hecho totalmente de pajas, - como las de *Sylvia* y otro nido, ahora. Sotillo, 4-5- crias, tenian una media capota absolutamente tupi da la que le diferenciaba bien de - las otras. Habia 4 crias ya algo - grandes pero sun desnudas completa- mente. Cogi la madre acercandome por detras y taponando. Era muy - gris parda, el obispillo amarillen to poco marcado.


Ph. bonelli parece de un gris blan co. Se posa en ramas bajas desta cadas y se hace muy visible. Creo que es el muscicopidae mas comun en el soto, aunque no vi *Sylvia communis*, que tiene que abundar.

Turdus viscivorus. Vi uno en álamo, junto al rio.

Acrocephalus scirpaeus. Cantaban en la otra orilla el 20.

Coracias garrulus. Hay al menos dos parejas en la finca, que extienden - su distrito por ambas orillas y a lo largo de las tierras cruzadas por - cables, donde se las veia posadas - continuamente. - Carrasqueaban bastante.

El carrasqueo es de tono bajo y pasa con facilidad desapercibido, lo emiten de vez en cuando y posadas, sobre todo cerca del nido, la silueta es algo asi.



Al vuelo destacan muy bien los machos azul oscuro. El ala grande y puntiagu da, vuelo del ala grande, algo estilo - milano o abubilla. El azul claro de las coberteras primeras da reflejos claros a distancia. El lomo hace amoratado y poco visible. No se ven ppatas amarillas. Resalta la cobertera y anchura de cuello.

Se posan en ramas altas y semi peladas de álamos de la ribera y cables. Calcu lo en una pareja un distrito de 400-500 al menos, los distritos de dos de ellos se confundian. Querencia, como siempre a las tierras raras semi-peladas. Les vi llevar algo en el pico.

Descubrí nido, piquera *Picus* 5 m. en álamo inclinado sobre el rio, a 1 m. de otro de *P. montanus*, (ver nota), a donde entraban a - menudo. No creo incubaran. Es facil hacerles espera junto a él. Otro nido visto el dia 20 de *Picus* en álamo de 6-8 m. en el soto en sitio despejado.

Merops apiaster. Vi varios nidos, dispersos en cortadillos de 1 m. de altura, cerca del borde superior. Abundan a todo lo largo del soto. Uno se rascaba, posado en rama ostentosamente sobre el rio. Tambien estas tenian como *C. corone*, pico abierto por el calor. No se si las otras especies.



Valv. 1951

15-Jun. Picus viridis sharpey. - Un nido habitado en un almendro, 2 m. entre Tierras, Abundaba allí. Posiblemente hubiera salido ya la familia. Efectivamente, cuatro días más tarde familias independientes, cobra do uno.

Caprimulgus ruficollis - Hay una pareja en el soto claro, cerca de velador. Ayer cogimos puesta fresca en el Sotillo

Milvul migrans - Daba vueltas continuamente y se posó en un chopo. Hay por allí buenos chopos para que anide.

19-Jun. Santovenia.

6 h. - 13 h. of. - Típico valle cultivado con graduaciones.

Recorrido. Carretera del Carmen, prado de Santovenia desde corte de Tres Her manos, soto, permanencia en la cascajera y vigilancia de los cortados del S. Vuelta e ida hasta la cascajera y después atravesando campos.

Sol, viento rio abajo, bastante fresco, ayer hizo malo. Algunas nubes.

Dentro de una semana empieza la siega. Aquel terreno es de regadio totalmente. El Soto no es denso.

Distinguí tres formaciones :

1ª.- Huerta y regadio, con prado, no arbolado
Se caracterizaban.

Acanthis cannabina- Muy común, indudablemente el frángilido de dispersión más general y posiblemente más común de las aves. Hace 3 días, nido con 4 huevos bastante incubados. Probablemente están incubando 2ª puesta. Cantaban bastante.

Emb.calandra- Muy común en el prado. Busqué un nido al que llevaban cebo los padres, entre hierba densa y matos de cardos. Cantan bastante, pero ya menos.

Motacilla flava- Común y en ceba; ¿nido de pollos? No vi familias.

C.coturnix - Cantaban bastante, de mañana.

M.flava, E.calandra, Coturnix, Acanthis - la dirección tendencia que pasa insensiblemente a

Gal.cristata- Muy común, ver notas de nido. Casi todo en ceba.

Oenanthe - Solo en 3 puntos, ♂♂, cantando algo al vuelo y piando. Lugares pedregosos e incultos, pequeños cortados y áridos, lejos del soto.

2ª.- Arbolado caducifolio - En carretera,

Sturnus - que anida en cantidad por aquellas fincas. Serinus, muy común y cantando. Chloris, mucho más raro y Passer domesticus. Señalando transición poblado como ya he notado otras veces.

En Soto

Streptopelia, Oriolus y Pica, comunes. Mas raro Luscinia. Fringilla coelebs, le oí reclamar una vez en el soto bastante denso. Hay que admitir para él dispersión soto-pinar restringida.

3ª.- Ribera. Interesante por presentar las cuatro formas