

1-Jul. Monte de Blanco. Puente Duero. 8 h. - 15 h. 19-20 h
 Recorrido. Casa, a través encinar, sin pararme, soto Adaja, a lo largo de este hasta el Duero y desembocadura. Vuelta al Puente. Al atardecer uno paso alrededor de la casa. Buen tiempo por la mañana, leve viento. N N E. Por la tarde paso de largo un nublado, llovía hacia el S E.

Encinar.

En rodales, sobre terreno de cascajo con mantillo, suelo casi pelado ya. Abundan los conejos. Vemos al zorro en la ladera S.

• Sylvia cantillans. Creo todos de esta sp. los Sylv. que vi. Por la mañana una fam. colicorta en celo, que volaba algo. Reclaman padres y juv. Área 100 m. cobre uno. Por la tarde y entre encinas desarrolladas, cantaban mucho, ya puesto el sol. No veo con seguridad Sylv. undata.

Lullula arborescens Cantando, muy común.

• Oenanthe hispanicus. Reclamaba en al ladera un ♂, que debía tener cuás grandes. Era Stapacina. Se posaba en los ralos pinos dispersos, dentro de su habitat corriente. No creo se pueda incluir en "h. encinar".

Coracias garrulus. era común en el soto. (3 Km. vás 3 parejas al menos) en la parte arboleda. Un nido en el único chopo viejo que se veía, de Picus, agrandado, la cavidad de yerbas más secas y ordenadas que el de la Flecha visto ultimamente. 6-8 m. Distrito externo en este lado, quizá 300 m. Vi a uno de ellos, sospecho que anidaba en otra piquera junto a mí, 4 m. soto, chillando seguido a tiempo que giraba a poca altura y rápido vuelo dando bandazos, con gran agilidad. En el encinar vi uno, acogido prob. a alguno de los pinos o grandes encinas. Había allí Picus. Hay que considerar a Coracias como dependiente de Picus casi totalmente.

C. corone, Encinar, pinar y soto no caducifolio. Muy común. Vi una reunión de 20 en un solo pino a las 12 h.

Coloeus. Cerca de Villanueva de Duero. Grandes bandos; En Puente Duero. Se extiende sin duda, y con gran abundancia, por toda la parte baja de S W. Estas como en Medina venían a dormir a los pinos de la ladera de P. Duero; también hirundinidos en ambos pueblos con predominio de Chelidon.

• Cyanopica. En el sote-pinar, solo uno entro a fam. Strix.

Pica. Más común soto prob. Fam. colicortas, juv. que aun no volaban.

No vi Garrulus, que Blanco no conoce, Hay poca encina alta. Sigue pues siendo especie rara, quizá con amplia dispersión por una región, pero nada común.

Serinus. Muy común soto. No en encinar.

Carduelis. Raro. Arenales orilla, como en el Duero. Todas las especies de soto como aquí.

• Sturnus unicolor. Muy común. Anidando en casamatas, nidos Picus, Puente etc. no vi bandos, sino padres en ceba. Asignarle amplia dispersión por la región.

• Lanius senator. Debe ser algo común, aquí y allá. Soto Picus.

• Upupa. Escasea. Anidaba en el Puente.

Valv. 1951

Adaja.

1-Jul. Pinar. Albar, chopo, raro fresno, alamos. Cauce arena en bancos movibles. Islitas detras de Salix que han arraigado. Escasos typha, en cortas hileras ralas. Borde cortado y emmaradado. Igual al de Evesma y Cega por la parte del pinar.

Como característica destacada. Fondo arenoso inestable y escasa prof. con corriente rápida. Falta de Limo y por ende de almejas. No hay algas, ni juncos a penas. Abundancia cachos pequeños y Barbus (cobrado uno) y por ello abundancia de garzas. Había Yxobrichus, pero deben escasear en muchos tramos. No esta bien para Podiceps por las variaciones de nivel y lo inquieto del agua. Charadrius no encuentro sitios, es ideal para totaminos.

7-Jul. Recorrido. El Pinar, Laguna de Duero y visita a charcas, carretera - hasta el Puente de Laguna y soto del Duero, atravesando después pinar al punto de partida. H. 8'30-18 h. of. Dia caluroso amenazando tormenta que pasa a lo lejos por la tarde. Algunas nubes.

C. corone. Pinares de Laguna y soto. Veo parejas unicamente, aunque ya deben haber salido fam. hace tiempo. Una cobrada en la Fraila estaba en plena muda.

Cyanopica. Dos juntos soto.

Coloeus. En el soto encuentro bastantes, cerca de la finca grande, reunidos, Desde los últimos días de junio he visto crias que casi no volaban.

Sturnus unicolor. En el pinar de Laguna, reunión numerosa 50 individuos al menos, como siempre algún Pica entre ellos. Parte venian del pueblo, a 1 Km. a buscar cebo y volvian en vuelo recto. Otros eran jóvenes. Los ad. se reunen temporalmente con ellos. Bastantes dispersos soto.

En la parte de pinar solo vi Lullula que canta aún bastante desde lo alto de los pinos, Lanius senator que aún no ha sacado los jóvenes. (Estos 10 días vemos bastantes, muy ostensibles los padres, posándose en lugares destacados (ramas bajas peladas, postes, algún cables, etc.) y ningún juv. (La fecha de puesta es tardia como he visto otros años), algún Serinus, P. cristatus, en grupitos ya. Upupa, Streptopelia, Pica y C. corone. (Aun no hay crias de tórtola) y P. tinunculus y Picus ya sueltos, algo común, debe estar cebando aún crias.

Abundan extraordinariamente las chicharras de las que se encuentra una camisa larva en cada tomillo. Al atardecer se mueven mucho.

En el soto no vi Ch. dubius en los arenales, junto al P. de Hierro un Actinioides hypoleucus, la fecha es ya de paso, pero habrá que venir otro año.

Centaban aún, aunque poco, Luscinia y Ph. bonelli, tórtolas arrullan mucho aún. Ahora sé de 4 nidos con huevos. Oigo poco a Columba palumbus que sigue viniendo en la misma prop. más común soto que juncos, (aquí escasea). No vi crias Oriolus.



Las plumas no mudadas del dorso tienen un color pajizo o pardo amaraticado, las pequeñas cobertoras alares y subalares y escapulares, y el pterilo dorsal, son muy parduscas.

Algunas cobijas subalares ya mudadas (la 1ª línea del borde ant. del patagio). La cabeza, no mudada, es muy oscura.