

7-Jul. En los campos del recorrido vi Coracias garrulus, posado cables y cerca pinos, Merops, Galerida, P. tinunculus que a cazar a ellos - desde el pinar y A. cannabina entre otros.

Me extrañó escasez rapaces recorrido. No sé si oí a M. migrans.

19-Jul. Visita al Sotillo. Una hora escasa, a las 11 y sin gran cuidado. Oigo jilgueros y verdeillos, aún sin comer y en fam. Un verdoron reclama. Los gorriones casi todos juv. y muchos colicortos, (habrá algún ad. en muda) ocupan en bandos las huertas. Urracas colicortas, cropendolas llamando y estorninos en bandos, reclamando mucho,

Luscinia. Canta uno en lo más espeso del ranol. Ahora, en plena muda los ad. deben haberse refugiado todos allí. Al menos no veo en otros sitios, los juv. independientes reclaman sordamente. Uno no se si intentaba cantar algo.

Hypolais. Veo tres o cuatro juv. independientes, ayer se cobró uno perfectamente emplumado, formula poliglotta, partes sin el azulado plumizo de los X, (tiran más a pardo caramelo). Uno cazaba de ramita en ramita, en sitio pelado, cogiendo insectos al vuelo. No pasaba de medio m. altura. Oigo un cheeva.

Sylvia borin. Ayer se capturó un juv. que empezaba a mudar. Deben haberlo de golpe puesto que tenía numerosos cañones en todo el cuerpo, y 1º remiges secundarios, pero el colorido era aún juv. Hay ya 3 puestas cria Sylv. borin, juv.-nido- y juv.

Ph. ochurus. Dispersos por el soto, debía haber una agrupación -- familiar. Oigo posiblemente un nosquitero. En esta semana debe -- empezar el paso de trochilus.

En la iglesia de la Victoria, multitud de vencejos (entran y salen algunos de los huecos). Les observo sobre el río con los prismáticos sin poder ver diferencia de juv. a ad.

Las golondrinas ya se posan en las ramas, en familias. Estos días se han cobrado dos juv. independientes, con las rectices ext. cortas. Algunos se bañan al vuelo. Volando a poca altura se acercan a una cuarta del agua disminuyendo la velocidad con un aleteo particular, y se dejan caer con las alas un poco levantadas y abiertas, chocan de pecho y da la impresión de que rebotan, emprendiendo entonces un vuelo titubeante para elevarse. Se bañan varias -- veces seguidas.

Acrocephalus scirpaeus?. La razón de mi visita la descuidé una vez allí. Oí uno con duda y vi otro silencioso, recorriendo las Typhas casi saltando de tallo en tallo, es decir sin hacer vuelos largos, y a ras de agua. No llevando cebo, ahora deben tener juv.

No se si era scirpaeus porque dorso y quizá cabeza me parecieron manchados, prob. por la muda, desde luego no hacia oscuro ni se veían rayas oscuras en el pilvo. A señalar sin embargo en las -- observaciones de campo. No hay duda de que son scirpaeus, después de las observaciones de los días 21-22-VII, en Arroyo Simancas.

21-22-Jul. Soto Pisuegra de Valladolid a Simancas. 21-22
Día 20. 9-15 h. of. en barca hasta las colinas de Arroyo, con -- calma, día muy caluroso y sin viento.

Día 21. 9-21 h. El sol se cubrió un poco a medio día. Viento no constante, que rizaba el agua del S o S.S.W. No hacia tanto calor.

A partir de Valladolid, el río corre en curvas grandes, con rectas de gran longitud entre tierras de regadío que ocupan la orilla -- baja. El soto denso y bien arbolado a ratos, en donde predominan a trechos olmos, chopos y álamos, muchos de estos altos y fuertes.

Valv. 1951.

21-22-Jul. Casi toda la orilla derecha está desnuda o con escaso arbolado y bordeada de una larga hilera de Phragmites densos y altos, entre los que crecen algunas manchas de Typha y otras dispersas.

Sobre el agua se inclinan unos pocos sauces llorones y muchas mimbreras, a ratos únicamente Alnus.

Pasado Arroyo, las cuestas peladas caen sobre el río sin llegar a desplomarse.

A lo largo de la margen izquierda y distantes unos , o bastante cerca del río, los pinares del valle del Duero penetran hasta la capital. La orilla izquierda se al páramo después del corto llano de regadío, con maíz, frutales, alfalfa, huerta, viñas, que ocupan las laderas sobre todo; arriba y dispersos, almendros por doquier cereales, que predominan páramo.

Todas las notas tomadas allí llevan. Nota 21-22-VII-51 A.


Luscinia. no se oye cantar nada apenas. Abundan dispersos e iniciando la partida jóvenes.

Cidulicinus ?

Hypolais poliglotta. Cobrado uno, las patas son tan azules como en los extraños, quizá se tratase de estos, porque vi ya paso indudable de Ph. trochilus, pero no cobré. Phy. bonelli aún hace tremoños.

Phy. bonelli. Medidas nido.

Oriolus oriolus. Como siempre. No es excesivamente abundante. Dos nidos en chopos, a alturas de 8-10 m. muy visibles. Dos ♂♂ persiguen a Coracias. No vi juv. que tienen que abundar.



Acrocephalus scirpaceus. Comúnísimo todo a lo largo del río, en los Phragmites densos de la orilla derecha. Creo que les prefieren a las espadañas. Cantan bastante, muy parecido a arundinaceus -- pero más débil. Es un canto entrecortado y agradable, (horas de más calor). Supongo que habría juv. por el número realmente extraordinario de pájaros que vi. No vi llenar cebo, ni me paré a observarlo.

A. arundinaceus. En 4-5 puntos en que el espadaño y carrizo invadía la orilla enclavada a favor de regatos, todas familias, mejor dicho juv. independientes. No oí cantos. Pronto emigraran o cruzaran de un sitio a otro; muy localizados, su número es muy inferior al de Scirpaceus.

No vi Motacilla.

Serinus. Ha dejado de abundar en el soto. Sospecho que hayan ya desaparecido algunos. ¿reunidos bandos tierras?. Aun oigo cantar a un ad. de magnífico plumaje.

Pica. Era poco común relativamente. Cogimos dos pollos que aún no volaban, ¡fecha muy tardía! y vi varios colicortos y otros en ceba. Un padre cebaba.

Clamator glandarius. El 22 cobran en al Fraila un juv. del año, ya independiente, algo colicorto. No vieron más. Ya deben haber partido casi todos.

En el pueblo abunda Hirundo, a todo lo largo del río y en ramas bajas de chopos, álamos y olmos se veían familias en ceba. Al regreso el 22 estaban ya todos dormidos, muy visibles, y en los mismos puntos en que se le veía de día, la distribución es por grupos, cerca del pueblo y caserios.

Valv. 1951

21-22-Jul. Sturnus unicolor. En bandos, volaba de un sitio a otro; hasta medio día al menos acudían a la copa de los chopos haciendo un gran griterio, siempre en bandos. Ha terminado prácticamente la cría, de la que son manifestaciones esporádicas los nidos en ella observados -- hace una semana o 4 días. Encontré uno muerto, nadando, en el río.

C. ciconia. Seguía el 22 en la torre de Arroyo.

A. apus. Volaban unos 30 sobre el río al atardecer, bastantes altos, hoy posiblemente han partido los de la capital. (o el 23). Estos seguramente de paso.

Merops. Nido en cebo. No se si oí una fam. Aun no han salido estas.

M. migrans. Solo vi uno en Arroyo.

F. tinunculus. Merodeaba uno, con aspecto de juv. a medio día. Volví a verles en otro punto. Vendrían del pinar.

Yxobrychus. Ver nota aparte.

Actynioides. Uno muerto, bien emplumado ¿ahogado? río y otro más, asustadizo y silencioso.

Alcedo atthis. Solo vi uno o dos, silenciosos, y uno de feo plumaje. No debe criar aquí más de una pareja, junto Arroyo. Es un -- buen sitio para apreciar cambios numéricos dentro de unos meses.

Columba palumbus. Escasea, solo vista un par de veces.

Streptopelia. Muy común. Se ven todas en parejas que apenas se separan.

En los matos ribereños (Salix, Rubus y otro arbolito) levantamos de sus nidos 3 parejas, dos vacíos, uno con huevos. Hay ya bastantes cáscaras de huevo por el suelo, pero no vi juv. Probablemente aún no ha puesto el género de las tórtolas.

Otus scops. Reclamaba soto, a la tarde. Debe abundar.

27-Jul. Visita a los Cortados de Cercos.

Recorrido Soto enfrente de la Peña Caída y orilla derecha del Pisuerga, desde las 16'30 h. con parada en el Cerro y examen cortados de Cabezón hasta la vía.

Horas of. 7'30-20'30.

La siega está mediada: ya trillan. El río bajo y claro. Ya no hay orugas en los alamos de Vado.

La Peña Caída. Observada a las 9-10 h. y de 13 a 16'30. Bien mirado. Circo y resto:

Colaptes. Ha desaparecido. Un bando nuevo graznaba en las tierras, posándose a intervalos en el soto, pero no se acercó ninguno al cortado. Posb. lo hagan para dormir. Ni señales de C. corax.

Petronia. Aún quedan anidando bastantes parejas, algunos a gran altura, juv. no hay la abundancia ni griterio de 1º junio. Andan dispersos en familias, prob. en cebo alguna, o sus bandos, por todo el soto, donde es el pájaro más común. Las encontré anidando, escasas, en el Circo y los otros cortados. Aún reclaman con fuerza. Su grito se oía por doquier.

Ph. ochaurus. Un ♂ entraba, a gran altura, en una grieta, prob. con una 3ª? puesta, cebando pollos. Ver halcon. Había algunos dispersos cortado. En el soto vi bastantes. Puede decirse que es algo común en todo este terreno quebrado.