

Valv. 1951

21-22-Jul. Sturnus unicolor. En bandos, volaba de un sitio a otro; hasta medio día al menos acudían a la copa de los chopos haciendo un gran griterio, siempre en bandos. Ha terminado prácticamente la cría, de la que son manifestaciones esporádicas los nidos en ella observados -- hace una semana o 4 días. Encontré uno muerto, nadando, en el río.

C. ciconia. Seguía el 22 en la torre de Arroyo.

A. apus. Volaban unos 30 sobre el río al atardecer, bastantes altos, hoy posiblemente han partido los de la capital. (o el 23). Estos seguramente de paso.

Merops. Nido en cebo. No se si oí una fam. Aun no han salido estas.

M. migrans. Solo vi uno en Arroyo.

F. tinunculus. Merodeaba uno, con aspecto de juv. a medio día. Volví a verles en otro punto. Vendrían del pinar.

Yxobrychus. Ver nota aparte.

Actynioides. Uno muerto, bien emplumado ¿ahogado? río y otro más, asustadizo y silencioso.

Alcedo atthis. Solo vi uno o dos, silenciosos, y uno de feo plumaje. No debe criar aquí más de una pareja, junto Arroyo. Es un -- buen sitio para apreciar cambios numéricos dentro de unos meses.

Columba palumbus. Escasea, solo vista un par de veces.

Streptopelia. Muy común. Se ven todas en parejas que apenas se separan.

En los matos ribereños (Salix, Rubus y otro arbolito) levantamos de sus nidos 3 parejas, dos vacíos, uno con huevos. Hay ya bastantes cáscaras de huevo por el suelo, pero no vi juv. Probablemente aún no ha puesto el género de las tórtolas.

Otus scops. Reclamaba soto, a la tarde. Debe abundar.

27-Jul. Visita a los Cortados de Cercos.

Recorrido Soto enfrente de la Peña Caída y orilla derecha del Pisuerga, desde las 16'30 h. con parada en el Cerro y examen cortados de Cabezón hasta la vía.

Horas of. 7'30-20'30.

La siega está mediada: ya trillan. El río bajo y claro. Ya no hay orugas en los alamos de Vado.

La Peña Caída. Observada a las 9-10 h. y de 13 a 16'30. Bien mirado. Circo y resto:

Colaptes. Ha desaparecido. Un bando nuevo graznaba en las tierras, posándose a intervalos en el soto, pero no se acercó ninguno al cortado. Posb. lo hagan para dormir. Ni señales de C. corax.

Petronia. Aún quedan anidando bastantes parejas, algunos a gran altura, juv. no hay la abundancia ni griterio de 1º junio. Andan dispersos en familias, prob. en cebo alguna, o sus bandos, por todo el soto, donde es el pájaro más común. Las encontré anidando, escasas, en el Circo y los otros cortados. Aún reclaman con fuerza. Su grito se oía por doquier.

Ph. ochsaurus. Un ♂ entraba, a gran altura, en una grieta, prob. con una 3ª? puesta, cebando pollos. Ver halcon. Había algunos dispersos cortado. En el soto vi bastantes. Puede decirse que es algo común en todo este terreno quebrado.

Valv. 1951

27-Jul. Chelidon urbica. He visto que hay bastantes nidos en el cortado, algunos juntos en grupitos de 3-4, otros dispersos. Les hacen en la especie de cavidad que dejan los desprendimientos de bloques - paralelepípedicos, y no en las cornisas redondeadas arcillosas. Piedras calizas grandes asoman por la pared. Vi dos nidos en ceba en el cortado, y algunos más en la orilla de cabezón.

R. riparia. En al Peña no les hay, pero abundan las colonias - (3 en 2 Kms.) a lo largo del rio, las golondrinas entraban y salían bastante, en ceba clara. No les pude observar gran cosa. Se impone otra excursión allí.

Merops. Tampoco en la Peña. A lo largo del rio colonias dispersas, con solo uno o dos nidos habitados, y algunos nidos desperdigados. En uno cebaban los padres, que permanecían dentro 4-7 segundos. En otro cebaban, pero oí allí griterio de juv. y vi después un bando el 1º del año con certeza. Posiblemente ~~ya~~ habían salido parte de los juv. aunque me parecieron demasiados y bien voladores los del grupo por ser fam. incompleta. Más probable fuese otra. Antes entrar al nido llaman priao--priao - id- id- id--priao--priao

Apus apus. En al Peña, a las h. de más calor, entraban solitarios en las grietas y se quedaban allí o salían tiempo después. No parecía ceba, a menos la realicen muy de tarde en tarde. No distinguí juv. volando, pero hoy ha caído uno al rio, con las remiges en crecimiento. Por lo tanto no partieron el 22. En Vall. quedan muchos, ¿Sino todos? No abundan mucho en el cortado. Podía haber medio centenar escaso.

Falco peregrinus. En la Peña dos, como siempre. Vi volar uno de ellos hacia las 8'30 h. Creo que despues no se movieron de la Peña, cambiando muy pocas veces de sitio. La ♀ (fig.) algo agachada y alas caídas, gritaba a menudo "cuai cuai cuai", cuai como una gallina. Supongo era ella el más oscuro y mayor. El otro chillaba menos, era más claro (el 1º = ♀? parecía negro por el dorso, este gris perla) y se apreciaban las rayas transversales de la parte inf. abdomen.

Ocupan el tercio sup. del cortado (no se posan en la cresta) que dominan a las palomas. Se posan en crestas y montículos en las repisas y menos en las cornisas, los primeros (sitios) están cubiertos de excrementos blancos; posaderos habituales. Uno de ellos, excrementos en 2 direcciones, una en la que estaba, prob. debido a la posición en que posa según venga de diferentes direcciones.

♂ y ♀ se posaron separados unos 15 m. Parecen bastante independientes uno de otro. Más tarde, a dif. niveles, misma distancia. Uno de ellos era rondado por Ph. ochorus ♂ que saltaba alrededor. No podía oírle aunque piara.

El ♂, más tranquilo, se puso una vez agobiado (fig.) haciendo bruscos movimientos de cabeza con el cuerpo en tensión. No vi -- llevar cebo, ni señales de nidificación.

En el circo había otra pareja. Vi una persecución entre ellos, al atardecer, y vuelos altos, sobre el cortado, de poca duración. Uno estuvo posado largo tiempo en una cresta baja sin mover más que la cabeza, y apenas partió vi allí mismo dos conejos que volvieron a la hure ¿asustados por nosotros?

Son poco asustadizos, permaneciendo tranquilamente posados encima de nosotros. No hacen ademán de atacar a las palomas que vuelan bajo ellos.

Ya casi anochecido pasó uno sobre la estación de Cabezón, a 2'5 Kms. en línea recta del Circo. Presumo que solo cazan en los crepúsculos, al menos ahora que no tendrán dificultades en conseguir presas. (aves en muda y juv. independizándose).

27-Jul. En vuelo de crucero aletean poco, si se compara con la rapidez y agilidad de los aleteos en sus juegos. No han debido salir los juv. que permanecieron tranquilos en el nido durante las horas de calor.

F. tinunculus. Un juv. independiente al parecer en los sembrados ceca Peña Caída. Debe escasear mucho por allí, falta de bosques.

Noeophron percnopterus. La pareja de Peña Caída se levantó al aproximarnos por la mañana. No volvieron.

Tyto alba. Vi una pluma al pie del cortado. No vi egagropilas, pero no dudo aniden, como me indicaron los pescadores.

Columba livia domestica. 4 parejas haciéndose el amor, en la Peña caída, la mitad blancas o abigarradas. Sobre todo después al comer.

En el río. Con islas, carcajús y tiene que abundar Yxobrychus que no vi.

Ardea cinerea. Levanté una de un árbol en sitio frondoso, (nidos milano) a las 9 h. En unas ramas secas que cuelgan casi a ras de agua, gruesas y desnudas, una agagropila con las agallas de un pez.

Actynioides. Uno probable.

Tringa ochropus. Dos bajo el Circo. Parecían bastante claros, no se si por el estado actual plumaje. Volaban y se posaron juntos. Playa de arena y arcilla con algunas piedras.

Acrocephalus scirpaceus. A. arundinaceus y Cettia cetti. En el soto.

Pica pica. Común, sobre todo en la parte más arbolada. Probable dejen arboledas para criar. Una fam. los padres chillaban mucho, mas colicortas yendo mucho de rama en rama, vi 2 y 2, separadas unos 30 ms. Cobramos una, cont. est. 17 granos enteros de trigo. (Al lado, tierra a medio segar) y restos de otros. Dispersas estas orilla río posadas bajas, como siempre.

Ya he visto demasiadas veces fam. en el borde del agua. Prob. los padres las conducen allí, en busca de matorrales propicios, apenas, salen del nido.

La abundancia de urracas colicortas ahora quizá no es debida únicamente a la de torpes juv. independientes. Prob. muchas adultas, mudando, la tienen en crecimiento, los padres de la fam. aludida, cola larga. Igual los del día 22 ¿Quizá la cria la estropea, o se impone la muda terminada la ceba?

En monte muchos restos de juv. en el soto y más adulta, al pie nido M. migrans.

Oriolus. Escasea a juzgar por el canto. Se callarán durante la ceba fam. !tampoco he visto juv.!

Sobre pájaros pequeños vi poco y no claro. No presté atención.

Aparte Petronia, abundan Passer domesticus. P. montanus vi también. Vi jilgueros. frente P. Caída. Un grupo de media docena de verdecillos.

En general, parece haber ya variaciones manifiestas. Se ven en corros y asustándole marchan en la misma dirección. Certhia solitaria seguía a F. coelebs que en bandos y feísimos por la muda, acusados, en la cabeza, picoteaban en el suelo del soto, entre árboles (olmos agusanados) y se paraban ramas bajas. En estas asociaciones?? vi los siguientes sp.

Chloris, Cethia, F. coelebs, Hypolais, Muscicapea hypoleuca?

Valv. 1951.

27-Jul. (vi de cerca un juv. con pecho manchado, anteriormente había visto otro y un ad. librea verano, pero me había parecido que estos andaban junto al pajarito X que dibujo).

Sobre X. Posado bosquecillo olmos juv. muy comidos de orugas, altura 3 m. y menos, primero ramas destacadas, después ante el ramaje, le espanté y tiré una piedra y voló a unos 50 pasos, posándose rama destruida. Volvió a dar otros dos vuelos más cortos ante de perderse.

Reclamaba con un pit intensamente. Me dió la impresión de estar con M. hypoleuca? juv. o un ave parecida.

Su silueta podía quedar entre la de M. hypoleuca y Saxicola, con movimientos bastante torpes en el ramaje. Ver figura.

Otros pájaros.

Parus coeruleus. Juv. indep. P. major. (P. ater? un grupito)
Luscinia de la que se cobró ayer un juv. que había rodado mucho.
Orites. Ver estado plumaje. Picus. como siempre. En la isla un Dryobates juv. que ya volaba bastante bien. No oí tamborileos.

Upupa. Como siempre, escaso.

Caprimulgus ruficollis. En dos puntos; soto claro con matas dispersas Oxiacantus y algún fresno juv. en lugar abierto; una cría en la que apuntaban algo las plumas de alas-cola, y algunas en cabeza, crupigio y pecho. Long. t. 13'5 cms.
 Estaba junto a un Oxiacantus y era como siempre muy poco visible. Echada, ojos cerrados, chillaba al cogerle con un agradable rumor. Quedó allí. A las 17 h. la madre? estaba cubriéndola de nuevo. Levantamos sobre ella a la madre ~ 84 y la perseguimos. Se quita al llegar la piedra. Sin salir de un radio 50 m. (largo río) se levanta muchas veces. Al excitarse hacia cava-cava, en tono muy bajo y ronco; solo se le oía al pasar volando cerca. Se posaba siempre - detrás de alguna mata.

Otro individuo, en terreno monticuloso, límite campos, junto a ranas. En tro lugar propicio, les busqué en vano.

Milvus migrans. Vi quizá 3-4 posiblemente solo una pareja de ad. Una rapaz que levanté soto adulto, alar largos y cola corta, podía ser también Buteo o juv. M. migrans. Muy oscuro.
 Miramos 5 nidos, de ellos 3 ya robados por mí anteriormente, sin encontrar nada. Uno de ellos tenía el lecho casi todo de vellón, que abundan en el soto, los otros cuerdas, boñigas y hasta tierra. prob. el núcleo de antiguos nidos de Pica sobre los que se construyeron después.

Supongo, que habrán robado las crías. De lejos vi un ad. tirarse en picado al soto, sin encontrar después nido. Uno de estos, le deje habitado en junio; no tenía nada ahora.

El soto estaba como regado de plumas de Milano negro, remiges y rectrices sobre todo. Sin embargo hace 12 días me trajeron un o ad. con plumaje muy bueno. En una de los vistos aprecié gran desgaste y falta de remiges.

Alimentación. M. migrans. Bajo uno de los nidos, vertebras y cola Pica ad. Apus y una culebra (en el soto vi una Tropidonotus vupernus). Ya he dicho que abundaban los restos de Pica juv. de ellas 2 con seguridad devoradas.

A menos de 500 m. de Peña C. un esqueleto de una gran res muerta - este verano. Hay muchos restos de ovejas. No les faltará comida a milanos ni alimoches.

Milvus milvus. Uno por la mañana y más tarde una pareja que volaba inquisidora sobre nosotros al pasar el soto. Anida allí.

27-Jul. Otus scops. Oí reclamar.

Athene. Vi plumas.

Streptopelia. No abundaba mucho. Menos que torcaces en los corros de éstas, más en el resto del terreno. Me han dicho que hace una semana se cobró ya un juv. que volaba. Yo sólo vi adultas. Arrullar muy poco. Diría que hay muchas menos que en junio, cuando los han dos.

Columba oenas. Vi perfectamente una que salió junto al río, de un viejo nido de milano. No la examiné.

El soto, con Salix viejo y agujereados y nidos Milano ofrece buenos puestos para que críe esta paloma.

Columba palumba. En 2 puntos, principalmente a todo lo largo del soto de prado, partes más arboladas, y soto de la iglesia. Habitat. Los bosquecillos duros, de árboles elevados y prietos, - que ocupan bastante extensión. En olmos, las partes de soto claro o con alamos menos frecuentados y en algunas faltaba en absoluto.

Supongo que se habrán establecido para anidar en estos bosquetes. Anteriormente las vi (junio) en bandos. Ahora todas emparejadas y en cría. Migrans un nido de cuyas proximidades salió uno, encontrándole vacío.

Sospecho que criaran en los nidos de urraca que a alturas medias, eran algo frecuentes, si no abundaban.

En esta fecha son muy confiados. Se posaron varias junto a nosotros (una de ellas al mirar un nido de Milano, vacío y aplánado; rondó por allí. Posiblemente anidará en él). Una vez revolotearon pesadamente entre las ramas, semiescondidas y sin alejarse - hasta que los asustamos a pedradas. Era en lo más denso de un bosquecillo ¿jóvenes que empezaran a volar?

En los bosquecillos, muchísimas plumas caídas. Arrullaban bastante aún. Oí al mismo tiempo torcaces y domesticas cortado. ¡Que diferencia de arrulles!

Alectoris rufa. Oí cantar en 4 puntos diferentes. Levantamos una dos veces, en un terreno bajo, con matas y bastante externo, junto al río.