

Valv. 1951

1-2-Agos. Wamba - Villanubla.

Horas of. Día 1. Salida de Vall. a las 6. Llegada a Wamba a las 7. Al anochecer en la iglesia. Ha llovido apes midi. Viento -- fuerte, húmedo y frío.

Día 2. Amanece a las 5'45 h. A las 10 en el valle. Frío y viento procedente de lo alto del valle. 10 - 13'15 h. en la iglesia. 14 h. a 16 h. paseo a pie carretera Wamba a Villanubla, con sol, nublado un poco.

#### Descripción terreno.

Páramo de los **Toro**zozos, desnudo y raso, con arcilla decalcificación donde prosperan cereales, ahora en sazón, y leguminosas. Empezó la siega hace tiempo y ahora está medizada.

El Hormija, regato de aguas gredosas y grises, corre desde Villanubla por un amplio valle, bordeado de prados naturales con caballos y vacas. Es apenas un regato de bastante corriente, cubierto a trechos de berros, con cintas interrumpidas de Typha. El soto desnudo. Solo cerca de caserios bosquecillos de chopos y algún olmo. Salix arborescentes aquí y allá. Forman en total un bosque algo extenso en Villanubla, no mirado, otros pequeños a medio camino y el de Wamba, disperso, claro, entre prados y junto a casas. Algunos chopos, Salix y Ulmus se diseminan valle abajo.

Junto al arroyo crece alguna zarza (Rubus) en las proximidades del pueblo. A ambos lados del arroyo, prados de pasto y siega, en terreno margoso hay humedad, matas de juncos a trechos, cerrados en un valle lateral. Siguen cereales, amarillentos ahora, que ocupan buena parte del valle y ascienden a las laderas más suaves. La ladera margosa, coronada por la caliza que aflora en diques erosionados Piedras desprendidas invaden las crestas incultas, rala vegetación xerofítica, cardos, tomillo y labiadas.

Los pueblos, Wamba, fondo valle, casas viejas de caliza páramos, que constituye el material de las cercas de las eras y alguna -- huerta junto al pueblo. La iglesia no muy alta, (Vi la cripta de los huesos) y otros edificios de 2 pisos. Sirven de asiento a -- Sturnus. Pueblo eminentemente triguero, abundan extraordinariamente los gorriones. Debe haber bastantes palomares. Las casas se amontonan en un grupo. No tiene caserios. Alrededor, las eras y una o dos huertas con medio centenar de frutales. Más arbolado en -- Villanubla, a media cuesta cabecera valle.

Abunda el congrejo en los regatos, por fuerza muy calizo. Vi varias ratas de agua y una Tropidonotus muerta, pero no lagartos. No pude mirar por lagartijas. El prado parece ideal para Seps. Rana algo común. Apodemus y Fytymis en la torre, (lechuza). Ver notas de alimentación.

#### Lista de especies.

Pica pica. Común en el arbolado, se extiende por todo el valle excepto en lo más desnudo.

Coloeus. No hay en Wamba (seguro) ni en Villanubla los he visto. En cambio son ya comunes en el castillo de Torrelobatón según me dijeron (recuerdo un juv. cogido allí hace más de 15 años).

No veo razón para que falten dada la cría de F. naumanni, paloma y tordillo. ¿Es que no penetran por los vallecillos que se interonan en el páramo? ¿O no les conviene la escasa altura de edificios? Falta por no haber huertas, ni regadío, ni arbolados extensos. Sobre todo olmos? Seguramente es esto último, en cuyo caso hay que ponerlos en una categoría especial, la de las que necesitan acostaderos especiales bien sean bosque o ruinas.

Valv. 1951.

1-2-Agos. Me han dicho (Teodosio del Caño) que durante el invierno, los grandes bandos de grajos acuden a los Torozos al anochecer. Habrá allí dormitorio? la distancia al de Sardon sera de unos kms.

• Sturnus unicolor. Bandos junto a pueblos y caserios. No vi señales de ceba. Probablemente los juv. reunidos a los adultos. Ya de anochecido se dirigian en bandos de hasta 40 a los montones de abono y prado. Vi dos cadáveres en la torre, uno de ellos de un juv. muerto en el nido. Probablemente anidaron en la base del nido de cigüeña.

• Passer domesticus. Muy común. Bandos de juv. dispersos; buena parte de los ad. sino todos, aún incuban o ceban. Vi tres nidos con 5 huevos y 2 pollos desnudos. En el pueblo encontré un juv. muerto, caído del nido y otros 2 -3 en la torre. Debe haber gran mortandad entre ellos.

En los muros de la iglesia y corrales vi infinidad de nidos abandonados, la mayoría y probable muchos viejos. Puede decirse que no hay agujero sin nido. (Pajas generalmente entrelazadas y pecho de plumas de gallina).

En las parvas había muchos, otros bandos por los arbolillos poseídos. No en terreno pelado, sino en tapias, arbustos, typha y esas cosas.

• Petronia petronia. Oí un bando en unos árboles a media carretera. No los vi en Wamba. El terreno es estupendo para ellos. Es la abundancia de gorriones los que los aleja?

• Emberiza calandra. Vi uno en el prado, junto a los huetos, mismo hábitat que M. flava, pero no en los prados rasos donde estos abundaban. Estaba en la misma rama al amanecer y a las 9'30 h. Parecía adulto con mal plumaje.

• Acanthis cannabina. Aquí y allá, con querencia al regato. Parejas. Con Carduelis, el más abundante Fringilido.

C. Carduelis. Entre los cardos, grupos y parejas bien emplumados. Si había diferencia entre su biotopo y el de Acanthis, es porque los últimos salían de partes más monticulosas y con matorral.

• M. flava. Muy común en el prado, por todo el recorrido. Vi una pareja que aún tenía nido y muchos juv. independientes y dispersos. El pájaro más común allí. Levanté muchos del lecho del arroyo.

• M. alba. Creo que vi.

• Galerida. Cerca del pueblo. Muy canelosas. Probables Calandrella en el mismo sitio, seguro que no había en la ladera.

• Melanocorypha. Una con cierta duda, carretera, sitio Oenanthe.

• Acrocephalus. pequeños ¿Scirpæus? levanté dos veces en typha.

• Oenanthe oenanthe. Común. Calculo que había al mínimo una pareja cada 500 ms. en el recorrido. Abundaban ♂ ad. Una pareja en la ladera caliza llevaba cabo (un coleoptero? negro) y reclamaba nido seguro.

En el regato se levantaron juntos 7 - 8 juv. del año.

Ladera caliza y pedregosa, linderos de la carretera con terrones gredosos, anidando los 1º en las piedras, los segundos en las alcantarillas (se localizaban junto a ellos, igual que en Zaratan) Probablemente hay bastantes nidos aún, andando las nidadas anteriores reunidas por sitios más húmedos.

Valv. 1951

2-Agos. Wamba

Saxicola torquata. Una pareja junto al regato reclamando. Hace 4 días vi otra en la Rubia con idéntico comportamiento, seguramente con juv. dispersos entre las yerbas. Aquella, en terreno raso exceptuada la orilla del riachuelo, lejos de arbolado y en el prado. Esta en huertas junto a acequia y en un árbol frondoso con matorral.

Sylvia sp. Vi una entre los cardos que cubrían un rincón del prado. Quizás fuera cantillans (pequeño, pardo), no pude **pavarme**.

Ahora han partido ya muchas familias de Muscicapidae. Criarán allí seguramente Hypolaïs y quizás algún ruiseñor. No vi Muscicapae hypoleuca, que el mismo día y de madrugada encontré instalados en el soto Pisuerga.

Hirundo rustica. En los pueblos, el 2, a las 9 h. revoloteaban en cantidad, cruzando el agua sobre el regato y alguna se posaba en la carretera.

Chelidon. En el prado. Se alejaban más que Hirundo del pueblo. Abundancia parecida.

Apus. Anidan allí en cantidad pero ya no quedaba ni uno solo. Según ellos parten hacia Santiago (25 julio). El sábado 28 de julio con tormenta, un bando de varios cientos revoloteaban -- sobre la Plaza de Zorrilla, bajos, a las 13 h. ¿Paso?. En día antes cayó el río un juv. con las pennis en desarrollo. Hasta el día 31 abundaban en la capital.

Upupa epops. Vi una. Debe ser rara.

Tyto alba. Torre de la iglesia. Ver notas de alimentación.

Athene. Vi uno en la ladera pedregosa a las 8 h.

Buteo. A las 7:30 h. recorría uno el valle, en plan de caza. Escasean según me han dicho.

F. tinunculus. Uno muerto hueco del nido junto a palomar. Vi otro, con duda, Es posible que el cernícalo solo sea allí visitante de invierno de la torre.

F. naumanni. Ver notas.

C. ciconia. Había uno en la torre. Ver notas de alimentación. En Villanueva vi otra a media tarde.

Actynioides. Dos o tres, muy mansos, en los terrenos encharcados cerca del arroyo. Solitarios.

Coturnix. Cantaba bastante cerca de Wamba, de mañana, en el valle, pastizales y trigales de la ladera.

Me hablaron de Otis tarda, común en el páramo en los garbanizales, más abundante en Septiembre y en banditos. Ahora hay bastantes cerca del pueblo, hacia los montes Torozos. No conocía a O. tetrax. El Alcaravan parecer ser algo común. (escasea el viñedo)