

Valv. 1951

Agosto. La Fraila.

Notas de Lencis que estuvo del día 2 al 30. Solo hay anotado del día 10 al 26.

Bista de sps.

C. corone - Día 10, cobrado uno, en plena muda. Andan como siempre, en bandos al atardecer. Van mucho a los rastrojos al atardecer a comer.

P. pica - Día 10, juv. volanderas. Ad. con cuello pelado.

Cyanopica - Día 11, bandos; el 12, deambulando por el pinar; el 13, bando de un lado a otro por las tierras, a la espera en Morosilla; el día 14, acompañados por Sturnus en el pinar; el 16, por las tierras. Tiré 1; 18- 20.

Duermen en el pinar tierras o pinar (en pinos albares), el 30, en 4 pinos; en uno 8, en otro 2.

Sturnus - En bandos por el pinar hasta el día 14, Acompañando a Cyanopica en correrías por el pinar. Del 18 en adelante ya no se les vió. ¿Paso? No hay los días 24-25 y 26.

Grupos que van y vienen del pueblo para reunirse con charros, más comunes que estos.

Jilgueros - El día 10, aún en nido juv. Nido almendro huerta altura 3 ms.

Pinzones - El 19, familia, juv. con la o, en pleno pinar también el día 18, (las crias pisan como gorriones juv.). Sólo se vió o por los pinos.

Calandrella - El día 19, hay.

Cogujadas - El día 10, no hay aquí; el día 13, no hay ni aquí ni en el pueblo. (el 19, se ven). No crían en La Fraila. Sólo cerca del pueblo, no en el páramo rocoso.

Lullula - El día 10, no hay aquí. Estos días por el pinar algunos, quizá en las tierras, el día 19, se ven. 20.

Motacilla flava - El 13, 4 ó 5 cerca del pueblo, 20

Anthus campestris - El 20, cobrado uno, tierras, cerca del pinar. Se vieron muy pocos.

P. cristatus - El día 10, en bandos, el 18, (bando).

P. major - El día 10, con bandos.

Ph. trochilus - El 10, pocos bandos; el 12, sueltos por el pinar; El 13, sueltos sp. por el pinar, 20; el 23, muchos de tripa amarilla.

Ph. bonelli - El 18, en el pinar, cantó uno. Mató otro, otro día.

Hypolais - de patas grises; 10, bando cobrado.

H. poliglota - El 11, algunos en el pinar; 12, sueltos en el pinar; 16, una muerta; el 18, en el pinar. Se ven muchos en los bandos.

Sylv. borin - El 13, cobrada una. Pudo haber un paso grande.

Oriolus - El 10, bastantes. En familias hace 15 días al menos que vuelan todos los juv.; El 11, persiguiendo a Coracias; el 18, es bastante común, y por entonces de lo más común.

Agosto. La Fraila.

- Sylv. communis - El 10, con duda bandos; el 12, bando de 8 por las matas; El 22, abundantes Sylvia, cobrada una communis. El 23, muchas; no crían y había paso bastante intenso. Borman bandos con -- frecuencia.
- Ruiseñor - El 22, se vé uno con los pájaros insectívoros; 24, 25 y 26 otro ruiseñor. A lo último había más, por las matas solitarios.
- Muscicapa hypoleuca - El día 11, algunos; el 12, cada vez más numerosos; el 16, distribuidos; el 18 y 20, abundantes; el 21, muchos; el 22, en corros con colirrojos; el 23, uno con librea juvenil y otros tres; el 23, cada vez más. Se vió alguno con librea nupcial.
- Ph. phoenicurus - El día 6, unos; 18, 19 y 21, bastantes; escasos con M. hypoleuca, cobrado uno; el 23, cada vez más. Se vió incremento claro. Grupos dispersos más o menos relacionados unos con otros.
- T. viscivorus - El día 11, bandos; el 12, deambulando por el pinar, bandos; 20.
Se veían menos que en invierno. Aumentado de número. 2 Grupitos por el pinar 8 a 12 al máximo. Generalmente de 2 a 3.
- L. senator - El día 10, en familias, vuelan bien, todos juv.; el 11, algunos; el 16, hay; 18-22, muchos, primero en fam. después se separaron y desparramaron, partiendo algunos. Mientras están en familias en tierras, pinar, setos est. Cuando se desparrama por las carreteras en cables, árboles y piedras.
- L. excubitor - El día 10, en familias. los juv. vuelan bien; 18 y 22, bastantes, de ellos muchos en parejas. En pleno pinar.
- Golondrinas - El día 10, fam. en nido; el 14, en la ladera, no muy lejos de caserío; el 19, aún estan, pero no en la casa; 24, 25 y 26 aún se ven cerca de casa.
- Certhia - El 18, (bando en el pinar); el 22, grupos con monquiteros.
- Otis tetrax - El día 20, bando; el 22, en tríos, suelto alguno y bandos de unos 15 en el Hoyo del Muerto, de otros sitios van de 3 a 4 alguno suelto, (en todas las tierras). Siguen a fines en el Hoyo del Muerto.
- A. apus - Hasta el día 7 hubo paso regular. Después dejaron de verse (sólo el 18 una pareja). En época de cría no se ven. Paso claro.
- C. ruficollis - El día 6, nido una cría en plumón; la o mudando. El día 5, juv. volando bien, muerto. El 18, 2 juv. del año cobrados; otros 2 vistos, probablemente con nido; el 22, 2 muertos, otro con un pollo en plumón, casi todos se ven en espesuras y más rojos que negros.
- C. europaeus - El día 12, en Pozo Rocin, uno negro; el 22, hace días que no veo.
- Suben más a los pinos y suelen estar más en espesuras de pinos altos, los negros enseguida tiran para arriba a posarse en los pinos. Posados siempre a lo largo de las ramas, sólo una vez se vió uno atravesado.
- Upupa - El día 10, muchas en paso; el 11, en paso, han ido aumentando desde el día 2; el 12, deambulando por el pinar; el 16, hay; el 18, 20, 24, 25 y 26, disminuyen. No crían en el pinar. Paso intenso que disminuyó.

Agosto. La Fraila.

Coracias - (2 a 4 el día 11, con cernícalos, les perseguían oropendolas, ya he visto otra vez hace años); el 12, no hay en el mismo sitio; el 18, 8 ó 10 con 7 - 8 alcotanes, hormigas, laderas); 24, 25 y 26, no he vuelto a ver cazando insectos. No crían allí, probablemente terminó el paso. Andan por la ladera o carretera.

Cuclillo (Cuculus) - Día 8, visto uno, no cree fuera Clamator, el 18, uno con duda.

Clamator - El 20, con Maricas, reunidos en el Hoyo del Muerto. Se vieron de paso uno 8 ó 10, localizados en tierras, cerca del pinar negral espeso, cerca del páramo.

Cernícalos - El día 11, una familia en la ladera volando (jugando). Cobrado uno, con ellos 2 a 4 azulejos, cazando insectos; el 12, no hay en el mismo sitio. Este año se veían muy pocos.

Alcotanes - El 10, solos o en parejas; el 12, pareja, debe tener nido por los Corrales; el 14, uno molesta Buteo; el 18, cobrada o ad. en muda, con 7 - 8 crias y 8, 10 azulejos, (hormiga); el 22, no se les vuelve a ver cazando insectos, pero es que ha dejado de hacer días claros. Sólo cazan hormigas al atardecer, a la hora en que los grajos van a reunirse a las tierras y chillan los charros y grajos en el pinar. Sólo en días claros, a esa hora cazan los alcotanes..

H. fasciatus - El día 10-VIII, uno en la ladera.

C. palumba - El día 10, sólo o parejas; el 9, dos juv. día 3, tres juntas, y nido con pollos o huevos. Menos común que tórtolas.

Tórtolas - El 10, solas o en parejas; el 14, tantas como antes. Hoy muchas mas en los sotos que allí. Pero allí abundan paso. Allí no hubo entonces paso.

Perdiz - Día 11, unos muy juv. con la o; el 19, pollos juv. con o; había unos pollitos muy pequeños (como codornices) y otros igualones en dos familias reunidos.

Codorniz - Día 18, 2 pequeñas, vivas moscas, trigo y saltamontes.