

21-Oct. Me dijo Mariano Cantalapiedra que hoy tejones, mató uno, Ardillas comadrejas (hace dos días una camada de 7 crías desnudas) erizos (uno murió, hoy ha matado uno pequeño un cazador entre un roble, cree había otro). No conoce nutrias. El soto está excabado de conejos. Vi varias liebres, grandes, muertas y pisadas de zorro en las islas donde mató Mariano y Luis el 30 de Septiembre uno con magnífico pelo. Anidan allí Clamator glandarius.

Palomas domesticas vi bastantes palomares en el pueblo.

Columba palumba. Conté una en un bando a primera hora unos 60-100; se posaron en la arboleda arriba de la presa. Otro bando andaba más disperso en los picones del pinar bajando a beber en grupitos, a las 10'30 h. serian unos 25. A esa hora debian estar aun reunidos en grandes bandos que se dispersaron, tiroteo más tarde y quizá fueran todos a beber.

Durante el día les estuve viendo constantemente solitarios a veces pero casi siempre en número variable, hasta una docena. Anidan ahí en abundancia y sin embargo no puede haber tantas. Conforme con la llegada (guarda Blanco) hacia el 10 de este mes. Hoy mismo, en la Fraila, dos bandos de unos 25 en paso activo probable.

Hace 7 días vi ya un bando grande en Monte Blanco y otros más pequeños. Me dicen que son muy comunes en Quitapiedras. ¿Hay un estable cimiento transitorio? durante el paso o son las últimas estivales que parten, reunidas en proximidades encinares y contingentes en paso? A ver bien este invierno, haciendo taxidos, si es posible, en el Adaja.

Me dicen dormían ultimamente en un grupo de pinos, que estaba lleno de excrementos y plumas, pero se les ha perseguido mucho y lo han abandonado; las cazan a espera.

Hace unos días me dijeron (poco de fiar) un bando de miles de "palomas tórtolas". De estas aún había el 30 de Septiembre, cobró Luis una, pero ya no quedaban.

31-Oct. Monte Blanco.

8'30 -- 17 h. Monte y ladera. Espera corte con buho por la mañana.

En el monte hay aún muchas bellotas y naturalmente torcaces a las que se ha tiroteado mucho en los últimos 15 días, ahuyentando según el guarda a las águilas. (No había Buteo que vi el día 14-8 y de este día, no se si hay nota). Ya no hay lagartijas ni lagartos, los conejos se han hecho esquivos en los últimos 15 días. Quedan todavía saitamontes, sobre todo en las laderas soleadas. Sobre el monte se reúnen aún torcaces y grajos de los pinares vecinos, según el guarda ya estarán pocos días, ni una semana quizá.

El tiempo es aún bueno, Hay sol y calorcillo, aunque heló el alba. En el río caen las hojas de los chopos y fresnos, casi desnudas algunos, los olmos se mantienen aún.

Corvus corone. Hay bastantes. Quizá confundiera hace dos semanas, estos con Frugilegus aunque no lo creo. Les vi en el pinar, (3 mas 2) y dispersas por el monte. Entraron al buho con frugilegus.

Vistos juntos se nota en este un negro mucho más intenso por el brillo azulado, más agilidad de vuelo y quizá alas más largas y figura más elegante que Corone. Además de que el pico se nota blanquecino. En grito, es más suave el de corone y sobre todo este hace un gru musical y suave, algo melancólico, al vuelo, que no tiene comparación. Frugilegus grita roncamente y chilla a veces como Coloeus.

31-Oct. Corvus frugilegus. Ver en C. corone.

Había un bando de unos 140 al máximo, que se mezclaba poco con Corone y sí con Coloeus y Sturnus, muy localizados sobre un morro, cerca de viña.

Ha debido llegar la masa en los últimos 10 días. El 14 les señalé, pero pudo haberles el 28 ya vi paso intenso (Ver laguna) y Lencis bando de 200 en la Fraila. Hay ya establecidos aquí.

Plumaje. Parecía bueno en todos y era magnífico en uno cobrado.

Alimentación. Una o cobrada alrededor de las 10 h. tenía restos vegetales y piedrecitas, los restos debían ser de cereales (no semillas uva o restos de bellotas), a juzgar color filamentos. Nada en buche y estómago, muy irreconocible.

Les ví picotear con Coloeus en un terreno inculto, encinas escasas, y posarse en estas picoteando por lo que no dudo que comieran alguna bellota. En esas viñas, que frecuentaba el bando, hay aún uvas, secas casi todas.

Asociación. Emparejadas con Coloeus y sufriendo sus ataques vi a varios individuos. En silueta no logré apreciar diferencias, aun que miré atentamente a los dos juntos. Además el kio, es grito común a ambos, los dos bandos estaban juntos y localizados. Entre ellos algún Sturnus sp. (probablemente unicolor).

Con Corone no les vi, no se, Solo al buho. 2 x 1.

Vanellus, un bando de 10, le molestaban y obligan a volar de un sitio a otro, Parecido a lo que hacia Corone con C. palumba hace 10 días en Valdestillas.

Coloeus. El bando, número desconocido, con frugilegus. El 14 me entró un bando de unos 80-120?, en magnífico plumaje. Parecían más gris pardo que frugilegus, y mucho más chicos, pero en vuelo no vi nada. diferencia, quizá Coloeus más torpe.

Pica. Alguna suelta. Hay pocas ahora. ¿Migración local?

Garrulus. Pasaron dos altas, viniendo de encinar. Es raro aquí.

Cyanopica. Hay nota aparte.

De Fringilidos vi.

Pinzones. Muy comunes, en bandos y dispersos. Desde el 14 han llegado muchísimos.

Pardillos. Se oían. Se reconoce bien el chee, mas largo que los Pinzones y aspecto pequeño pardo, poco visible.

No vi allí jilgueros ni verdecillos. No Picogordos (el 28 en la Fraila.)

Petronia. Una en la casa, doble chirrido raro, sobre postes. Hay en el Puente.

Emberiza. En el soto no cobramos cia ♀ solitaria (Nota) y alguno se oía en el monte probable cia; quizá calendra.

Gal. malabarica Andaba por el centro del monte, cobrada una, piel, que en la cima de arbolillo. herida y asustada cantaba igual, tiene un grito muy melodioso. Otras cerca del límite.

Lullula. Cantando.

Había sociedades de Páridos, que oímos, comunes en el pinar, en una con Passer domesticus. P. major, en el pinar. En el Encinar P. ater, Regulus, Crites? P. coelruleus, pero muy escasos. Hay mucha mayor

14-Oct. densidad en pájaros por especie en el pinar en general.

- Phylloscopus. (collibita, seguro) escasos, solitarios, reclamando poco. Sylvia undata es común. Vi muy bien ♂ del puesto. Deben estar distribuidas en distritos. Una vez 2-3 juntos. Su reclamo y extrañeza, cherr, no, es ahora inconfundible, con especies invernantes.
- Buteo buteo. Habían desaparecido del monte. Uno en el valle.
- M. milvus. Cobramos un juv. del año (nota) y vi otro viejo.
- Ardea cinerea. La levantó Rubio. Yo no la ví donde la otra vez.
- Anas sp. Probable platyhryncha. Vi 9 sobre el Adaja, volando.
- Columba palumbus. En bandos y dispersos por el encinar, tan comunes como la vez anterior. Dice el guarda que pronto marcharan. Cobramos 3, al parecer adultos. En una no estaban aún mudados las remiges secundarias.

11. Alimentación.

- 1º Una sola bellota.
- 2º Unas 14 bellotas, y arbejones.
- 3º Conservado, bellotas, arbejones etc.
(Hay otro estómago conservado de Valdestillas, 17-XI-51. de un juv. de un año)

- Vanellus vanellus. Un bando de unos 12 en la viña (hay notas exactas) y otro de unos 30 en la otra orilla.
- Picus viridis.
- Dryobates. En el canalillo del Puente Duero uno, otro en el pinar de Adaja, otros oyó Rubio.

14-Nov. Del pinar de Valdestillas, en invernada ya.

Recorrí unos 3 Kms. pinar adentro.

Contrasta con el caducifolio, ya desnudo.

El todo o casi todo de negro, resinado o en parte (sobre todo resinan los troncos torcidos; ahora destila poca resina, con cadáveres de Julus; las lluvias han llenado muchos "tiestos" de un agua que puede beberse y a la que quizá vayan pájaros.)

Terreno arenoso, liso, con leves montículos; tomillar, a corros escaso escobas, comunes, colas de caballo, sin llegar a su formación predominante, como en los de encinar de Puente Duero. En algunos cerros, suaves lomas, planta baja, velluda, verde probable perenne ramera de hoja alrededor tronco único. Diámetro unos 20-50 cms.

Pinos altos y bajos.

En una dirección, -

en el tronco se observan grietas claras por aparecer la capa de roña subyacente), en contraste con la otra cara, oscura, más lisa y apretada, esta en dirección al río (en la confluencia). Ver si tiene esto relación con la situación de nidos de Picus o habilitabilidad agujeros.



En algún pino, Visum album. Se notan los resinados por estar más ralos de copa. Se cuida bastante el pinar. No hay piñas caídas. Agujas de cinco dedos de longitud.