

18-Dic. T. ericetorum. Llega en grupitos de 4-6, solitario, etc. con vuelo más rápido y alto que mirlo y dando su grito. Después de posarse (y creo lo hace más a menudo en ramas de árboles antes de entrar a zarzas) queda silencioso. Proporción de unos y otros - x. Cientos de cada uno. Probablemente T. musicus (uno sin duda) comunes.

Serían estos dormidos un sitio magnífico para redes verticales tendidos a la larga. Con respecto a esta dormida resalta la importancia de Rubus y mayor densidad de Passer en las cercanías de las villas.

Saxicola torquata. Solo una (piel) ♂ en la Cañada, muy gordo. Como siempre, tierra baja, con abundantes juncos, localizado en pequeños espacio. ¿Se ven más machos o solo ♂ en invierno?

Erithacus. Muy repartido, matas, disperso por doquier y común. (2 cobrados el 16 en Valdestillas).

Picus viridis. Es francamente común en el valle. Ahora en tierras y en parajes o grupitos. Muy verticales, como perdices casi, saltan con gran agilidad de terrón en terrón. No fué ni uno a la dormida. Parece que es inútil intentar cazarles entonces porque entran a sus agujeros con gran rapidez. Lazos. Su biotopo son ahora líneas de arbolado (almendros, soto (menos) alternadas con campos abiertos. Continuamente en estos. Me da la impresión que dentro de su amplia dispersión vive muy localizado.



Accipiter nisus. Uno cazando a la dormida, primero le vi dando vueltas, sobre los árboles, después ya entre ellos, y merodeando sobre las zarzas ataque (quizá 2) a T. merulae. Se poso en rama baja, junto a tronco y partió al ataque.

La llegada a la dormida es sin duda su plato fuerte.

No hay otras rapaces. Pisadas y excrementos Ardea cinerea, Cabildo; 2 Gallinula en el río, volaron una tras otra. Desde hace 15 días se las ve más en Valdestillas, aunque no creo su llegada. A fines del XI o primeros del XII cobró Mariano un Rallus en Valdestillas cerca de la confluencia. No creo aniden allí aunque creo señalé huellas sospechosas el X - XI. ¿Llegada invernantes ahora?

C. palumba. Una en el sotillo a media tarde; mató Carlos otra hace 10-15 días. No vi llegar dormida. Atención, ¿Hay núcleo invernante o solo paso muy largo, hasta Diciembre (aun el 16, 4 en Valdestillas) al que había que referir el bando que vi hace un mes en el sotillo? Creo que por ahora el contingente sedentario en sotos --- puede admitirse, pero no olvidar que debe haberle también en los pinares. Total. Invernante escasa, menos que estival y probablemente sedentaria (no razón para establecimiento de extranjeras en este sitio tan frecuentado como el sotillo).

22-Dic. Laguna de Duero.

11'30 - 15'15 h. Día con sol, alegre, tibio y sin viento, muy bueno. La charca esta llena de agua, totalmente. Nevó hace 3 días. El campo esta húmedo.

Hay alguna Rana sculentia? en el regato central entre las espadas. ¡En pleno invierno!

Recorrido. Estación pinar - colina - Laguna y vuelta al coche.

C. corone. 2 atacan repetidas veces a M. milvus. Pasaban bastantes pero no es fácil distinguirles de frugilegus. Vi igual o más que en verano.

22-Dic. C. frugilegus.— Un bando de 40-60 se tiró entre los mimbres del prado con Sturnus y Vanellus, armando gran revuelo. Otro? Pasó Hoyales → colina.

Sturnus unicolor? En bandos densos cerrados. Conté 90 en los cables y había otros bandos por allí, tirándose al prado, con chovas y avefrías. Es posible que se les viniera S. vulgaris. En general su número no parece muy inferior al de Agosto, aunque si creo haya alguna partida. No será aventurado contar unos 200 estorninos vistos.

Fringilla coelebs. Grandes bandos en las tierras, es mucho más común cerca de la Laguna. Algunos pude con alondras.

Emb. cia. Entre el pinar y la colina, matos Rosa, uno con 3 pinzones, se volaron juntos, y al lado una pareja. Su cip-cip es fácil de distinguir.

E. calandra. En el prado, volaba con tip-tip. No se cuantas pero creo que pocas, muchas menos que en verano.

No ví E. echoeniclus. !! ?

Alauda arvensis. En el prado, con pinzones, grupitos de unos 10. Se tiran entre los juncos, en las partes más secas y se arrancan de muy cerca. Alguna Galerida chillaba cerca de la colina.

Anthus. Soy incapaz de distinguir Spinoletta de ptactensis. Probable de estos. Andan más bien dispersos, independientes aunque agrupados en las partes más húmedas, casi entre el agua. Son comunes y su grito solo se oye de muy cerca.

No hay Motacilla en los prados. Un solo Saxicola, en la punta de un pino, como siempre. No pude verle bien y no se si era ♂, creo que no. A mirar mejor. ¿En verano hubiera visto más?

Turdus pilaris. De las viñas camino de la colina se levantaron unos 12 Turdus que se fueron posando sucesivamente en un mato (algunos) de almendro, antes de diseminarse en otra viña. Dos de ellos eran T. pilaris, otra me pareció viscivorus. Oí un agrio grito, chriceg. (de memoria).

Milvus milvus. Vi uno dos veces, la única rapaz.

Anas platyrhynchos. Es este el primer día que veo patos a placer y 3 especies juntas. Había unos 70, en extremo lejano, divididos en grupos y con el resto de aves acuáticas. Se levantaron largos, en bandos que dieron vueltas tomando altura y sin decidirse a posarse por mi presencia. A poco de volar en círculos, se dividieron más o menos distintamente en parejas de ♂ y ♀, aunque algunos iban descarriados.

Ambos sexos en número aproximadamente igual. Formaban a veces en V cortas y no demostraban el gregarismo de penelope.

Si volvieron a posar en parte o todos.

Al nadar, todas las especies de patos comían metiendo la cabeza y -- haciendo inmersiones cola en pompa.

En los ♂♂ se ve bien, de cerca, las coberteras superiores cola encorvados y el colorido neto. Ambos sexos hacen un grito mucho menos sonoro que el de penelope. Se oye de cerca casi siempre y no mucho más fuerte que el batir del ala.

A. penelope. La primera vez que lo veo bien. En los machos destaca claramente el culo oscuro, la cabeza como azulón, el peto amarillo (frente poco visible) y sobre todo el blanco de las alas que de lejos da la impresión de ser un ave blanca y negra. En las ♀ no pude apreciar diferencias netas con otras especies. Había alrededor de 20-25.

22-Dic. Su grito es inconfundible, agudo, sonoro y bastante musical. El bando que se comportó de forma parecida al de los azulones, volaba siempre junto regularmente formados. Comparados con el azulon parecen más esbeltos y de vuelo más ligero. Poca diferencia de tamaño, no apreciable sin verlos juntos. El ♂♂ más abigarrado que el azulon.

• Anas crecca. Un bando de 72-80, los vi largos, no oí bien el grito. Revoloteaban a escasa altura, en bando cerrado. Fueron los últimos en levantarse y los primeros en posarse si bien eran los más lejanos.

Parecen pardos, con 2 líneas blanco-pardusco en las alas, poco visibles. Diría por ahora que todos son juv.

• Larus ridibundus. Los conté varias veces (hasta 92, pero había unos 125). Cogi un juv. que no podía volar, al parecer sin herida. Se tiraban con los patos y nadaban cerca de ellos. Se posaron dos veces en bando cerrado por la orilla.

• Tringa ochopus. Levanté 3. No vi las subalares.

• Capella gallinago. Bastantes en las partes encharcadas, entre hierba, en corrillos, salen muy cerca, más de 50.

• Lynocryptes. Levanté una, había más. < 5

Me dicen que hace menos de un mes estuvieron por la mañana seis gansos. No vi salidas (habrá los de costumbre) ni Podiceps.