

Valv. 1953.

7-Ene. Laguna de Duero.

Buen día, con sol. Gran helada por la noche, el hielo cubre toda la charca, con solo claros en algunos sitios. La Laguna completamente llena.

Ranas. Rana suculenta, tres se tiran en un pequeño arroyo no helado, a las 13 h. con sol. Las únicas que veo. El 22-XII había bastantes más.

En el acequia seca (pozos-trampas) encuentro 4 bajo una lata, no miré mucho. Estaban bien vivas y coleantes, dispuestas a saltar. En anteriores visitas (ver nota) aun activos, en el agua.

Sapos. En el pozo-trampa un Pelobates muerto, creo que era de esta sp. uno que se sumergió. De Bufo calamita vi huras, pero no a ellos. No cacé en la arena del fondo, ni rebusqué en el agua.

Mamíferos. En pozo-trampa, un nido probable de Pitymis que tuvo tiempo de largarse. Era una especie de nido de yerbas, con techo, a una profundidad de unos 3 dedos.

Encontré bastantes excavaciones recientes al parecer de Pitymis. No miré el prado, donde había señales de talpa muy recientes en 22-XII



Arvicola sapidus. Vista una, grande, regato "Turon". Restos de otra, un montón de pelos, en el regato central, víctima de un Circus probablemente.

En lo poco que sobresale agua, regato central, cribado. huras recientes, algunos de hoy parecia. Son huras cortas, hechas para buscar raíces? o huyendo de la subida de las aguas. A trechos se hunde el terreno al pisar, completamente minado. Se ve bien el desmoronamiento de los ribazos.

A observar si este desmoronamiento se acentua por las variaciones del nivel del agua, que permiten excavación a todas las alturas, y si es mayor en invierno, por la búsqueda de raíces o excavación de huras más secas.

Aves Laguna.

Phylloscopus collybita. ¡Bastante comun! Y se trata unicamente de invernantes. A lo largo de espadañales, encontré bastantes, en los sitios más densos. Hace unos 20 días vi pequeñas concentraciones en los Salix ribereños del Cabildo. No los ví en el encinar de las Cortas, (les había). Hay que suponer predilección por el agua.

Anthus sp. Creo que son spinoletta lo que andan dispersos y muy comunes por la charca. Parecen muy grises y mayores que pratensis. de este cobré uno el día 3 en Las Cortas, en encinar. (Hay notas)

Emberiza calandra. Solo vi una. No vi Motacilla ni Emb. schoeniclus!

Capella gallinago. Se levantaron más largas que el 22-XII. Número global aproximado igual, unos 50?. Vi una quedarse en un matorral diminuto.

No vi Lynocryptes (solo una el 22-XII) ni T. ochopus que estaria por allí.

Anas crecca. Conté mas o menos 85 en el bando. Primero en un ribazo, evolucionaba en formación cerrada, grito debil. No se si serian ellos los que hacian Krieg o Krik, (solo parecia un individuo, e iba un pato parecido a A. penelope, mancha clara en las frente pero sin blanco sobre las alas con el bando de cercetas). No gnoté la mar de estos, que se oia al pasar cerca.

Me pareció que no se posan en el hielo tanto como A. platyrryncha.

A. penelope. Conté unos 21, sin gran seguridad. Había pocos ♂♂ (de mancha alar blanca neta). Probablemente buena parte de los ♂ son del año, no mudados aun.

7-Ene. A. Platyrhynchos. Entre patos grandes creo conté unos 90 (quizá entrara alguna carceta. Descontados 20 A. penelope, unos 70 azulones. Solo - llegue a contar unos 55 en vuelo. Restos de un pato, devorada ¿Circus?

A. especie. Krieg o Krik. Ver Carceta. El grito es monotonó, algo espaciado y duró un cuarto de hora quizá.

Larus ridibundus. Conté 233- 234, que fueron llegando poco a poco. No vi ninguna que no volara (y el juv. que solté el 23?) Picotean en el agua a más y mejor.

Vanellus. Pasando bajas, en dirección Sur (al menos un bando de unos 30 meciéndose allí mismo) pasaron 30-40-100-20 en el tiempo que estuve, 12-15 h. Probablemente el paso de pleno invierno señalado en otros años.

En el camino.

Cyanopica cyaneus. Bando en chalets del pinar, se posaban a la misma puerta de uno de ellos.

Emb. cia. Donde la vez anterior, unos 3.

Ch. chloris. Uno se quedó en un almendro después de partir un bando de P. montanus.

P. montanus. Un bando de más de 100 en los almendros y viñas, con pinzones y al menos era verderón. Otros en la Laguna, y dispersos por doquier un montón. Con el pinzón (disperso y un bando en el pinar) es el pájaro más común (los bandos grandes del 22-XII, atribuidos a pinzones?).

Saxicola torquata. ¡Una ♀! en las junqueras del prado. Vi un charla en los Crataegus del camino donde Emb. cia.

Ph. Ochruus. Un ♂, en un pino, entre los chalets del pinar, y una ♀ en tierra arada, en la cima de la colina.

Pica C. corone, C. frugilegus, un bando de más o menos 30, con Sturnus y un rato con Vanellus como de costumbre.

Falco tinunculus. Vi uno en los campos, quizá ♂. Ver lo del 3-I, en Las Cortas.

No vi milanos.

12-Ene. Palencia

Alcedo atthis ispida ? ♀ ConConte est.-

- Quisquillas de río, 8-10 casi enteras y restos de otras
- 3 dientes palatinos de pececillo; muy digeridos