

18-Mayo. Villalpando.

Cinco nidos de cigüeña, todos habitados, en las Iglesias. Nidos en Villamayor, allí cerca (al menos uno) y el primer pueblo viniendo desde allí por carretera de la Coruña.

Villalpando. Se vieron allí, St. unicolor, muy comunes. Coloeus, comunes. Algunas primillas, cernicalos, Oenanthe sp., Cogujadas, Vencejos y golondrinas. No había aviones, como no les hay en ningún pueblo.

19-Mayo. Laguna de Duero.

Hacia las 11'30 h.

C. ciconia - Me dicen que una pareja anidó en la espadaña de la ermita y le tiró el viento el nido antes de terminado. Durante 2 a 3 días al menos frecuente casa alta, tejado con baranda, sin decidirse a anidar.

Iglesia. Hay otro nido más de este año, posiblemente el de la pareja de la ermita, aunque opinan allí que es otro. Numero de nidos 1, al mas viejo. 2 al del año pasado y 3, al de este año.

Me dicen que ha habido "más de 20 cigüeñas en la torre" y que intentaban anidar. Relacionar con las notas del año pasado (más de 20 en el prado) los intentos de nidificación en chopo, el nuevo nido nº 2 y la instalación en Viana.

Por este año, establecimiento nido nº 3 ¿y intento en la ermita?
¿Aumento del número de cigüeñas?

Nido nº 1 - Al asustar la incubadora nº 2, la del 1 castañetea acercándose a 3 ms. de mí, sin verme bien. Después huye al acercarme.

Nido altura, 1'30 ms. Hay 4 pollos. Uno mayor, grandes plumas ala y cola, espaldillas semi emplumadas y cabeza totalmente, así como - mucho cuello. Es impresión general y no numérica. Otros 2 casi -- iguales al anterior y entre sí más chicos y menos emplumados, los 3 estaban en pie antes de subir yo. Anilladas de mayor a menor. nº F.7, F.8 y F.9. El pollo F.10, era mucho más pequeño, apuntando cañones, como los anillados ayer, y prob. masiva.

El huevo, con gruesa costra de suciedad, como barro, tenía feto totalmente desarrollado, muerto y algo podrido, con una pequeña bolsa vite lo, saldría a los 1 - 2 días, quizá 3. Ya en casa le ví con un agujero, quizá hecho en el transporte, no probable, y otro más bien poco grueso, que no atravesaba del todo.

Pollos se echan y permanecen quietos, los de ayer gritaban, murmullo ronco, al cojerlos. Hoy no les levanto en peso, Se dejan anillar muy bien.

Les hago regurgitar buche, oprimiendo de abajo arriba. Devuelto después a sus propietarios, cebandoles, tragaban bien. Encontré, sin mirar bien los insectos.

ConCont. est. -

- F. 7. Vacío.

- F. 8. 2 Carasius, uno rojo de unos 12 cms., apenas le cabía la boca; Rana sculenta, 1; Natrix maura, de unos 15-20 cms. y unos 10 insectos, todos al parecer, (en examen muy somero). Larvas de neuropterus ya grandes.