

7-Jun. Valladolid - La Catedral.

10- 11'30 h.

Ph. ochrurus - En el pifion de la fachada, reclama un ♂ y veo una vez la ♀. Anidan aquí sin duda.

F. naumanni - Solo hay un pareja, y veo ♂ y ♀, busco su nido (en los del año pasado próximos fachada) sin éxito. ¿Quizá no va puesto?

Sturnus unicolor - Sale uno de debajo de unas tejas.

A. apus - Hay muchísimos. Entran en 2 puntos bajo el alero.

C. domestica - Casi cojo una por las alas. Un nido con dos pollos de unos 10 cms., sobre algunos pajas. Calculo que he visto, sin mirar nada bien unas 4 parejas. No habrá ni 10 en conjunto, y acaso solo 4.

8-Jun. Medina del Campo.

Iglesia 1ª, al entrar desde el paso nivel.

Cigüeña - 2 pollos grandes, al menos. Inaccesible desde la torre.

Coloeus - Campanario, 2 pollos, cañones empezando, muertos. Nidos en agujeros del campanario por el interior, alturas sobre el piso 3-6 ms. Muy asequibles varios. Examinados.

Nidos 1º - 3 pollos cañones-pluma. Profundidad hueco, 50 cms. lecho trapos, mechones, raicillas, pajas y creo hasta boñiga.

2º - 4 pollos desnudos, de unos 2-3 días. Prof. unos 65 cms. mismo lecho que el anterior.

3º - 2 pollos al menos, desnudos, de 2-3 días. Prof. unos 70 cms., mismo lecho. Todò el pasadizo entrada con restos del lecho.

Hay otro nido con pollos grandes, emplumados, me dicen; y bastantes más que no miré, los monaguillos se comen los pollos cuando están grandes.

Por los 2 pollos caídos, debe haber buena proporción de sus víctimas.

No conocen los monaguillos a las lechuzas.

En el Castillo vi grandes bandos. Pueblo, abundantes vencejos y primillas.

8-Jun. Villafuentes - Medina del Campo.

Buen día. Miro poco.

Corvus corax - Información. Anidan allí, les distinguen bien de C. corone, (más grandes, pico más grande y fuerte, grito más ronco). Anidan en pinos. Algunos incluso en este pinar. El año pasado cogieron 3 nidos uno de los chicos.

C. corone - Muy común. No miro nidos. Cogen pollo con bastante pluma ya. Veo nidos que antes ocuparon. Uno molestando a Buteo que cazaba a un conejo, 10 y 8 juntos en 2 ocasiones.

Información. Clamator parasitiza casi exclusivamente a esta sp. y en varias ocasiones a Pica. Ya hay pollos en bando.

Coloeus - Nido pitera no lejos casa, buena altura, con pollos grandes por el piido. Anidan algunas.

Pica - Común. Un nido alto a unos 7 ms. con 5 crias empezando a echar cañones, miradas bien, ninguna de crialo. Veo otros, uno en monton de cargas de ramera, altura 130 ms. Anidan allí a menudo. Poco parasitizados crialo Información. Ya hace tiempo hay familias. Hoy en Valladolid, 2 crias volanderas en la Oberuela.

Carduelis - Anida alguno cerca casa.

Acanthis cannabina - Anida alguno cerca casa. Hay nido de pollos? pino. No mirado.

Lanius senator - En un punto, pinos.

L. excubitor - Una familia, en ceba, pollos que vuelan bien (unos 4) ambos padres ceban, les llaman charros (onomatopéyico). Hace tiempo se vieron las primeras camadas. Esta en pinarillo p. pinea de unos 5 ms., se alejan más de 200 del punto primitivo al perseguirles. PriPrimi, ha cogido pollos volanderos, cazandoles de arbol en arbol.

Lullula = pajarota cucuruchera. - !Quizá se refieran a Galerida! Cantando en varios puntos incluso en pinar denso rodeado de claros.

Oriolus - Vistos y oídos varios. Hay en Valladolid, Oberuela, pocas. Según Carlos este año escasean por doquier, pero yo el año pasado, buscándoles, creí lo mismo.

Clamator - Dos se persiguen. Otro más. Ya hace tiempo tienen crias. Inf. No conocen Cuculus.

Upupa - Clamando.

Coracias - Nido Picus, 2'5 ms. pino, 4 huevos, de ellos 3 frescos y uno ligeramente incubado. Se deja coger la ♀?, echada. Ooteca. Anidan bastantes por aquellos pinares. Cogen uno con lazo. Carraco.

Cyanopica - Rabilargo, junto a Balneario, varios, chopos.

Falco tinunculus - Chigre. Veo varios. Examinó 2 nidos.


1º - Nido viejo pino, 6-8 ms. encima de pino negral, 3 huevos con feto pequeño, la ♀ incubaba. Ooteca.

2º - Nido viejo Pica, 6-8 ms. media copa negral, 5 huevos bastante y uno ligeramente incubado. Ooteca.

Según Primi, anidan casi todos los años los mismos nidos, Ahora creía estarán terminando puesta, aunque esto no está conforme con lo observado

8-Jun. Villafuente - Medina del Campo.

Bajo tocón pino, encuentro egagropilas indudables. En ellas una cabeza entera de Gryllotalpa y restos del mismo muy completos. Deduzco que - aún teniendo preparada una egagropila siguen cazando y vomitan sin digerir apenas las últimas capturas. Esto nuevo para mi. Encuentro en -- algunos de las mismas egagropilas piedrecitas, cuarzo, de buen tamaño, redondeadas. (Fig.).



Estas piedras recogidas indudablemente "exprofeso", facilita digestión. También nuevo para mi en rapaces.

Puesto junto a pastizal, juncos-conejos, límite pinar, altura 3 ms.

Alcotanes - No ví, aún no anidan.

Milvus sp. - No ví. Me enseñan nido vacío, negral, casi sumo, unos 12 ms. que aseguran de bilano cola hendida. Vi restos de 2 huevos y 1 pollo plumón recién nacido, que cayó hacia el 25-V., los huevos cayeron antes, uno tras otro. En el nido criaron C. corax, hace años, hay peleas con los bilanos para anidar. El pollo parecía Milvus pero no conozco los de Buteo. Nido, pelos conejos, al menos 2.

Buteo - Ante mi caza un conejo. Se agarraba una pata pimplollo, ras suelo, y con otra conejo por el cuello. Pelea desesperada. Un grajo volaba al lado y un conejo, también grande, corría en círculos alrededor y a unos 3 ms.

Volando en 2 ocasiones, le llaman A. ratonera, pero la confundían con Milano. Dicen salen del nido con aguiluchos.

Burhinus - Oí al atardecer y aún de mañana en unos 10 puntos y les ví en 3. Son extraordinariamente comunes. Dicen ya pollos que empiezan a volar. Vi nido abandonado ya, avena, 2 pies mata (parece que esto -- apenas influye en la elección. Ø unos 16 cms., prof. 4-5 cms. Sin -- ramitas. En pinar, no lejos claro.

Otis tarda - Veo nido que cogieron anteayer. Claro unos 200 ms. Ø entre pinar, abierto a cereales por un lado. Junqueras pequeñas y gramíneas (zaragüelles y algo como avena silvestre), escasa altura.

El nido entre estas hierbas que levantan unos 20 cms. únicamente. Era depresión ligeramente ovalada, prof. 5 cms. Ø, 25 x 38, en arena. Algunas pajillas, del mismo terreno (quizá menos que en el terreno, por la excavación) y una pluma abdomen, 1 huevo, con feto pequeño. Ooteca.

A 8 pasos otro acortadero o nido, idéntico, ligeramente menos marcado, Ø 25 x 27 cms., más o menos, y con más hierbas. (acortadero ♂?)

A uno o dos pasos del nido se habría excarbado yerbas en depresión circular del tamaño nido.

8-Jun. Villafuente - Medina del Campo.

Inf. - la ♀ se dejaba acercar arrastró en ala y fingiéndose herida hasta 6 ms. intentando alejar del nido en dirección campo abierto. Parece que anidan allí bastantes y cogen nidos y pollos con frecuencia.

Sisón- Visto uno. Dicen que aún no han puesto.

Streptopelia - Varias parejas. Menos torcaces, (solo una o dos).

Chotacabras - Me dicen no han empezado a poner. El 5-VI, no encontré nidos casajera, Sotillo, Valladolid (de Cap. ruficollis).

Alectoris rufa - Un nido en medio de una junquera en un claro del pinar. Vacío. Mata junco unos 40 cms., bien escondido. Depresión lig. y ras terreno.

---

Un nido en un chopo solitario, Picus agrandado, 1'30 cms. alt. con un huevo blanco (mochuelo? Coracias). Fondo serrín húmedo. No salió pájaro y miramos 2 veces. Parece que hace 7 días no había nada.

---