

19-Jun.Toro.

Santisima Trinidad. N. 3 pollos, 2 se vuelan, arriba uno E. 18.  
Otro crias grandes, en el Arco del Reloj, inaccesible (por pararrayos).  
Han anidado en otra Iglesia ¿hará un par de años? No hay ni nido ahora.

Primillas - Muy comunes. Varias con cebo.  $\varphi\varphi$  plumaje malo (falta -  
remijes) no se si los  $\sigma$ . - Un nido en el hueco de la torre, con 3 po-  
llos plumón (ojos semicerrados) pequeños, puse anilla. Deben anidar  
algunos en los cortados (quizá Cernicalos).

Vencejos - Muy comunes. Están retejando una Iglesia y destruyendo  
muchos. Negros.

Golondrinas - Comunes. Me dicen que ayer nacieron crias de un nido.

Sturnus - 3 nidos vacios, en las tejas.

No hay Coloeus. En los cortados cogieron un Cuervo, 4-5 pollos, hace  
unos 10 días.

19-20-Jun. Castillo.

Buen día, el 19 por la tarde desde las 16 h. hasta el anochecer,  
en Laguna y encima pinar.

Dia 20, antes de amanecer, hasta las 18 h. Taxiado malo.

Laguna - Unos 300 x 100 ms. de agua limpia, y no 600 x 200 como dice Par  
do. Suelo firme, dicen hay pozos artificiales con légamo donde se  
hunden, de 1 - 3 ms.  $\emptyset$ .

Amplio borde carrizos, de 15-25 ms. donde menos. Typha angustifo  
lia, más rara y Typha latif. Algunos lirios.  
junco de rio.\* Muchas algas, manchas aflorando, "laurel acuático"  
escaso.

Ranas, escasas. Tencas me dicen, grandes, se pescan poco y con red.


Multitud de sanguijuelas hambrientas. No hay barca ya. No se caza  
apenas. Hay otra Laguna, con carrizo cubierta, a unos 10 kms.

(Laguna del Pego).

Valle, rodeado de encinar arboreo,<sup>(1)</sup> abierto extremos en junci-grami  
netum con zarzas y regato.<sup>(3)</sup>

\* = Scirpos lacustris

19-20-Jun. Castillo.

⊕ = *Circus aeruginosus*↓ = *Fulica*⚡ = Lugares que frecuenta *A. platyrhynchos*

▨ = ESPADAÑAS

⚡ = JUNCOS

▧ = CARRIZAL


Población. Laguna.

Anas platyrhynchos - Contados 68 al máximo, al tiempo. De madrugada y pendientes del valle abajo entraron unos 100, en banditos y sueltos, la laguna es más bien dormitorio diurno, donde se acogían los del Duero (unos 5 kms. en línea recta).

Todos los vistos bien eran azulones; 8 ♂, probablemente más; casi todos probablemente juv. de este año, volando bien. Algun ad. volaba mal o no volaba, quedando escondidos entre espadañas y carrizo, ♂ colorido - bonito aún.


Fulica atra

Un nido, clarito espadañas y carrizo. Hecho de carrizos bien doblado, con plumón. Dos entradas. Cerca del borde interno carrizal.



Qui... (se ve) parecen Strepops, (no, in... no lo cre...

Ad. contados al máximo 9. Habrá más. No en parejas. Visto bien uno, en estas posiciones - parecía lobulada la frente ¿Eran F. cristata? lateralmente no parecían cuervos ni de frente.



Pollos. Contados al menos 7, probablemente bastantes más y de más de una nidada. Todos de igual tamaño, pero dispersos por toda la laguna. Algunos en grupo, localizados.

Veo un ad. bucear y al pollo cogerle las hierbas del pico (primero los de la derecha y luego los de la izquierda las 3 veces). Algunas veces siguen a los ad. pero hacen vida independiente. Tamaño gallinula. Cuello más blanco anteriormente. Parecen en plumón. No veo cresta blanca, pero cabeza gruesa, abigarrada o confusa de colorido.



Muchas persecuciones de ad y juv. o ambos.

19-20-Jun. Castillo.

Podiceps ruficollis - Oído y visto 2 veces, ad. librea de verano, muy oscuros. No vi pollos. No se asoman casi al centro y hacen - la vida en el carrizal.

A. arundinaceus - Muy común, cantando por doquier, (incluso de noche cantaba alguno)

A. scirpeus? - Le oí cantar, (podría ser pollos de arundinaceus?) con su canto débil.

Cettia cetti - Le oí 2 veces.

Un nido de Cettia o scirpaceus, alt. 60 cms. carrizal denso. Sujeto a una planta y carrizo. Vacio totalmente de flor de carrizo (penacho) Muy redondo, hecho y sin acolchar.

Circus oeruginus - Dos parejas, tenía crias grandes, dispersas en el carrizo. (Picaban). Oí grito. Se posan mucho en el prado reseco, probablemente cogiendo insectos. Asustan a Fulica. Hay probabilidad de que hubiera otra pareja.

Los machos, ambos iguales. Hacen muy abigarrados. Probablemente - nido en typha arrasada, cerca del borde interno del carrizo, ¿también se tiran al carrizal?, tendrá crias, al menos no incuba.

Ambos ♂♂ se perseguían alguna vez.

Ardea cinerea - Un juv. entra de mañana.

C. ciconia - 2 en el prado. Creo oí Gallinula. No vi Yxobrychus y miré bien.

Junci-graminetum.

Hay buenos prados a lo largo del valle. De uno salieron 3 azulones. El regato, con alguna zarza. E. calandra, escasa, cantando de mañana; S. torquata, 1 pareja; Hypolais poliglotta, unas tres parejas cantando bastante.

No vi Motacilla flava junto a la Laguna y el sitio es bueno.

Encinar. Arbóreo, en algunos sitios arado (trigo, yerbas, etc) en otros inculdo. Pinarillos.

Ocupe toda la tarde.

19-20-Jun. Castillo.

x = canta.  
 x m = c. mucho.  
 x p = c. poco.  
 x = apenas canta.

- C. corax - Oído en el pinar y otros 2 puntos (Toro, nota).
- P. pica - Algo común. Salen del nido con pollos, en encina.
- Sturnus unicolor - Bandito de 15 y otro de cientos al amanecer.
- Oriolus - Común, en el pinar, encinar. Vi fam. completamente crecidos. Una pareja ataca a Cuculus.
- No conocen el charro que vi en el fresnedo de Monte la Reina.
- Verderon - Varias parejas, no muy común, canta poco.
- Verdecillo - Bastante común. Crias independientes. Canta.
- Pinzón - Muy común, quizá el ave que más. Cantando mucho. Alguna fam. grande.
- Jilguero - En el prado y un poco por doquier, parejas.
- Emberiza sp. - Oí un chiel.
- Emb. calandra - 3 pares en el prado. Cantando.
- Passer domesticus - Casa.
- Petronia - Muy común. Casa, encinar y edificios.
- Parus major - Común. Solo fam. o grupos de juv.
- P. coeruleus - " " " " "
- Lullula arborea - Canta una vez y veo otra.
- Galerida - Varias parejas, probablemente malabarica, en triguero y encinar.
- E. senator - Común en el encinar, parejas. No veo aún crias. Salen del nido con crias, encinas.
- L. excubitor - Escaso o raro, 1 punto.
- Ruiseñor - Escaso x p. No en el encinar.
- Hypolais - Escaso x p.
- Sylv. hortensis - Encinar, pinar, una pareja. Cebando crias colicortas, cobrada una.
- Golondrina - Casa y transformador. Nido 4 juvs. en cañones, anillados. En nido viejo anida Ph. ochrurus.
- Ph. ochrurus - Casa - nido 5 juvs. desnudos-cañón, anillado. Otro probable, juv. independientes, (2 que van juntos). En otro punto.
- Vencejos - Sale de la Laguna y corre.

19-20-Jun. - Castillo.

Motacilla alba - Andando casa.Merops apiaster - Cerca de la Laguna y en otros puntos colonias bastantes numerosas.Coracias garrulus - Al menos en 5 puntos. Es francamente numeroso. Uno se posó en un agujero de la caseta del transformador, donde probablemente anidaba. Volaban sobre ella y en el carrizo y en vuelo bajo oblicuo daban de pecho en la superficie con un chapoteo y picoteaban algo de la misma superficie. Esta pareja cebaba pollos.Dryobates major - Visto uno, tamborileaban en 2 puntos.Upupa - Encima seca, 2'50 ms. agujero, nido 6 pollos, uno muy retrasado, desnudo, no anillado. C. 411 - 415. En cañones desnudos. Otro nido bajo teja con 6 pollos y con h. con pollo grande! Un pollito recién nacido no anillado, los otros ya ha ta cañón- algo de pluma. C.188-90, C.417-418. Anillé un ad. que después cebaba C.187. Ceban ambos padres. Reuniones familiares en el encinar, de pollos independientes.Caprimulgus europaeus - El chorro-chorro precipitado y confuso era de estos y no de ruficollis. Una se posó 2 veces en rama de encina seca a unos 4 ms. de altura. Debía ser un sitio de canto habitual.

Calculo una pareja cada 300 ms. en el encinar arbóreo, en llano y - lomas. Es francamente común.

Otus scops - Alrededor de la Laguna reclamaban en unas 6 puntos distantes unos de otros unos 400 ms. Es muy común. Uno entró algo al reclamo.Athene - Le oí solo en dos puntos.F. subbuteo - Vi 3 veces, solitarios. No vi F. tinnunculus.B. buteo - En 2 puntos, chillando miav. Debía ser suyo un nido en pino albar (solo hay P. pinea) a unos 7 ms. tronco-ramas bajas. No me ha parecido muy común.Conocen bien el milano, que no ví. (Hay en Monte la Reina M. milvus!)Circus oeruginosus - Laguna.En el pajar, excrementos de Tyto o StrionFulica. A. platyrrincha. Gallinula . Podiceps ruficollis. Laguna.Coturnix - Cantando p. 3-4 puntos del pastizal. Cantó de noche.Alectoris - 3 parejas. Cantando algo en otros 2 puntos. Es común.Streptopelia - Muy común. Me entraron unas 25 al bebedero en 1 hora. Es el ave grande más abundante con mucho. Me traen pollo casi volando, nido en encima. x m.Columba palumbus - x m. Muy común por doquier encina arbórea.Dicen que cria C. oenas, pero pocas.

Valv. 1952.

41.-

19-20-Jun. Castillo.

Burhinus - Chilla en unos 4 puntos. No es común.

Cuculus canorus - Cantaba Pe-ku.- Pe-ku, al amanecer, y tarde en unos 4 puntos del encinar arbóreo y encinar-pinar. Es bastante común allí.

---

Peleagonzalo. Sturnus unicolor. Bastantes en Iglesia.

C. ciconia - Nido pollos grandes en Iglesia.

Monte la Reina. Soto amplio. Fresnedo.

C. cyanea - común, 2 grupos en fresnos. Luscinia- común x b.  
Coloeus - Un gran bando (en Iglesia Toro no les conocen!)

20-Jun.Castillo.

Taxiado encinar arboreo, sin soto-bosque de mata, junto a la Laguna;  
 ~ 1 km.; h. Amanecer ya salido el sol; un trocito de suelo herboso  
 y otro de matorral (L. senador)

x = ♂ cantando.

l = pareja vista ~~con~~ oída.Pica - I - IPinzón - X X X. fam.Oriolus - x-x. fam.Verdecillo - x-x.Petronia - I Fam. (hay un corrillo, prob. con varias familias).Jilguero - ? I-I.P. major - Fam.-Fam.-Fam.-Fam.P. coeruleus - Fam.-Fam.Lullula - I-IL. senator - IDryobates - ICerthia - IUpupa - I-I-I (quizá crias independientes? Estas van en grupo)Cuculus - IAlcotán - ITórtola - x-x-x-x-xTorcaz - x-x-x-x

---

19 sps. pero había en este ~~trozo~~ más o menos 4 Otus scops y varios  
C. europeus y faltan perdices y muscieapidos.

---

Encargado del Castillo.

Joaquín Santos.

Castillo. Pelea Gonzalo o Toro?

---

Las sps. relativas más comunes en el encinar son:

Tórtola, pinzón, abubilla, torcaz, P. major.

Castillo 19-20 VI-52

Podiceps ruficollis. Oído, y visto bien 2 veces. ad. librea verano. muy común.  
No vi pollas. No se arrastran con el viento y hacen la vida en el carrizal.

A. arundinaceus. Muy común. cantando por doquier. (¿videns de unche cantaba alguno).

A. scirpaceus? le oí cantar. (¿podría ser pollas de arundinaceus?) con un canto débil.

Cettia Cetti. le oí 2 veces.

Un ruido de Cettia o scirpaceus. alt. 60 ans. carrizal denso.

Suspeto a una planta y carrizo. Vario <sup>penacho</sup> totalmente de flor de carrizo (penacho). Muy redondo. Hecho y sin acolchar.



Circus aeruginosus. Dos parejas. ~~en que ambos ~~se~~ ~~eran~~ ~~terris~~~~. Tercera pareja grande. dispersos en el carrizo. (Pialcan). Oí grito. de prom vuelo de que hubiera otra pareja. anatan a Fulica. Hay multitud

~~los machos~~ ~~ambos iguales~~



Cuerpo estirado y cabeza confusa, que hace clac. solo gris.



negro hacen muy silenciosos.

Prob. visto en Typha arundinacea, cerca ~~cerca~~ borde interior carrizo. ¿ambien se traza al carrizal? Tercera oías. al menos no incuban.

ambos. ♂♂ se persiguen alguna vez

Ruinicus . E. novo xp. }  
Hyalais . E. novo xp. } No. en cuinos.

Syr. lottensis . E. nov. - pin. una pieza. Cebando cinco colicatas cobradas una.

Polodrius . Cara y transformados. Nido 4 jiv en cañones. amillados. En nido viejo avide Ph. ochunus.

Ph. ochunus . Cara - nido 5 jiv, desnudos cañon, amillado. Otro jiv. jiv. indep. (27 que van juntos). En otro punto.

Verejs . bla lengua y ave.

Mutilla alba amillado una.

Merys aprinter . Ceme de colonias bastante numerosas.

Coacias garrulus , al menos

numeroso. uno de pro en agujero, partes de transformados alrede jiv. avideba. a uno 5 nro. avide. . . Esa pareja pesaba? en la lengua. lo vi perfectamente volaban sobre ella y en el cañon y en vuelo bajo officio dabam de pecho en la superficie con un charpoteo y picoteaban algo de la misma superficie. Este pareja cebaba jollos.

Dryobates major . Visto uno, torse borleau en 2 puntos

Uprus . E. nove ma, 2:50 nro, agujero, nido 6 jollos, uno muy retrarado, desnudo no amillado. c 411-415. En cañones - desnudos. - Otro nido bajo teja colortiro cegayropilas de ella) con jollo grande. Uno jollito



Entroba con 6 jollos y un ha reien usado no amilla-

do, los otros ya hasta cañon - algo de pluma c 128-9-90 c 417-418, amilla' un ad. que despues cebaba. c 187. Ceban ambos jollos. Familiares familiares en el cercano. de jollos indep.



la lengua y en otros puntos en 5 puntos. Es fuercamente