

- 29-Jun. El Alambrado (Quintanilla de Onésimo).
- 28-Jun. Tren que sale 17'55, llega a las 21 h. Salida al monte con gran nublado y algunas gotas.
- 29-Jun. Antes de salir el sol. Mañana buena, con viento, tarde nublada amanazando tormenta, no salgo casi. Volvió tres a las 11'45, llegada aquí a las 21 h.

Todo el valle con pinar, viñas y regadíos y cereales, laderas desnudas tras de Tudela y Traspinedo. Hay un buen cortado cerca del río, tras el pinar de Traspinedo.

Quintanilla. No vi nido de cigüeña (uno al menos en Tudela). Laderas norte cultivadas o peladas excepto un punto, muy altas, las del Sur As. P. pinea - P. piaster - encinar.

Alambrado - Páramo calizo, casi sin arenas. Aflora la piedra pero erosionada. P. pinea (explotado) P. piaster (a corros y disperso resinado) y matos encina. Algún roble. Muy escasos sabinos (verdaderos) no arbóreos. Cantueso, tomillo ¿sardinilla? "Savia, arnica, lechetreznas, muito (musgo de pinar) y almuérgago. (Saben lo extiende T. viscivorus). Escasas todas estas.

Monte seco, muy parecido a La Fraila pero sin estepas. Sin regato.

Graja. Marica.

C. corone, Pica - Se oían, pero no comunes.

Cyanopica - Común, junto a la casa, en albares unos 6-7 nidos, examinados 2. (Nota) 1º, 6 pollos cañón-pluma y h. huero (cobrados ♂ y ♀). 2º, abandonado, 4 pollos muertos. Otro viejo mismo pino que el en donde anidaron (2 parejas mismo pino) el año pasado. Una fam. volandera, yo no en ceba o terminando, otros en ceba. Está terminando la cria.

Vi al menos 2 nidos separados sueltos, lo corriente es que el bando anide disperso en un pequeño corro, unos 6-8 nidos y es raro 2 nidos en un mismo pino. El resinero se les come, pero no le hacen mucho caso. "Rabilargos".

Solo la ♀ mancha incubatriz, sin cañones borde aún. Plumaje bueno. Al quitar nido me picaron y arañaron más de 15 veces en el cogote.

Conocen la grajina que en Cora (Segovia) donde hay también de pico y cuervo llaman paloma francesa. Chova, allí no mucha, dicen viene menos que hace 40 años. Garrulus, (Gallo de monte arrendajo) se vé en invierno, pero no anidó allí (dicen que quizá lo haya en laderas espesas montes próximos).

Alambrado.

Oriolus - (Goropendula) Algo común, canta poco. Ya han salido nidadas.

No anidan fringílidos. Solo Petronia (varias parejas casa "Jiria". Primero conocía Loxia común en (Albacete) en pinares de carrasco. Se reúnen bandos fin verano, bebederos - liga y red. Dicen hay 2 clases (o y o??)

29-Jun. Alambrado.

Parus major - (chapin). Fam. independiente.P. cristatus - (chapin moñudo) x trololo.

Asociación patente en bosque de nogal. No abunda

Certhia - (chapin).Lanis excubitor - charro. Escaso.L. senator - Común. Veo uno llevando cebo. Es el pájaro más común quizá quitando Syl. cantillans.T. viscivorus - Poco común. Veo unos 4. Charra, charla. Saben que es muy temprana de cria (Marzo) y hacen otra puesta en los alrededores de la primera en otro nido.[Mirlos - Solo se ven escasos en invierno.. No anidan nunca]Sylv. cantillans x b al amanecer y x algo todo el día. Vi bien algun ♂, bigotitos limpios.. Alguna cebaba. Matas de encina, van-
tando en los pinos, común, (la que más).Sylv. hortensis - Un ♂ x m. me llevó 500 ms. tras el, sin dejar de cantar fuerte y sonoro.Lullula - Tutuvilla. Muy común x p. 1 nido vacío. 4 dedos Ø, al pie de matita de tomillo. Sabían 4 nidos y les robaron (lagartos?) sin dejar ni cáscara.Hirundo - Nido 5 crias cañón, anilla A 530 - 591 - 94, la ceban dos parejas según me dicen. Hay 4 ad. y un solo nido, -viga de cobertizo pueden cogerse cerrando puerta. Respetan.Apus - 2 volando juntos.Caprimulgus ruficollis - Capacho. Los 4-5 que veo, de esta sp. unos posándose en árboles y en bosque de nogales prieto también parecían. Andan más cerca de matos de encina. De mañrugada oí muchos, no "caba" claro sino "co-chor". Hay probabilidad de ambas sps. sueltas y en parejas.[Conocen al abejarruco y azulejo (carraca) que cría]Clamator, = Crialo - Ya no quedan casi. Hace 15 días 2 juvs. con 4 Pica juvs. cebados por estos. Parasitizan Pica y Graja. (Dicen róm pen y comen huevos). Saben de antiguo que los 2 cucos comen procesio narias y son los únicos pájaros que lo hacen.Cuculus - Me dicen se oye alguna vez. Una parasitizaron Tutuvilla.Upupa - Bubillo. Poco común. Vi sueltas.Picus - Algunos.Dryobates major - Menos aún que Picus. 2 tamborelios y uno volando.

29-Jun. Alambrado.

Otros.

Zorros. - Saltan cerca. Garduña, -(pecho blanco) cazó cepo 8-10 los 2 primeros años. Tasugo, algunos. Turón, bastantes. Comadreja, bastantes. Ardilla, pocas, en negrales, este año no han visto.

Liron - Buscamos 2 en nido de Picus 1'50 ms. (no están ya, molestados 3 días). Fondo del nido musgo verde y cegados. Miro 2 nidos de Pica, en uno cagadas. A veces crían montones piedras. (Todo igual que en la Fraila), les comen. Pronto (ya algunos criarán) sobre todo en nidos de Pica. Gran destrozo de nidos, le destruyeron palomar. Muy dañinos. No hay ratas casi.

Gatos escapan de las casas todos los años y se asilvestran. No Gineta.

Culebras "grandes verdosas" pocas. L. ocellata, común. Vi "ahora ponen" Lagartijas pocas, vi una en el soto. Más en abril - Mayo". Sapo tiñoso", cogí renacuajos, escasea, en grupitos.

Procesionaria, se entierra en arena dura, juntas y dejan el terreno "como cemento". Ahora salen mariposas, (vemos 3-4 en los potes).

Cyanus - Muy abundante. Salen ahora, agujeritos lavas en terreno arcilloso y duro. Camisas.

Alcaraván - En 1 punto chilla. "Escasea allí".

Alectoris - Común. Hace días nido con 14 huevos salieron 13 pollitos, hacía el 23-VI. Hace 30 años alambraron por arriba, 2 observados de finca y criaron a cientos.

Tórtola - Común, x m. Un nido albar, me salió de ala.

Torcaz - Común. Un nido albar, de marica viejo, incubando. No salió al golpear. "estara sacando". Unos 20 ms. nido de cernícalo. No suelen anidar en nidos de Pica. Cuando pollos grandes salen "de ala". Guarda, dice anidan más que tórtolas, "invernan un pocas menos que en verano". "Llegan muchos a la bellota" "hay paso activo. Comen piñones en el negral. No anidan serranillas.

Anidan cerca de Sisonas y avutardas (alguna cruza el monte) y chorlas tripa blanca. En invierno Garzas. Hay paso activo intenso de Grillos, que conocen bien en primavera y otoño, pero no siguen el Duero al parecer (como decía Bernis).

En los cereales ladera Emberiza calandra, x b. común vi, y oí otro pájaro desconocido. Oenanthe sp. (probable hispanica, por la descripción, anidó hueco muro de casa, 1'30 ms. (vi nido, huevos azules) hace una semana, le robaron.

Buteo. Aguila. No vi; buena descripción, grito y color. Vi un nido albar, donde cogieron 2 crias hace un mes, al lado había otro, albar, ambos ramas bajas de unos 6 ms. ramitas pino. "le hacen ellos mismo y a veces arrancan ramera del mismo pino". No vi nada debajo Lagartos, bichos, conejos.

Algorrón - Rapaz algo menor que aguila, "apedrean = pedrés" Los 4 últimos días han visto uno en bosque de negral denso. Pierdo una hora buscándole. Se esconde en pinos

29-Jun. Alambrado.

silenciosa, no vuela alta y solo sale de repente a cazar. La "grajean" Pica y graja. Es fuerte "pechugona". Caza torcaces, conejos, tórtolas.

Se mueve poco, la descripción concuerda con azor. Conocen alcotan palomero (anida?) y le distinguen bien de esta.

No hay allí milanos. (En Coca anidan M. reales en pinares).

Me hablan de un aguila blanquecina tamaño Buteo, que es probablemente H. pennatus.

Neophron - Buitre blanco. Pasa uno dando vueltas, a media altura, mirandones con curiosidad. Ad. buen plumaje. No saben que anide - cerca.

Athene, Mochuelo. Le oí en 2 puntos de laderas y 2-3 cerca de la casa.

Conocen Lechuza y cárabo, anidando en nidos viejos ambos. Buho común? y !Gran duque! "grandon, con orejas, que hace bo - hú" y otro grito que imitaron. Quizá lo hayan visto y confundan grito con cárabo. No saben si anidan.

Falco subbuteo - Alcotán. Vi uno, dicen crían bantantes, tardío.

F. tinunculus - cernícalo. Vi 4-5. Un nido con 2 huevos hueros - (ooteca) y 2 juv. plumón pluma, que "volarian dentro de 7 días", anillados. Nido albar, marica, plano. A unos 20 ms. uno de torcaz. Han observado que la torcaz anida muchas veces cerca de alcotan, o cernícalo.

Buscamos varios nidos de este. Saben donde anidan unas parejas todos los años. En un corto corro hay varios nidos (3 - 5) que vienen utilizándolo año tras año. Si tienen h. sale la o al golpear el tronco. Si tiene juv. hay cagadas debajo. ("muy pronto los pollos ensucian - desde el borde del nido"). Nidos de Pica y graja. planos.

Alimentación. Vi ad. con pájaro o ratón en garras, los juv. sin - buche, patas con sangre, no había plumas (probablemente ratón).

Vió primero a uno "cazando pollitos perdiz de 2-3 días. Se posaba en pino, se tiraba a por uno, al caba de un rato volvía a por otro. Seguramente tenía crías y cebaba" "Otro solto tutuvilla".

29-Jun. El Alambrado.

Rabilargo.

Capacho y engañapastor y gallinaciega. (Cambian)

Alcaraván Cuculus

cuco-cuclillo Clamator

bobilla - paredes y majanos

Cuervo - Sedentario

Grajo

Grajina - Paloma francesa .La confunden con la de pico rojo.

Picapinos - Dryobates
Picus = Pito real.

Marica.

Chova.

Jiria = Petronia

Garupendula = Oriolus. Resinero, anidan en pinos.

Charra = T. viscivorus.

Cernícalo.

Algorrón = ¿azor? Halcon real.

Carranca = en Saniboaal (Segovia)

Buho gran duque. Se oye aquí, en el pinar.

Lechuza. Anida nidos.

Arrandajalo, arrienda a otros pájaros (les imite). Anida aquí.

Sinsona = O. tetrax.

Collaba = Oenanthe.

Minutilla.

Turones.

Tarugo.

Ardilla, negrales.

Lirones, destrozan huevos, incluso de Paloma.

El alambros.

Paluilargo.

capacho y espinafanta y gallinacega. (Cambian)

Alcaravan
cuco-cuchillo, / cuco
phila - paredes y muros

Cucos - Sedreptos → Chova,
paço = ~~paço~~

pisapinos [Droplatis] ~~pisapinos~~
manica [Pines] = palo red

Jajuis = Paloma francesa



los llaman en casa
los confunden con
la de pico rojo

Jirra = Petronia

garupendula = orides. - Resinero Anibau en finos
Cernialo.

algovion = ¿arv? Halion real
carranca = en Saniboa, Jergonia
duame = T. viscinus.

Bicho gran dulce = ~~cuco~~ se ayse aqui, en el pino

kehora = anida nidis.

arrandaño = anicuda a otros jajuis (bes unites) anida aqui.

Sinsona = O. tetrax

cellula = Oenanthe. ~~quintum melano~~

Minutilla.