

21-Dic. Valoria la Buena.

Buteo buteo - ♂ grande, plumaje bueno, "fasciatus" claro, Gordísimo, con grasa a montones. Cont. est. -  
- Un Pytimis.

Accipiter nisus - ♂ juv. diminuto. Ala Cola.

El Pinar, tenía en las garras un gorrión o que cogió en Veterinaria a las 9'10 h. Sin cont. est.


Larus excubitor merid. - ♂? El Pinar.  
Cont. est. -

- Coleopteros pequeños - 2-3
- Acrididos - (Ala rojinegra) 1
- Himenopteros - 1
- Huesos de anuro.

Hurón - Muy blanco, ♂ ad. en piel.

C. y cuerpo, 424; Cola, 143; Tarso, 56; Oreja, 22.

Laguna de Duero.



Buen tiempo, sin sol ni viento. 9'15-14'30 h.  
Pinar - Laguna.

C. frugilegus más Coloeus - Viñas y tierras  
(80) a partes iguales, más Sturnus. Frugilegus en banditos.

Corone - 1 (agua) (5) y pares.

Sturnus - Juntos hasta unos 150 en la torre y bastantes pinar x m. Bandos de más o menos 30, orilla de la charca. Veo bien unicolor.

Pinzones - Por doquier en el pinar, semidis-  
persos y varios en las tierras.

Un bando inmenso de unos 200 pájaros compuesto de .....

Passer montanus - Unos 200 (Bando homogéneo plantas prado unos (200), gran chillería y otro? más o menos (200) cerca del pueblo, mezclado con domesticus) (Uno muerto, desplumado, probablemente circus).

Carduelis - Veo grupos en el bando.

Serinus - Canta en el bando.

El resto F. coelebs. (♂♂ más o menos igual ♀♀) y F. montifringilla, que formarían un 15% de este resto. Había por tanto unos 200 pinzones reales.

21-Dic. Laguna de Duero.

En la cumbre de la colina, viñas, tierras, almendros, tirados juntos. Hacia las 14 h. se bañan en un charco en cantidad. (una o coelebs se deja acercar muchísimo). Solo pinzones y montifringilla, se bañan, sobre todo estos (en proporción). Son más mansos. De espaldas, rabdilla blanca como espejo.

E. schoeniclus - Probable siguiente. ver debajo

Em. calandra - X m. en el prado, (unos 15-20), y alguna dispersa.

G. cristata - (4), dispersos y solitarios, muy pocos, tierras próximas.

Alondra - // y algunos prado alto, bandos de unos (6).

Anthus praetensis - Visto bien uno de estos, calculo veria unos 40, pero se esconden mucho.

Motacilla - No hay.

P. coeruleus - 1 - 2, (tripa muy blanca) en las Phragmites as. con..

Phy. collybita - Unos (5) en 1 pt. As. con P. coeruleus y 1 grupito de 2 - 3 y semidispersos. En total 10-15.

Emb. schoeniclus - En total veria unso 25 al máximo. Pocos y semidispersos en Phragmites, muy comunes en junquillos. Un bando de más o menos 8 y el resto dispersos o semidispersos. Veria bien unos 8, un ♂ ad. y otro probablemente ♂ juv. (más contrastado colorido que en ♀).

Vuelo con brusco giros, cuando largo. Salen de muy cerca, y se ve cola. con lados blancos muy bien. Vuelo corto y posarse en tierra, o caños. En zumaque (algunos zumaques despanzurrados posiblemente por ellos). Deben comer junquillo, semillas. Apenas reclaman. Solo un "pgi" o "gui", espaciado, y el volar sobre todo. (in situ).

T. ochopus - 3 ó 4.

Capella - (10) y dispersos o grupitos reunidos de (3) o (4), unos 15 más.

Lynocryptes - 1 - (2) - (2) - 1 - 1 quizá repetidos.

Vanellus - Hay continuamente bandos, pero no aprecio paso claro. Juntos hasta (136) y anoto (20) (40) (75) (50). Indudable muchos repetidos. Habrá quizá 200 en sumo.

Ayer y mañana, Carlos, 3 probables Numenius que hoy no puedo encontrar.

Larus - Acequia de los Frailes, unos 60 que han estado allí todo el invierno, o al menos Leneis los ve casi todos los días.

Laguna - máximo de (64) al tiempo, pero hay muchos bandos que se reúnen. Quizá haya unos 100.

Sigue p. -