

Sylv. 1953.

30-Ene. Vegamayor.

Buen día, sol. Por la mañana una fuerte escarcha. 10 h. hasta la noche.

Camino.- Desde Simancas, apenas vi un par de bandos de C. frugilegus cerca de Fordeesillas, algún bandito de Pinzones, un par de ellos de Alondras. Ni cernicalos ni mochuelos.

Vega mayor. Propietario Gabriel Martín. Con él está Isidoro Asdrubal.

Soto caducifolio amplísimo entre el Duero (lleno de bancales de arena e islas de Salix), y la terraza llana con retama dispersa, tomillo, cantueso, una gramínea y Onopordon?

Retamar. Taxiado de unos 3 Kms. a medio día.

Genista.- Centaurea, Onopordon, tomillo, cantueso. Alguna rara encina. Es una As. subserial típica con encinas testigos, 2 liebres que abundan.

Sylv. undata.- 1

F. coelebs. (20) (15) unos (350) no lejos de la casa...

C. frugilegus y Coloeus. Un bando más 200, no lejos de la casa, de ambas sps.

Lullula. (5)

Picus. 1.

Alauda. más o menos (50) en terreno abierto con rala o nula retama.

T. ericetorum y T. merulae. Algunos dispersos, sobre todo cerca del soto (probablemente de él)

Caserío, Sturnus unicolor y Passer montanus.

Lista de sps.

C. corone. Común en el soto. Hay mucho pinar en Cubillos, Neva (Tras de pollos) y hacia el puente.

C. frugilegus. Común. Al atardecer pasaron unos 150 en dirección a los pinarillos donde dicen se reúnen muchísimos. Parece que hay un dormitorio grande en los pinares de Villamarciel. El de aquí es pequeño.

Coloeus. Comúnísima. Por el soto, lleno de chopos viejos agujereados había bandos muy numerosos. Probablemente anidan en los cortados. Donde más común la he visto, quitando en el castillo de Medina.

Sturnus unicolor. unos (25) en un caserío de Vegamayor. Algún jilguero, en el soto.

Passer domesticus, P. montanus, alguno en caserío. Pinzones, dispersos por el soto, en grupitos, común, no veo banditos (estilo viñas-almendros). Regulus ignicapillus, reclama mucho, con P. coeruleus, P. major, en parejas sueltas. Alauda, algún bando en tierras perdidas. Certhia algún Picus, 1 Dryobates.

En el matorral del soto, Turdus ericetorum, en grupitos y muchos sueltos, por la tierra, confidísimos, no se posan en los árboles apenas, muy comunes. T. merulae algunos. T. viscivorus, uno, de árbol en árbol. Erithacus, común en matos y bosquecillos. Trogloditas bosquecillo denso.

Valv.1953.

30-Ene.Rio. Entre los Salix de las islas. A. crecca 90-100 quizá otro bando, evolucionando cerrado. Se posan un rato junto a A. platyrrhyncha, 40 en parejas. Alguna pareja suelta de ambas sps. Ardea cinerea 2. Capella 1.

Larus ridibundus 22 en las tierras. Desde que se ha puesto la finca en cultivo bueno hay más, ¿Influencia?

En el soto, Torcaces 12-1-1-3-8 abundantes, en grupitos, (Restos una) C. oenas, cuento 20 mas 32 en un ratito. Parece anidan en cantidad en los huecos.

Buteo. 2-2 y probablemente 2 más. Parece abundar. Se posa en los arboles a 2/3 altura y no tanto como el milano en la pingorota.

Cavilan, una gran ♀ y probable otro. Cernícalo, uno en tierras (punta chopo). Según informes anida H. pennatus.

Bosquecillo de la Rivera del cubo. Propietario Juan Navarro Reverte. Madrid. Neguillos (olmos) y algun fresno, 600 x 400 ms, distante > 100 ms. del rio. Muy espeso, troncos finos, altos. Dividido por tierras. No lo frecuentan

Me dicen anidan A. cinerea, Milvus, Buteo y H. pennatus? unos 12 personas Encuesta oral a 3 nideros. No habian hablado entre ellos.

Que anidan? - Garzas, milanos, aguilas. Que garzas? - los del rio (los describen). Cuantos? - mas de 50 parejas (2); ms. de 100 (1) lo mismo otros muchos.

Donde? - En lo mas alto de los arboles - a corros - a veces 2 - 3 en un mismo arbol.

Como son los huevos? - Mayores que de gallina (1). Menores (1), Azul-verdoso; ceniza pálido.

Cogen pollos? - Bastantes (se los comen). - Que comen? - Peces que encontramos en el nido y en los buches (3).

Al parecer acuden a robar huevos los de Pollos. - Unos llamados "los Gagos" llegos obreros de la R. del Cubo - Albañiles de Valladolid (fam). Todos los saben y no le dan importancia. Algunas duermen allí todo el invierno.

Yo vi:

Numerosos nidos; en una ojeada circular cerca de 40 entre nuevos y viejos. Estan a corros. - Algunos indudables de milano, con trapos, altura 4-10 ms. (las bragas del hijo de la Sra. X, encontraron, me dicen) Otros de garza, con palote, casi planos a gran altura, sobre todo en encinas secas. - Desde lejos y ahora destacan los nidos en las cimas de los arboles más altos. - Habia algunos más pequeños que pueden ser de Nycticorax. - los mas grandes probablemente de garza viejas. (No anidan cigüeñas allí, aunque si en el caserío). Puede haber cientos de nidos, porque no miré todos, pero más o menos 150? Bajo los nidos, numerosos excrementos. Encuentro al anochecer.

(1) Milvus milvus. 34 en un solo corro entre los nidos, posandose o dormidos y otros sueltos, Toda la ribera está llena de ellos. Cogen despojos cerca de casas. Uno llevaba una tripa? Ems. rio abajo abundan (Mariano). Es la colonia más importante. Conté 35 el tiempo por la mañana.

(1) Se reunen allí a dormir muchísimos. Cazan topillos, al atardecer dias de viento, volando contra el, una nube.

Valv. 1953.

30-Ene. Ardea cinerea. 2, durmiendo, 2 en el río. (Mariano 6, una ad. sola, cobrada; en casa ahora) cerca del Puente Castroñño. Deduzco en toda la zona abundan y probablemente estas ad. son de la colonia.

Torcaces. Bastantes durmiendo. Buteo. 1- 2 parejas (de día)

Strix aluco. Una pareja se responde. Probablemente un tercero. Durmen muchos T. ericetorum, Erithacus, Troglodytes. etc.

30-Ene. Vegamayor.

Mamíferos - reptiles.

Información. Picheros - Guardas.

Han sacado este año 13.000 conejos.

No hay jabalies, ciervos ni lobos, ni les han conocido nunca.

Turones. - Llevan cogidos unos 15 este invierno. Dicen les pagan (tra-  
panos) hasta a 50'00 pts. pero no lo creo.

Gatos giletos = Ginetta, llevan 5 este invierno. Descrita bien, pagan  
nasta 45'00 pts. (25 en general).

Nutrias. Hay pocas.

Tejds - Comadrejas. (Descripción corresponde a armiño)

Garduñas. - de 30 años a esta parte se ha cogido 1, y ya hace casi 25 años de esto.

Topo de manos vueltas. (Descripción indudable Talpa)

Topo ratonero. (Pytimis), dicen cria ahora también.

Distinguen ambos ratones.

La camisa de la culebra, forro sombrero, quita dolor de cabeza.

Lagartos, Lagartijas. Culebras, Culebra bastarda (grande con rays negra de cabeza a cola (probable la de rays)

Rana - Arrecogel (e los rendeuajos).

Sapo. "El brinco del sapo, que estuvo 3 días persando y cayo en el medio. - A los torpes. - Creen que caen sapos de los "nublados".

30-Ene. Vegamayor.

Nombres vulgares recogidos. (Guardas y campesinos)

Cuervo = corone.Graja-grajo = frugilegusGrajeta = Coloeus.Marios.Pardales = P. carduelis.Colorines? =Jilguero.Ruiseñor.Mosqueteros.Chicha y pan - chichipán.Carbonero = Ph. ochrorus.Alondra mofuda = Galerida.Alondra real = Calandra = Meloncóriplo - Mochuelo - "Lechuza" - Cáramo.Pito = Picus.Canaca = Ceracias.Crialo = Glanator - Parasit. mericas.Cacú = Cuculus. (1)Soy de la opinión de aquel pájaro que nunca anida, pone el huevo en nido ajeno, y otro pájaro lo cria. CCuco = Upupa. Quien te ha comido la holla — Tú - tú - tú. (1)Abejarruco.Engañapastor = Cavar - cavar. (le tienen asco)Alcaraván - le cogió la zorra y él le dijo - A que no dices Alcaraván comió - la zorra lo hizo, él se escapó y, subido a un árbol, la gritó - A otro tonto, que no a mí.Perdiz.- Cuando la perdiz canta - y nublado viene - no hay mejor señal de agua - que cuando llueve.

- (1) Cuando el cuco canta - fuera la manta. Cante o no cante - la manta por delante.  
(Porque vaticina la primavera y oyendole se animan a salir sin manta y les cse un chaparrón).

Valv. 1953.

30-Ene. Avutardas. X, hay muchas más en verano.

Sisón. X

Aguila real = Buteo, sin duda.

Indicaciones vagas de Aguila real verdadera.

Aguila perdicera = trípa blanca- como milano, anida. = H. pennatus prob.

M. ...

Bilanos = M. milvus y M. migrans.

Garza.- Vaticina muerte. (Me cuentan un caso que vieron) . "Cuando la garza viene al lugar, chico o grande ha de llevar."

Fatos. anidan bastantes.