

Valv. 1953

1-Mayo. Valladolid- Fuensaldaña. 8'30 - 12 h.

C. corone. 1 y //

Pica. Se ven pocas. 4 junto a 2 Coloeus en el prado. Examino 2 - nidos y veo 4, de ellos 3 en Roca, (en uno al lado de Cretzegus y almendro) que es sin duda el mato preferido. Uno vacío. Otro, en -- almendro, 5 ms. 2 h. Pica cerca. Estos capota sobre ramas, no unida al nido.

Aún no ha empezado puesta masiva. Informes que, si ya hubieran o estuvieran poniendo, habría criados.

Coloeus. // en eleprado.

Serinus.

Emb. calandra. X M. localizada en el prado.

Paradillo. //

M. flava, en el prado, algunos X.

Anthus campestris. En 2 pt. cerca del prado.

Calandria. 6 persiguiéndose, pero emparejados. Localización clásica Croquis al vuelo.

Calandrella. Dispersion por doquier, no como Calandria. X B, pero la más común después. Doquier. Ver croquis vuelo.

Galerida. más escasa.

Sylv. communis. // almendro de la finca.

Phy. bonelli. 1 cantando en los almendros.

Cernícalo. Un ♂ en el prado, cazando un grillo, (que abunda en exceso)

Uochuelo. (Ver egagropiles).

En el camino verderon "chirrri" Ruisenor etc, orilla canal.

Coelopeltis nonspesuleanus. Una sin manchas, blanca o gris, débil -- rayado transversal. (Descripción), pequeño montón de calizas, lindero distante 200 ms. en el prado.

Apodemus. Nido 2 pedos x 4 de profundidad, yerbas, entre piedras. En otros bastantes almendras roídas.