

16-Agos. L. excubitor meridionalis. ♂ ad.
 Long. 269. A. 106. C. . T. 31. P. 20.

Cont. est. 1 muscipido.

- 1 muscipido.
- 11 ortopteros (mandibulas). Mudando alas y cola, y cuerpo (algo).

Gallinula chloropus. ♀ muy juv. aún, pero con ovarios bien señalados.

- Semillas.... unos 5 pequeños más 6 cabeza alfiler negro.
- Coleopt 2 de 5 mm.
- Hormigas.... 2.

16-17-Agos. Cabildo. En Piragüa.
 Carlos.

Ruiseñor. Una cria en ceba.

Jynx torquilla. 1,

Verdecillo. Familia en ceba.

Verderon. " " "

Acrocephalus. Muy común, por doquier.

Capicós. 2.

Hirundo. Muchos reuniéndose.

Apus. Algunos aún.

Upupa. Muchos.

Merops. Unos 60 y 3 de unos 20.

Azulones. 14, sobre Valladolid, a las 20 h., rio arriba.

Actinioides. 4, sueltos.

Tortolas. Sueltas, algun bánditon de 4 - 5.

Clamator. Traen 2 juvs. (Nota).

Yxobrychus. ♂ ad. cobrado, Lenciscus (dibujo) entre espadañas y mim-
 bres, a las 12 - 13 h. Pareja, en espadañas, 1 (espadañas) 1 juv.
 ♂ ad. Isla de los Frailes, vuela a las 14'15 h.

Gallinula. ♀ juv. (ver cont. est.)

Fulica. 1 frente a finca de Negueruela, una cruza nadando, se vaela
 al Cabildo.


Somormujos. 1 ♂ ad. cobrado en plena muda de alas de alas (Sotillo)

Alcedo. 2 - 1 - 1 - 1, plumaje bueno.

- v = Gobio
- o = Barbus
- + = Carassius
- Δ = Rutilus

- (Salix)
- (Potamogeton etc)
- = plantas acuáticas
- = Najas y Algaes

- = Leuciscus (bando)
- ▨ = Chondrostoma (bando)
- w = Tropidonotus viperinus
- ▲ = Quisquillas




- 1 = tocoá emergido
- 2 = ribera cortada con vaies, limosa, y prof. media
- 3 = aguas semi tranquilas, entre troncos de Salix
- 4 = Poco fondo, limoso-pedregoso, y algo de corriente

Esquema de nichos en el Puente - Duero. (Tipo A).

JAV

12-VIII-55

Diagrama ecologico del nicho de peces en tipo A. y B.
(En verano y pue tamaño medio y grande).



- o = Barbus
- + = Carassius
- v = Gobius
- = Leuciscus
- Δ = Rutilus
- ▨ = Chondrostoma
- w = T. Viperinus
- ▲ = Quisquillas

JAV

12-VIII-55

16-17-Agos. Cabildo.

- Caprimulgus europaeus. 0. álamo orilla del río, rama a unos 4 ms.
Paloma casera. Una con h. para poner.
Chlidonias nigra. 1 juv.
Alcotán. 1.
Milano negro. 2.

17-Agos. Limicolas. Paso de noche, hoy, ayer y hace tres días, parecen actilis.

- F. subbuteo. ♂ ad. plumaje bueno.
B. buteo. ♀ ad. plumaje bueno. A. 392. C. 222. { Conejo más 1 insecto.
 - Conejo más 1 insecto. } Torozos. 19-VIII-53.
Chelidon. el 21 en los nidos de Valladolid.

Fuensaldaña.

19-Agos. Alauda. Cobrados 2 en muda incipiente, pradillos.Calandrella. Cobrados 3 juvs. creciendo cola y muda de alas.Galerida. En plena muda.Locustella naevia. 5 en alfalfas.Desde el 15 se ven todos los días buen número en las alfalfas por doquier. !Es de paso común! pero con S. rubetra, con un habitat -- muy definido.Pt. alchata. Probable todas. (7322).