


Valv. 1953.

15-17-Sep. Valladolid.

Se cobran.

Phy. trochilus. 4. Cede el paso ya.M. hypoleuca. Unos 15, Están en pleno paso.M. striata. 1Sylvia borin. Unos 20. Es el pájaro más común ahora, abundantísimo.Sylv. atricopilla. ♂ y ♀Sylv. communis. ♀.Acrocephalus scirpaceus. 1. Común, en pasoMotacilla flava. Del 11 al 14, reunidos en gran número en los cañaverales del arroyo de la finca de Pili y Veterinaria.Falco tinnunculus. ♀. Burgas. Cont. est. 12 acrididos más 1 tetti-gomido más 1 soricidaé? 11-IX-53.Hieraeetus pennatus. 10-IX-53. ♀ con el plumaje bastante gastado y a medio mudar (poco marcado y no ~~apenas~~ plumas en crecimiento). Villajimeno. Burgas. Sin Cont. est. Cobrada cogiendo una Codorniz.Ardea cinerea. Juy. Palencia 12-IX. Cont. est. bastante paja de avena. Da impresión de ser estiercol.Ardea cinerea. o Quintanilla de Abajo. 2º año. Cont. est. Barbo 21'2 cms. que asoma cola, cuello 1 cm. y oruga.

corte del cuerpo indicando tamaño relativo y posición del pez.