

## 22-Jul. Pollos. (informes)

A. cinerea. 10-12 nidos ocupados por jóvenes que vuelan mal. Traídos 3 juvs, con plumón en la cabeza y remiges primeros aún en crecimiento, la cria ya había terminado su promedio. Según unos era tan o más abundante que Nycticorax, y numerosos jóvenes revoloteaban sobre el bosquecillo.

Egretta. 3-4 nidos con crias en pluma y cañones, dispuestos en dos -- núcleos. Cogidas dos crias, en pluma cañón. Parece que eran los más retrasados.

Nycticorax. Un poco más tardío que las otras crias. Son los más abundantes. Cogidas dos crias y 1 ad.

Milanos reales. Un nido con dos crias (traen una): 1 culebra. 2-3 ranas-sapos. 2-3 pieles de conejo. 2-3 ratones medio comidos.

Milanos negros. 1 nidos con 1 pull. casi volandero; otro con 2 pull; otro con 1 h. huero.

Torcaz. 1 nido con huevos frescos.

Tórtola. 3 nidos, 2 con pollos pequeños y 1 con h. feto grande.

La colonia se ha desplazado unos 150 m. con respecto al año anterior, en el mismo bosque. Hay muchos menos garzas que el año anterior, pero han matado más ¿lo? garzas los obferos.

Genetta. En el bosque de la colonia, y a unos 250 m. de ellos, en un tronco de Salix, de unos 2 ms. agujereado por arriba y hasta la mitad. En el fondo una cria con los ojos cerrados, reposando directamente entre el poco aserrin del fondo.

La cria mide unos 25 cm. de long. (fui a verla), y es muy oscura, con numerosas rayas. La daban biberon. Una gineta ad. estaba con ella. El tronco, bajo un árbol con nido de garzas.

Coluber scalaris. Una de unos 75 cm. de color gris neutro pizarra, con la escalera perfectamente dibujada y manchas laterales pequeñas. Muy gorda, con grasa abdominal abundante y sin cont. est.

Nycticorax nycticorax. Cont. est. - ♂ ad.

- Una cabeza de larva disticidae o Hidropolidae. Tiene parásitos en el estómago.

Juv. casi volandero.

- 1 semilla, más restos de insectos.

Juv. id. nid.

- Restos de insectos.

Ardea cinerea. Cont. Est. juvs. con mucha grasa abdominal. Restos de escamas de peces.

Mil

Milvus milvus. En el nido con 2 juvs. colicortos había.

1 culebra.

2-3 Ranas

2-3 Pitymis

2-3 Pieles de conejo.

Cont. est. Juv. colicorto. 1 gazapo.

M. migrans. ♂ ad. - 3 tenebrionidos, medianos y grandes.  
1 Conejo. (restos)

Juv. en ceba - 3 grandes telligonides.

Juv. en ceba - Pitymis enteros 3.

Passer ..... 1.