

- ↪ = *Haematopus ostralegus*
- ↪ = *calidris*
- = *Larus ridibundus*
- T = *Tringa Totanus*
- A = *Arenaria*
- c = *ch. hiaticula.*
- + = *Phalacrocorax*
- = *Larus argentatus.*



27-28-Agos. Suances (Santander)

Recorridos en faro, la playa y las marismas de la boca de la ria. El 27 con buen día. El 28 con lluvia intensa.

Larus argentatus - En las marismas reunidos en grupos, marea baja, pasaban de la marisma al mar al subir la marea, a mediodía. Se localizaban en los terrenos fangosos dejados al descubierto, cerca del límite marea alta. En todo el pantano se veían huellas.

Habría unas 20.

En la Isla de los Conejos se veían bastantes pisadas en las rocas. Por la mañana pronto, vi tres juv. en la playa desierta.

Me dijo Tonono que estos días empezaban a verse jóvenes emancipados. Sólo unos 5 días antes vieron el primer joven del año independiente.

En total vi una media docena de jóvenes y más de 30 adultas.

Un joven conseguido en piel.

Es de suponer que todas estas gaviotas fueran indígenas. Hasta 10 días más tarde no comenzó el paso, muy intenso a lo largo de la costa, de L. fuscus. Duró dos días al menos.

Larus ridibundus - Un grupo de unos 25 en la ria. Se posaban en piedras que sobresalían del agua, cosa que no vi en argentatus. Algunas todavía ostentaban el cuello manchado de la primera edad, pero no pude precisar detalles.

Tringa totanus - En las marismas una preja. Cobrado uno en pluma de transición. No reclamaban. Se unió a ellos un Arenaria y otro Tringa totanus.

Arenaria interpres - Uno con T. totanus en la marisma. Se distinguen bien por el contraste de colores y menor tamaño.

Actynioides hypoleucos - A lo largo de la costa les oí chillar a menudo. Vi algunos solitarios y un grupo de unos 12 a 20. Se establecen en las rocas muy batidos, en concavidades y puntos resguardados. Me ha extrañado que fuese el limicolae menos querencioso de las playas y fangales.

Calidris sp - Un bando de unos 20 en la ria. Todavía no han llegado los grandes bandos que son tan comunes a primeros de Septiembre.

Charadrius hiaticula - Un grupo sobre unas rocas, en la ria. No vi en los fangales. Vi bien una pareja con collarín muy manifiesto.

En conjunto encontré T. totanus y arenaria en fondos herbosos inundados periódicamente por la marea, no lejos de L. argentatus. Con más tendencia a playa y pedregal, Calidris y Charadrius (donde L. ridibundus) y querencia a costa batida en Actynioides.

Haemantopus ostralegus - Un bando de 17 se levantó de la playa o ria y rodeó el cabo a ras de agua. Vi un par de solitarios. Parece que ya hace tiempo que se ven aquí.



Valv. 1950

27-28-Agos. Suances (Santander)

Phalacrocorax aristotelis - Vi un par de ellos en la bahía junto al cabo del foso. Uno nadando tenía parecido con Colymbus, es cabeza gruesa y alargada, cuello muy fino y cuerpo aplastado y muy poco saliente.

Les vi volar a ras de agua, como en el dibujo de "Aves groenlandesas". Parece que en una roca poco saliente y de fácil acceso, junto a la costa y en un rincón de esta, suele subirse a descansar un cuervo marino, llegan volando desde la Isla de los Conejos, (3-5 Kms.) de un solo vuelo y se acercan a la costa al subir la marea.



Se cobró posteriormente ese cormorán resultando ser un joven de esta especie. Se había acostumbrado de tal modo a los pescadores que cogía las sardinas que le arrojaban acercándose a unos 3 ms.

Lanius collurio - En unos vallecitos muy verdes, con algún matorral han anidado algunas parejas este verano. Todavía puede que hubiera algún joven en ceba por estas fechas.

Acanthis cannabina - Vi algunos emparejados cerca del faro.

C. carduelis sbs. - Un grupo de unos 20 en los brezos del cabo, la mayor parte eran jóvenes de un colorido más gris que los de la meseta.

C. corax - Vi tres entre los acantilados del faro, cerca de la playa de los locos. Al anoecer se reunían en un jardín próximo a la playa. Vi entrar una pareja al dormitorio, árboles frondosos no muy altos y en sitio muy frecuentado.

Saxicola torquata - Era el pájaro más abundante, disperso por los bezales del cabo. Vi hembras y jóvenes en abundancia y algún macho. Probablemente habría también alguna rubetra, ya que cobré una en Alceda 4 días más tarde.

Anthus campestris? - En los prados y huertos del cabo vi algunos individuos solitarios, cantaban o reclamaban muy sonoramente.


M. alba - Un ♂, medio mudado y muy feo, en un regato cerca de la playa.

Falco tinnunculus - Vi uno sobre la ría por la mañana.




Suances 27-28- Agosto 50.

Phalacrocorax aristotelis. Vi un par de ellos en la bahía, junto al cabo del foro. Uno nodando tenía parecido con Colymbus, talera gruesa y alargada, cuello muy fino y cuerpo aplastado y muy pro saliente.

Los vi volar a ros de agua, como en el dibujo  de aves grecolanderas.

Parece que en una roca pro saliente y de facil acceso, junto a la costa y en un rincón de esta, suele subirse a descansar en cuerno marino. Llegan volando desde la isla de los conejos, (3-5 km) de un solo vuelo y se acercan a la costa al subir la marea.

De colro posteriormente se comoran resultando en un fomen de esta especie. Se habia acostumbrado de tal modo a los pescadores que cogían los sardinos que le arrojaban ocasionándose a unos 3 cm.



JAV