

Valv. 1950.

18-Agosto. Santander.

Mañana, con un par de chubascos y sol. Algo fría pronto.

Larus argentatus - Unas 12 en el puerto, solo un joven pardo. Abundan errantes en el fondo de la ria, llegan a Obregón y pasan, probablemente al Sanguar en días muy crudos de invierno.

Phalacrocorax - Hacia las 18'30 h., gira un par de veces junto a los rompientes de la playa y acaba lanzándose al mar. Vientre - blanquecino y color muy oscuro.

L. ridibundus - No hay.

---

Astillero, arenales y charcos salobres, tierras bajas con caños. En el fondo de la ria algún Larus argentatus.

---

Obregón.

Desde las 4 a las 7'30 h. de la tarde oficiales. Tarde sin sol, agradable, ligero vientecillo del mar.

Un valle, un par de regatos, avellanos en manchas y lindes, bosquecillos de eucaliptus, robles y encinas. Maizales y huertas. Poco arbolado y prados inclinados.

Lista de especies.

Corvus corax -- Tres en un campo, se reúnen con ellos 5 maricas, después quedan 3 que se emparejan con ellos dos a dos, aprovechando la menor ocasión para acercarse rápidamente a ellos y tirarles del extremo de la cola. El cuervo se volvía y la intentaba picar pero la urraca se separaba de un salto con vuelo. A veces los cuervos les daban una carrera.

Al atardecer 12 cuervos volando desde la mina a los bosques altos de la otra ladera. Pareja separada. Graznaron todo el tiempo.

Maricas - 5 por el centro, más llano del valle, entre el maíz y huertas.

Garrulus glandarius - Veo un ala de uno. Parece que se ven unos pocos en los manchones de encina.

Fringilla coelebs - Tres reclaman algo. Parecen abundan.

C. carduelis - Grupitos en las huertas.

P. domesticus - Dispersos en los maizales. No están junto a las casas.

Saxicola torquata - Un ♂ dif. colorido menos acusado.

Chelidon urbica - Algunos en el valle.

Hirundo rustica - Bastantes. En un nido pian crías y llevan cebo.

Valv. 1950.

18-Agosto. Obregón.

Turdus merula - Muchos en los maizales.

Lanius collurio - Fam. en ceba, tres jóvenes al menos, que se dispersan. Un padre coge un acridido de gran tamaño, verde alado. Veo joven al lado, son mas claros que senatus. Reclaman mucho por toda la parte baja del mato, entre breñas y maizales.

No veo ni un Muscicapido, excepto el Saxicola.

Turdus merula - Muy común.

Caprimulgus sp. - Uno revolotea anocheciendo junto a la estación. Se posa.

Me dice Cuesta.

Cernícalos - Anidan en la mina.

Buteo - En el monte Oeste.

Patos - Pasan en invierno a los Janguales en formación, altos.

Sturnus vulgaris - Igual que el anterior, pero en vuelo bajo. Algunos se quedan en el valle durante el día, pero duermen en el Astillero, y cañaverales. Abundantísimos.

Vanellus - Acuden en días fríos y nieve a una alta llanurita húmeda. Con ellos hasta 30 Numenius (volancicos), menos estables.

Agachadizas (lagunejas) en algunos regatos en invierno.

Scolopax - pocas entre los avellanos deshojados en invierno, en manchas.

Athene y Tyto - Abundan. El 15, muerta lechuza juv. grande.

Vencejos - Anidan.

Tórtolas - Un par en paso. Hace años se mató una Gallinula ¿Fulica?