

Valv. 1953.

25-Nov. Sto. Domingo de Silos.

Valle. Tierras de labor (cereales secano) vistas.

Pica (F)

Coloeus (F) en grandes bandos, 1 cont. est.-

- 99% trigo
- 1% Hormigas?

Phyrrocorax - (F en Peñacoba)

Pinzón.

Emb. cia

Emb. cirulus

} Estos y Corone, F. en herboso sobre todo.

No vi Alaudidos, pero oí Galerida.

Pinetum laricionis -

- Una pequeña mancha junto a la Yecla. As. con Q. lusitanica, enebro y sabina. Inf. jara y aliagas. Montículos, árboles no muy viejos. Al parecer replantado. Esta muestra da idea de los pinaves. (Con sylvestris? y pinaster? de Huerta, etc.).

T. philomachus - (~10)

T. viscivorus - 1

Garrulus - 1

P. ater - }

Certhia }

> 10

Soto. -

- Matorral orillas río. Zarzas que cuelgan sobre él y junto a nogales y patias de huerta. Matos varios, espesos, terreno húmedo y muros de piedra.

Arroyo -

Troglodytes - Algo común.

Cettia cetti - Común o muy común. Canta bastante.

Cirulus - Había 1 par al menos en ~ 1 Km. El sitio habitual no ocupa unos 500 ms. y en él había tramos preferidos. Se posan en las pocas piedras del ribazo, cubiertas de excrementos y hay un reposadero en cada 10 - 15 ms. Nadan perfectamente en la rápida corriente. No los vi en los brazos de curso lento, (densas berreras a tramos) pero gusta de la vegetación poco aflorante (muy variada) de los regatos rápidos.

Distancia crítica unos 15 ms.

M. cinerea - Algo común, por piedras.

M. alba - Más que la anterior.

Alcedo athis - Vi 2 - 3 veces, en aguas tranquilas, posado en ramas.

Rallus - Entre los berreros levanté 2 veces. Parece abundar mucho;

Valv. 1953.

25-Nov. Sto. Domingo de Silos.

Gallinulâ - Común en embalses y huellas por doquier. Cacé una con cepo, al queso, en una salida. Refugiados en Salix, sitios anchos y Rubus (sitios estrechos).

Juniperetum thuriferae - Laderas calizas con débil capa de arcilla de descalcificación y frecuentes afloramientos. Predomina el enebro con pies de 6-8 ms. ralo. Corros de encina, algunas arbóreas en los vallecitos secundarios. Fruticetum de Sabina turiferae Sufruticetum rico en espliego (Lavandula) a ratos varios Cistus - aliaga (Genista) y con bastante graminetum a corros. En humbrías altas denso tapiz de O. uvae-ursii. en solanas cerca de -- Peñacoba, asocias de de Q. lusitánica.

La formación es pués muy heterogénea. Dentro de ella hay 3 biotópos importantes.

1º - Calveros, con Lavándula y Genista. Esta en formas achaparradas, en los calveros de la cumbre. (A) en que abunda la yerba. Es pastizal de ovejas y ocupa grandes extensiones en las laderas, al sur de Silos, aquí como etapa subserial de probables Juniperetum, o. montanos.

Observé.

Pytimis pelandonius - Común a corros F. sin duda en raíces de Lavándula o Genista.

Conejo - Algó común. F. en yerba o Lavándula. Examiné ~ 30 excrementos, sin huella de juniperus, las cuevas en roca (no hay apenas tierras). Escasez debida. a/. a falta de cobertura. b/. a falta de huras.

Feeding; algún T. viscivorus - pero nada de particular.

2º - Límite de cultivos.

En la ladera baja, la transición de caracteriza.

- a/. grandes claros de cereales.
- b/. montones y tapias de piedra sacados de esos campos.
- c/. algún calvero
- d/. testigos de enebro.
- e/. matorral disperso de Rosa canina.

Observé (taxiado ~ 1'5 Kms.)

Pica - (3) F. en cereales.

F. coelebs - en 3 pt.

Acanthis - Unos (20) (4) } F. en cabezo, y asentados en enebro y oxycantha.

T. viscivorus - // - //

En paseos.

F. coelebs -

Emb. cirrus

Emb. cia

As (± 30) en Rosa.F. calveros

Valv. 1953.

Nov. Sto. Domingo de Silos.

Chloris - ↑

Carduelis - F. en Cardo borriquero.

A. cannabina

Gavilán - En caza. 1 vez.

El hecho más importante es la presencia de Emberiza cirrus y cia (quizá la última más aficionada al junip+roca), que alcanzan máxima densidad en el matorral espinoso del soto-valle.

3º - Bosque más o menos denso. Con facies 2= bosque denso y puro; Y= puro y ralo. x= con encinar en mato o arbóreo mezclado, a - ratos casi puro.

Taxiado unos 2 kms. facies Y. 25-X-53. Ladera al S. de Silos. 12-13 h.

Pinzón - 1-1-1-1 (As) - x-1-1 x - x

P. cristatus - >2 ... feeding suelo.

T. viscivorus - // - 1 - (3) x - x

Emberiza cirrus } x - x - x
Emberiza cia }

Gavilan - 1

27-Nov. Taxiado, facies X, 2, Y, ladera N. de Silos. Sol. 9'30 11 h.
3 - 4 Kms.

Pinzón - 1 - x - x 255
Emb. citrinella? + Creo vi bien una ♀

A. cannabina - 1 - x - 40

Carduelis - (3) - x

T. viscivorus - 1-1-1-1-1-4-// - 1-3-// - 1-1 = 23

T. ericetorum - 1-1-1-1-1 (F. en Artrolagus urvae - ursi)

Corone - 1 - // (volando en la cumbre)

Arvendajo - 1 - 1 (facies x)

T. merulae - // (F. en A. urvae - ursi y encinar)

Parus ater - } (< 10) en As. encinar (otro bando mas?)
Parus cristatus - }

Alectrix - (3); otro bando ± 15

Picus - X

muscipidos - 1-1-1 Prob. Phy. collibita, o Sylv. undata. no vi nada bien