

Valv. 1954.

10-11-Abril. Pancorbo Tarde del 10, y 11 hasta 16 h.

Correo de Irun, llega y sale a las 16 h.

Lista de sps.

C. corax - Vistos 3, y oído alguno más.

Coloeus - Bandos de (30) (35) (40) y otros 2 encima del pueblo. No hay señal de empezar nido. En los roquedos más grandes. Otro bando, desde el tren, salida desfiladeros hacia Miranda.

P. phyrrocorax - Muy común en pares, en todas los roquedos. Parte de ellos venían de comer del raso bajo. Vuelos nupciales? Entran por pares en agujeros.

Pica - 4 pt. en el valle, casi sin soto.

Petronia - Común en el pueblo, colonias en roquedos del Castillo, Canteras y Peña Horadada. Van en bandos. Fam. entre hierba y no hay señales de cría.

P. domesticus - Pueblo.

Carduelis - Grupito, en prado de la vega.

Pinzón - Bandito y dispersos en el valle.

E. cirrus - Soto X b. un ♂

E. cia - Muy común en el matorral (lavandula, Thymus, Genista, Buxus, Helleborus) con roca suelta. Grupitos y alguna pareja - localizada.

Ph. ochrurus - En roquedos, zona baja, en 5 pt. al menos, territorio de 1 ♂, 15 ms. de alto x 50 de largo al menos, con Rocas casa y árbol. X m.

Phy. trochilus - Común en Salix del río, "pescando"

Cettia - X en 5 pt. río.

T. merulae - Disperso en el valle, común.

T. ericetorum - 2 en las huertas.

Oenanthe sp. - ♀, en valle. (Muy común en el camino del tren, meseta)

Sylvia atricapilla - 2 en las huertas.

Ruiseñor - X río.

Parus major - en el soto 1 pt.

Jynx torquilla - Uno en Rubus huerta mas frutales.

F. tinnunculus - Al menos en 5 pt. en pares y establecido. Cazando uno sobre el matorral.

Biblis - Unos 4 ó 5 en la Peña Horadada. Dicen anida bajo el puente

A. melba - Inf. una colonia en el desfiladero.

Hirundo - Común en el pueblo.

JAV

111

10-11-Abril. Pancorbo.

Gyps - Vería hasta 50 en los dos días. (14) al máximo. Posadas en roquedo C. Molinos a las 8 h., un grupo, en la punta (croquis). 2, en un caballo muerto de hace 8 días, distancia crítica  $\pm$  150 ms.

No hay colonia fuerte. Me dicen anidan muchos en las Basasta (desfiladero adelante) y sobre todo en Villanueva Soportilla, (la misma colonia que Sobrón, (ver) o al lado).

Creo localizar. (ver plano)

- 1º - Colonia de la Cuesta de los Molinos. Unos 3-6 pares.
- 2º - Peña Horadada - 1 nido
- 3º - Peña del Puente de ..... 1 nicho, (accesible según infs.). Hay más nidos.
- 4º - Sobre el pueblo. Uno lleva maechón de hierba a un hueco.

En total una docena de nidos enviaron.

El veterinario estima el ganado caballar en 300 cabezas, con promedio de vida de 15 años (12-15). Según calculo, de 15 a 20 muertes por año, que el cree algo exagerado. (piensa que 12-15) es -- decir, una res por mes. Ovejas hay muchas, Pueblo muy ganadero.

En la huesera había una vaca y 5 caballos o mulas, sólo 2 relativamente recientes. Huesera dispersa en 200 ms.

Alimoche - // en mula muerta y diversos pares, (ver croquis). la llaman Sansaleja, y es "el 1º que llega, a sacarles los ojos, y el último que se va". Todos los bien vistos (unos 5) adultos.

Gypaetus barbatus - Veo 2, Inutil espera en La Huesera, donde se les ve todas las mañanas, de 8 a 10'30 h. A las 12'30 h. me pasan 2 seguidos, atravesando el valle y pbr encima del pueblo casi.

Silueta más esbelta que Nebphron (vistos juntos), cola larguísima y bien escalonada, recuerda a la de cuco. Color muy oscuro inf. cabeza saliente que hace pequeña. Ala estrecha, sin ensanchamiento junto al cuerpo tan neto como alimoche. Iban uno tras otro, e - unos 150 ms. altura. No hacen tan grandes como es de esperar, por lo proporcionado de la silueta.

"Casca huesos." Comocen bien costumbre de tirar patas contra piedras "para comer medula", les tiran a unos 100 ms. huesera, en las tras inclinadas. Nido (ver croquis, peña bastante accesible, solo se ha matado uno hace ya muchos año (unos 30 ó 40).

Infs.

Aguilas blancas - anidan varios pares. H. fasciatus?

Aguila real - Nido en la Hoz entre Enciso y Obarenes, la misma pareja debe tener 2 ó 3 más. Quitan crias todos los años, y les echan "el frenillo". (Creen prohibido, por matar hasta niños - perdices, conejos y liebres).

Buho. - Muy común.

Perdix - Se mataron 2 de un bando hace más o menos 30 años. Han desaparecido.

Jabalies - Desaparecieron hacía 1940. (Se les "llevaron" con perros a otro pueblo). En Oña aún quedan.


Lobos - Nunca. Garduñas - Vienen garduñeros.

Avutardas - Se han cobrado 2 sólo. Rarisimas.

Sisón - Algo común. Alcaraván - Muy raro. Chorlas - alguna.

Larus grandes - Vinieron 4 ó 5 con las grandes nevadas de este 1/2

Pancorbo - 10 y 11-IV-54.



↗ = Neophron

✕ = C. COVAX.

⊙ = Gyps

↪ = Falco tinnunculus

⊙ = Columba

☁ = Petronia


++ = Biblis

+++


• = Pyrrhocorax

xx = Coloeus

x xx



Gyapetus barbatus  
( el 1º que veo )



C. corax.




P. pyrrhocorax




Gyps en la cima de una roca

Neophron // P. gyp. - //  
 F. tinnunculus //  
 gyp. 3-6 mes. ?



Genista }  
 Lavandula } E. cia. horatut.  
 thymus }  
 Helleborus. }

Croquis (sur croquis) de l'emplacement  
 de nid de Gypaetus.




Gypaetus - Nido de Pancorbo



JAV

19-VI-54.

S. Sebastian - Vall.

El paisaje comienza desde Horruñada.  
Hasta allí hay una zona de transición  
que  a Donibaitz, prob. precedida en  
años.

Pascual Alnus comu. Grupo 2  
ca. melina P. pyracorax 4.

la meseta alta, aquí se ve  
algo de Burguillo.

~~Burguillo~~  
Burguillo, desde por el valle todo  
centro valle. El río cubierto de  
Bermuculus, corriente rápida.  
Arbolado esparcido en todo el  
valle, de carácter absolutamente  
típico. En los cerros, mayoría  
desnudos, y un par de árboles  
o vari al centro del valle.  
no. Pica-cerros.

