

Sept. 54 - Informes

EL ANGEL. - Cortado de el Morón.

Aquila chrisaetus - Hace 3 años se mató la cria. A la derecha de las coberteras y cuenca de la Ermita.

El Mulatom de la cigüeña. A 1 h. próxima de Valencia.

Otis tarda - Muy comunes, en toda época.

Barcas - Balazote - Chinchilla - Albacete.

Informes de un guarda de campo.

Rapaces. - Zona de Peña de S. Pedro (Alicante).

Cyanopina - En Sugel, con viñas y sotos.

Coloeus - Desde hace unos 3 años es plaga, pero ha existido siempre.

Buitres - Cobrado en Baños de Fortuna, donde se vieron muchos. Provincia de Murcia, hacia 1950.

En toda esta zona de Alicante, a pesar de la multitud de roquedos calizos, se ven pocos y solitarios. Parece ser escasa.

Palomas - Se crían muchas. Se suelta ♀, pluma blanca de la cola. Cada propietario anilla pollós y guarda contraseña de la Federación Colombófila, anilla inquitante, de una pieza.

Se sueltan muchas, cada propietario con su color (un ala verde, otra roja, etc.). Persecución ♀, haciendo "la piña" en vuelo. Peleas con rivales, intento traer ♀. La siguen hasta 10 km. (al menos 5) y vuelven a por ella si regresan a la ciudad engañados por un ♂ parecido a la ♀.

Se pagan 1.000 pts. por un buen macho, saben Pedigree de memoria y reconocen la ascendencia de cada pájaro. Incluso les distinguen al vuelo.

El halcón roba muchas. Se pagan a gente (halconeros de Alcoy) 20 a 200 duros por halcón, si es muy peligroso.

CA. melba - Cañada de las Monjas - Crevillente - Alicante - Colonia El murón, en Aspe, prob.

Hieraetus fasciatus - La Cañada de las Monjas (Crevillente). Una pareja.

Sept. 54 - Sociedad de Cazadores.

Aquila chrysaetus - ♂ ? juv. de amplias manchas subalares y cola, absolutamente típica. Cobrada en Aspe, 1945.

Bubo - 2, cobrados alrededores.


A. purpurea - Un ad. Quincoces - Aspe.

Genetta - Un juv. 10 bandas negras cola, manchas en las manos. Sin rayas negras dorsales definidas desde medio dorso en adelante.

A. chrysaetus - Una pareja en la Sierra de Salinas (Alicante), este año, criando. (ver mapa)

Informes de taxidermista.

H. fasciatus - ♂ de la cantera roja, a 3 km. de La Romana, ad.



Se han traído 3 ad. de esta zona. Hay otro en pueblo próximo.

Athene - Común en cria, uno disecado.

Otus scops - Un ♂ prob. Debe criar.


Cernícalo - ♂ y ♀.

Upupa - 1.

Genetta genetta - Se han traído unos 14 y solo unos 4 turones en cambio. Estos olivares y viñedos deben ser su habitat predilecto.

Valv. 1954.

Sept. 54 - Aquila Chrysaetus - Informes.



- Aguila real.

- ① nido de El Murón. El Mugrou. 1209 m.
- ② " " El Mulaton de la cigüeña. Ayora (Valencia).
- ③ " " S. de Salinas.
- ④ " " S. de Crevillente.
- ⑤ ? " " S. de Crevillente. Hay otros 2 nidos más, según dicen.
- 6 ~~Mauro~~ Sierra de Tibi (Peña Roja = Peña de Michorn - Mediodía)
- 7 El Empuñador, el Mauro

Hieraetus fasciatus.

- ① Sierra de Crevillente. En la Cañada de las Monjas.
- ② " " "
- ③ La Romana.
- ④ Sierra del Cid. Hay alrededor de 6 pares, en esta sierra, creen que más.

(1). Informes de C. Lopez de Atolupe y Rico, X-68.