


Mido de Neophen.
2 ad + 1 juv.
Montepi. 12-IX-53.

eucaeris *aus.*

JAV

Nidos y vuelos. Huixtla -IX-53.

- - - - - = área normal de Gyps.
- . - . - = " " " " Neophus, (generalmente más alta)
- (with diagonal lines) = tránsito normal de Colobus, Pyrrhocorax y palomas.
- ▨ (with diagonal lines) = área normal de feeding de Coli " y "
- ~ (wavy line) = " " " " " " Buho.
- (with dots) = reproducción parvito de Colobus. (sucroau fresco y presencia a adulto, a menos altura que Pyrrhocorax.)




JAV




Resatidus

JAV


11





descemus.

JAV



- a/ grandes cuevas — domicilio de *Phyrocorax*.
- b/ cornisas con cuevas. — Nidos *Gyps*. y resguardos sol y lluvia. — *Neophron*.
- e/ Salientes. — Solarium de *Gyps*.
- d/ pequeño socavón — emplazamiento colonias *Chelidon*.
- e/ Gran socavón — Refradero *Oloeus* (en partes sombrías) y colonias α melba en grietas techo.
- f/ pequeñas cuevas. 1. con cornisa — Nido *F. peregrinus* y *F. tinnunculus* y quize *E. domestica*.
- g/ amuchadero de gueras rocas. con muela escasiua. — *Monticola solitarius*.
- Por doquier *Petronia* y *Ph. oehrurus*. No conocido *Biblis*. (proximidad cuevas altura mínima)?

c cuevas. — Pueblo



Reposadero (medio día
y tarde?) de invierno
y estivo. - Viejos nidos.

(1)

Solarium.
(matinal?).

Vuelo pre-ponarse

Zumbido sonoro

aleteo.

Partida asustado (muy disminuida)

Vuelo pre-ponarse. (A veces mucho más alto,

circulos en bandos o pares a gran altura.
(institucion y desplazamiento lateral sobre campos
desnudos, en qual).



Ecología Gyps. de Montepi.

Depos. — Nidif. En Febrero y en 1953. con fuertes vientos. El microclima variable. 1^o
Exposición soleada. 2^o depos. de viento ascendente por arriba y del lateral por
arriba más en los vientos menores, con vientos en los días desfavorables. 3^o Bos de
palmos.

Adulto. Vuelo a grandes alturas, entre frío máximo del tiempo (clima continental
de meseta). Plumaje gruño ^{como Neophron}, no aberturas viento, capa plumosa gruesísima, gran
cantidad de grasa subcutánea (reserva). Probable falta de irrigación en cuello desnudo,
con temperatura externa mínima y oclusión entre plumas del cuello. Recubrimiento
plumoso parte inf. buche (donde frecuentemente ~~inflama~~ hidratosa deja de desplumado piel) no en
Neophron. (a cualquier temp. cuello). Es casi un ejemplo de adaptación al frío con
aumento tamaño corporal.


Alimentación. Muy discontinua en tiempo y distancia. Adepto en tiempo por. Reservas
de grasa (prob. acumuladas en mínimos tiempo en el estivo metabolismo de la digestión)
y ahorro de nutrientes, con mínimo aprovechamiento del plano, y gran inutilidad en
los períodos (calcular esfuerzos musculares diarios por observación y comparar); sistema
detectar de piezas (red de observadores aéreos, vista agudísima) muy perfeccionada. (?)
adaptado a cubrir distancias enormes y con gran rapidez en planes.


(1). aprovechamiento de la presa por capacidad de desmenu (pico y cuello fortísimos, no en
Neophron) y digestión rápida huesos y carne de la carne (?)

Vida y habitat. aqui. Pasa repiro y carne. Peñas soladas, solitarias donde vivir y repurar
y me extreme region gaudere. ~~caño~~. lo 1^o cañones de rios; ; lo 2^o estiraciones montaño-
sas donde vivere la oveja-cabra.



Viento en transversal



Pycnonotus y Colaptes vuelan en la línea de fricción.
 A. melba vuela y cara aquí. ¿Caran vidus más quietos, anastudis de la llanura?
 ehelidon en la corriente ascendente, (solo caran buenos voladores pequeños anastudis por el viento).
 Biblis también en corriente ascendente.
 Gyp y Neophon vuelan sobre el valle, fuera de las corrientes, los observatorios expuestos a vientos ascen-
 dentes, (de los que la corriente es resguardado.) En los vientos longitudinales valle suenas o augulos
 Augulo  de vidus Gyp donde está pullos.

JAV

Deposits lin.



Phalacrocorax carolinensis




← *Vireo*

Día 5 (Montelo)

- *Sipos fulvus* 36 cantados, pero gran cantidad de individuos con ruidos.
- *Neophon* pernoctes en ruido en el primer cantado y otro en el de los *sipos*. En este tres volando juntos
- *Coracia* pinto como varios
- *Coracias* guaculo. Que se 5 metros, posible (3). Veo una pareja.
- *Talio* rannumani, dos ruidos cantado *sipos*
- *Corvus* corax, dos parejas con ruido cantado *sipos*
- *Alectoris* rufa un solo pareja
- *Hormenato* hispanice una pareja
- *Oriolus* oriolus cantando
- *Diobates* un mayor uno picando tronco
- *Picus* veidis cantando
- *Phoeniceus* nequevidis cantando
- *Silvius* caninus cantando
- *Troglodytes* celestis varios parejas
- *Carduelis* carduelis varios
- *Milvus* uiguent uno
- *Buteo* buteo uno
- *Buteo* unicolor varios
- *Atene nocturna* dos veces en camino

JAV

En el cantado primero se leen más que un ruido de *Neophon*, una vez de ellos de *Coracias* pinto...



- ▲ Nidos de guano
- △ " " Neophila.
- " " Bubo.
- " " F. perspicuus.
- † Col. de A. melba
- × Col. de B. superstis
- + Col. de chelidoni
- ⊗ " " Phymnura
- △ " " Colocus.
- 1 } cuevas con murciélagos
- 2 }
- 3 }

- I Cuerna del Barro
- II Peña Rubia
- III
- IV Peña Portillo.
- V
- VI
- VII = Picacho de la zorra
- VIII
- IX = Casoar
- X
- XI
- XII Peña Fierros

~~~~~ cortados  
 - - - - - cañon y arroyos

Otus sps.

Rhinolophus ferrugineus - Uno techo cueva colera  
 otro me dañé, cogido en la cueva junto al P. Portillo.

Rh. hipposiderus Uno en la cueva 3. Otro en la 1

Plecotus 2 juntos en la cueva 1. pegados en hueco techo. (ver dibujo).

O. f. sapidus muy común en las estrotonales del río.

M. fovea Excrementos (plumas) en cueva base cortado.

Rana vivip

B. veliparis 1 en el fondo junto al río

T. viperinus Cuyido cueva.

Psammobrycon No cisterna por no poder matar, pero cañi seguro uno piedras huerta.