

Bubo bubo hispanus.

- 18-X-47 - Palencia.() ♂ ? . Cont. est. - 1 conejo, quizá ardilla.
En Junio, en los pinares de Medina ???
- 1949 - Primeros de Octubre. Examinó tres ♀ y un ♂, muertos en Burgos, Tres habían comido conejo y otro liebre, que estaba comiendo. Dos de ellos mas abajo.(*)
- 10-XII-48 - (Burgos) Castillo del Val. Una ♀ con ovario muy poco desarro-
llado (no hay ni un óvulo grande).
Cont. est. -
- Algunos élitros de carábido.
Muerto en terreno algo montañoso, con una plana elevada de -
varios Km. cubierta de encinas formando chaparros altos y ais-
lados. Hay abundancia de perdiz, liebre y en estos meses sor-
das. El suelo es pedregoso. Situado a 14 km. y al N.E. de -
Burgos. Me comunica estos datos el Sr. Sain del Rio, secre-
tario de la S. de cazadores.
- 2-X-49 - (X) Poza de la Sal. ♀. Ala 400 mm. Cola 232. Enverg. 141.
long. T. 592 mm. Bien mudado. Mas claro que el anterior y
con las manchas peor definidas. Mandan con el fotos de nido
y habitat. Tomas Medina.
- 2-X-49 - Burgos. ♀. Cont. est. -
- conejo.
- 9-X-49 - Burgos. Un individuo. Cont. est. -
- conejo.
- 9-X-49 - Burgos. Cardeñuela. Riopico. Cont. est. -
- Liebre.
- 16-X-49 - Poza de la Sal. Una ♀. Cont. est. -
- Un Falco, con duda.
Ala no est. seca 423 mm. Bien mudado. Cola 240 mm.
- 14-XI-49 - Leon. Cazan uno vivo con linterna, en el cementerio. Era un
♂ muy oscuro, probablemente juv. Enverg. 1547 mm. long. t.
610 mm. Ala, 423 mm. Cola, 237 mm. Quizá escapado de cautivi-
dad, por la delgadez y poco emplumado de una pata.
- 4-I-50 - Palencia. Una ♀ muy grande y clara. Pico exageradamen-
te largo y curvo. Restos de pelo de conejo en las patas.
Long. T. 647. Enverg. 163-64. Ala, 940. Cola, 259.
- 2-X-50 - Burgos. ♂. Cont. est. -
- conejo
- 8-X-50 - Atapuerca. . (Burgos). Comiendo una liebre, una ♀ muy grande
y mal emplumada con plumaje del año pasado. Ala seca
- X-50 - Burgos. Le mandaron a casa. Un conejo
Burgos. Establecidos en Bujedo, Quintanilla sobre sierra.
Sarracín, Cardeñuela Riofrio.
Me dicen que anidan y se han matado cerca de Torquemada, a -
unos 10 kms. al N. Este es el punto mas sudeño conocido en
en la meseta septentrional.



Bubo
17-III-53

JAV