

1-42 - Sturnus vulgaris.

2-I-42 - Me traje el primero Arance, de un bandito.

Muy abundante durante el invierno, mezclado con S. unicolor.
Vienen en grandes bandos, Quizá sea S. vulgaris mas abundante en el valle que S. unicolor, ocurriendo lo contrario en el páramo.

20-X-47-Palencia. Cobran tres muy claros en bando mezclado con unicolor.

20-X-48 - Ya han venido.

8-X-49 - Un bando de 500, en Quintanilleja (Burgos), posados en cables, en el páramo.

10-X-49 - La Maruquesa. Un bando de 200 a 300, 7 cobrados en plena muda, con restos de plumaje, juv. a manchas.
A fines de Octubre, plumaje no muy bonito, aunque Tonono dice les hay preciosos en Burgos.


A mediados de Noviembre abundan, completamente mudados, pico o. oscuro.

16-XII-50- Ver C. frugilegus. Bando enorme, probablemente de esta especie, en Zaratan.

22-VIII-51 - Bandos ¿de esta sp.? en Simancas. (Ver nota).

Caprimulgus ruficollis ruficollis. Temm.

17. VII. 51. S. Pablo. 11' 10 h. of.
Cigarras de fin uid.
+ ordillos.



JAV

2

~~Banda de la dete.~~ ~~Forces~~ ~~Forces~~
con un aumento del conforamiento de los agnominos españoles.

En lo que cree preferible hacer un breve relato.

Indiferente, común.

Inmenso común, mas abundante que durante el verano.

Poco. Pocos de Marzo.

Desde finales de Mayo empezaron a pere familias en casa
que siguen.

A principios de Marzo se presentaban en pequeños bandos, parte de ellos
al menos en jaro, a fines del mes se estan empesados y buscando los lugares
de nidificación. Aparecen los primeros juvenes a fines de Mayo y de principios de
Junio. A mediados de Julio se ven ~~los~~ juvenes de la 2ª puesta, menos
abundante. ^{para decir}

A partir de fines de este mes empezaron a reunirse en grandes bandos
en las cañaverales. Disminuye todo el mes de Agosto y Septiembre se incrementa
el número de agnominos, que son numerosísimos en Octubre, mes de clara para
así el que se agupan a cientos en las deuidas. A partir de ^{fines} Noviembre
quedan ya únicamente los inmensoes