

Fringilla coelebs.

- 10-VI-42 - Se descubre nido en la otra orilla.
- 12-III-43 - Anote, cobrados varios y visto hasta el día 12.
- 18-IV-43 - Un nido con dos huevos en Las Moreras. Piscina.
- 17-X-43 - Hay bastantes.
- 4-IV-44 - Un nido acabado en la otra orilla.
- 19-22-III-46 - Carabanchel. Les estuve viendo mas abundantes (en el jardín) en en claro paso, anoté o.
- 8-II-48 - Varios bandos bastante numerosos en Tudela de Duero.
- 10-II-48 - Hay muchos en los alrededores.
- 19-II-48 - Un bando bastante grande a orillas del Pisuerga.
- 22-II-48 - Con tiempo de nieve. Hay bastante en Las Moreras. Parecen crias afectadas por el frio que ningún otro pájaro. Es el más abundante de los fringílidos ahora.
- 29-II-48 - Mezclados con S. canarius (en gran cantidad) y P. montanus en el mismo número que F. coelebs. Laguna de Duero. Un bando solo de pinzones.
- 4-III-48 - Bandos algo sueltos.
- 7-III-48 - A orillas del Pisuerga. Individuos sueltos y pequeños bandos. Ya no se le ve en la abundancia de antes.
- 10-IV-48 - Hay bastantes, mas de los que se quedan a criar. A fines de Abril ya no se ven.
- 6-V-48 - A orillas del Cega un nido, nº 5, a unos 2 ms. de altura, en una rama gruesa y horizontal de un almendro, conteniendo 5 - huevos con fetos bastante desarrollados. Estaba exteriormente enmascarado con liguenes.
- 5-VII-48 - A orillas del Pisuerga.
- 14-VII-48 - 2 crias de un ¿bando numeroso? a orillas del Pisuerga. Dias mas tarde, otros mas. Parece haber bastantes. Desde luego se ven mas que en todo el resto del verano. A primeros de Agosto se observa ya un gran incremento de población en paso sobre la sedentaria. Al parecer conservan todos el plumaje del año anterior.
- 18-VIII-48 - Hay muchos a orillas del Pisuerga. En Toro (Zamora) andan en bandos bastante numerosos, aun hay mas a fines del mes.
- 1-I-48 - A mediados de Enero, un bando a orillas del Pisuerga, mezclado con S. serinus y P. montanus, alcanzando varios centenares. Estaban en las tierras todos ellos, cerca de una linde escasamente arbolada. Formaban la base del bando, con los que creo hubiera también Emberizas sps.
- II-48 - Muy abundantes.

Fringilla coelebs

- 16-III-49 - Aún abundan invernantes, aunque no tanto como antes.
- 19-III-49 - Gran bando heterogeneo en la Fuente de la Teja.
- 22-III-49 - Un gran bando en Las Moreras, mezclado con P. montanus. En día de viento N. intenso.
- 1-IV-49 - Hay poquísimos. El bando del día 22 es el último que he visto.  
Un nido terminado en un almendro en flor. Seguro que de este año.  
Primeros de Abril. Veo alguno en la otra orilla reclamando, probablemente indígenas.  
El ciclo normal del verano. A primeros de Octubre, todavía no han llegado, (quizá unos pocos).  
Hay ya pinzones de paso o invernantes a primeros de Octubre, pero no en bandos.  
A primeros de Noviembre en grandes bandos.
- II-50 - No veo muchos a primeros de Febrero, aunque es probable que los haya.
- 19-II-50 - Hay muchos invernantes.
- 9-III-50 - En la orilla del rio cazan insectos desde ramas, muy desparnados y escasos. Veo mas oo, probablemente que se hayan ido muchos.
- 13-III-50 - Todavía hay invernantes a orillas del rio, se marchan por ahora. A primeros de Abril ya no se ven mas que parejas indígenas.
- 22-IV-50 - Adaja. En el pinar unos 25 quizá; todos separados. Ya se fueron los invernantes ¿crian allí?
- 23-IV-50 - Has La Fraila, no veo ninguno.
- 6-VI-50 - Medina. En el pinar, en tres dias se ve una media docena.
- 27-VIII-50- La Fraila. Algunos sueltos, errantes por el pinar.
- 12-X-50 - Ya hay muchos. El día 24 todavía no hay número completamente normal de invernantes.
- III-51 - Primeros de Marzo. Abundan todavía. No se nota disminución.
- 24-III-51 - Adaja. Muy comunes. En paso.  
A fines de Marzo ya no queda ningún invernante, pero sigue abundando en los pinares donde es el Fringílido mas común.  
Canta mucho ahora.
- 8-IV-51 - Siguen cantando.
- 15-V-51 - Laguna. No oigo ninguno hasta allí.
- VII-51 - Primeros de Julio. Un bando de unos 20 comiendo en los cardos.
- 18-VIII-51- La Fraila. Una familia con la ♀ que les llamaba, la única vista en este mes. Nidificante raro allí. Fue los día 18 y 19. Solo la ♀ con ellos, en pleno pinar, los juv. pían como gorriónes juvenes.

Fringilla coelebs.

-X-51 - A primeros de Octubre ya deben haber llegado algunos, pero no en cantidad. El día 14 todavía no veo.

La llegada en Octubre. El 14, en Monte Blanco, abundaba ya - mas que en verano, pero no con exceso. El día 21 en Valdesti- llas vi bandos grandes en tierras y viñas, de unos 60, y - otros sueltos por los pinares. Ya eran los pájaros mas comu- nes. El día 28, en Laguna les estuve viendo, creo que en paso activo, volando en grupitos algo dispersos y a poca altura, contra el viento, dirección de N. a S. como Fringilegus. Bandos 6-15 a lo mas en general. El día 31, en Monte Blanco y pinar, muy común disperso en encinar. Volando, alas con blanco muy visible, forma muy alargada y es- belta, grito de reclamo característico y en o pechuga rojiza.

15-XI-51 - Pinar Valdestillas (Nota).

-1952 - Probable desaparición parcial ya a fines de Febrero, 20-22 Laguna. Nota.

29-II-52 - Ya anotado que desde hace mas o menos 15 días comen sobre todo insectos cazados al vuelo. Hoy en el Habanero, semidispersos, por los almendros, cazando oo oo, quizá mas oo

23-III-52 - Laguna. Un bando en el pinar negral 20 (Nota) y otro en la ladera. Un ♂ canta, ayer otro en Valladolid. A fines mas toda vía, algo común, en banditos, cazando insectos. El día 25, en Laguna, vi poquitos pero no miré sitios preferidos.

14-IX-52 - ~~examinado 20 de este año, y me he dado cuenta de que ya están mudados y no más.~~

14-IX-52 - Un ♂ ad. muda, en estado final, terminado o avanzado. Al día siguiente una ♀ ya mudada (apenas algún cañón en la cabeza).

Observación general que nunca se me había ocurrido antes y

Los Muscicápidos mudan mucho antes que los Fringílidos en general. Pues en los emigrantes, la llegada de Fringílidos sera muy           

Ahora los Muscicápidos están todos mudados, y los Fringílidos ter- minando la muda; pero en Albarracín, los muscicápidos y páridos estaban en plena muda (Parus ater, Cettia) sus crias sin mudar. Regulus ignicapillus, Erithacus (uno empezando a cambiar librea juv.). A un sin mudar, o poco, Sylv. conspicillata, y Sylv. co- munnis, así como Phylloscopus. En cambio Emberiza hortulana, Emberiza cia, impecables aun.

en la Fraila. (Montemayor de Pililla).

Agosto en un extenso pinar de sibras y negrales, con alguna encina en Montemayor de Pililla. Desde 1944 no los hemos vuelto a ver. Hemos visto un individuo cobrando el 15 de agosto de 1949 en Villabrazguina.

~~Fringilla~~ Montifringilla nivalis L. ?

En febrero de 1944, después de una nevada bastante intensa vimos ~~tres~~ ~~algunos~~ en los ~~alpines~~ ~~de la carretera~~ ~~del cementerio~~, cobrando una pareja, desgraciadamente destruida por la polilla. Esta especie ha sido citada en Gibraltar y Madrid. <sup>Junto a la capital.</sup>

Passer domesticus

En los desiertos apartados, le sustituye Petronia petronia,

~~Passer~~ montanus.

~~Passer~~ hispaniolensis

Entre un bando de P. domesticus que dormía en un jardín de la población encontramos una ~~hembra~~ de esta especie el 20 de Enero.

Fringilla coelebs (L)

~~Escaso~~ como nidificante. Se establece en los sotos y riveras, arboladas y ~~se les ve~~ <sup>acido en las pinas.</sup> En Julio encontramos bandos formados principalmente por jóvenes que suponemos indígenas, establecidos principalmente en determinadas arboladas cercanas al Pisuerga.

A primeros de Agosto aumenta notablemente el número de pinzones, gracias a las aportaciones de migrantes que nos pareció llegaban al máximo en los últimos días del mes. Durante el invierno es el pajarero más frecuente en los campos en bandos de número muy variable que arrastren muchas veces distintas especies de Fringillidae. A mediados de Abril hay todavía bastantes invernantes, que desaparecen en el mes.