

Passer montanus,

- 1942 - Los nidos del Cabildo.
Uno con 4 huevos el dia 10 de Junio. Un huevo huero el dia 18 de Junio.
- 20-VI-43 - Ver Ooteca nº 24. Un nido, a unos 3 ms. de altura en el hueco de un olmo, a la orilla del rio, lugar muy concurrido. Estaba groseramente construido con pajas y plumas, con algodón de semillas de chopo, y era muy voluminoso, en proporción. Contenia 5 huevos muy frescos, en los que se apreciaba gran diferencia de coloración. Valladolid.
- 29-VI-43 - Un nido en un hueco de un olmo, a 3 ms. de altura. Formado por pajas, contenia 5 huevos frescos. Carretera de Laguna, Valladolid Ver Ooteca nº 27.
- 23-VII-43- Carretera de Laguna de Duero. A las 4 de la tarde, gran número de crias recién salidas, piando en las acacias a los lados de la carretera. Mezclados con P. domesticus.

A primeros de Mayo riñen mucho entre si.

Anidan en los agujeros de los troncos viejos, a veces varias parejas en un mismo tronco. Hemos cogido nidos en agujeros muy profundos (1 y medio metros), situados en un terraplen arenoso a orillas del Pisuegra, en un corte vertical a bastantes metros de altura sobre el agua. Allí mismo anidaba Otus scops y creo que Tyto alba a juzgar por las egagropilas.

En el valle es más abundante que P. domesticus, en las regiones de arbolado o matorrales. En otoño e invierno duerme en los matorrales y zarzas, a orillas de rios y carreteras, en grandes bandos. Les hemos visto en bandadas, durante el otoño, tirándose a dormir en los cañaverales (carrizos) de el canal de Castilla.

Nunca les he visto en lugares muy próximos a la población y jamás entre casas, aunque andan por las huertas a menudo.

Colección pieles.

- 6-V-47 - Valladolid, O. nº 24.
Cont. est. -
- orugitas verdes pequeñas, que cuelgan de los olmos. Ovíulos pequeños.
- 7-V-47 - Laguna de Duero (Valladolid). ♂ adulto. nº 26.
Cont. est. -
- sámaras de olmo.
- 2-VII-47- Valladolid. Individuo joven, recién suelto. nº 74
- 15-II-48 - Un par de bandos que no llegaban a la decena, en el pinar.
- 19-II-48 - En las matas de al lado de la carretera del pinar, un bando de unos 20 mezclados con P. domesticus y C. carduelis. Dos días mas tarde, con nieve, chillan tres o cuatro en Las Moreras.
- 29-II-48 - Laguna de Duero. Unos pocos individuos en un gran bando de S. canarius. También había algún F. coelebs.
- 28-V-48 - Hay crias grandes en los nidos.
- 27-VI-48 - Un nido con crias y un huevo. El día 19 de Agosto, las crias muy grandes. Salieron al meter la mano. Por la seguridad de su vuelo supongo habían volado anteriormente. Cogimos tres huevos en nido abandonado.

Passer montanus.

- 2-XI-48 - Duermen muchos en los olmos a orillas del Pisuerga, junto al Colegio Mayor.
- 12-XII-48- Laguna. Les llaman gorriones de campo. Mezclados con P. domesticus en bandos, en los huertos.
Hay en Burgos, al menos en Diciembre.
- I-49 - Mediados de Enero. Bandos mezclados con F. coelebs y S. serinus al menos, a orillas del Pisuerga (Ver F. coelebs).
Un en Laguna de Duero, de vientre muy blanco, parece mudado ya.
- 22-III-49 - En las Moreras, un bando de F. coelebs con algunos de esta especie.
A primeros o mediados de Abril se presentan en abundancia a lo largo de la carretera de Laguna, en grupitos. Son ahora allí el pájaro más abundante, donde haya sámaras de olmo. Probablemente han desecho los bandos invernantes y a ello es debida su ostensibilidad.
Hacia el día 20 de Abril, son abundantísimos en la carretera de Laguna.
- 21-V-49 - Bandos de crías y adultos en La Rubia.
- 18-VII-49 - Nidos con huevos (3) en olmos y chopos a orillas del río, Debe ser esto una segunda o tercera puesta. Hay crías grandonas.
- 30-VII-49 - Crías en nido emplumadas o recién salidas.
- 1950 - Fines de Enero y primeros de Febrero. Bandos pequeños en los Moreras, junto al árbol de Leoncio, reunidos con Fringilla coelebs.
- 19-II-50 - En pequeños grupos, de 7 ó 10, en Zaratan.
- 6-VI-50 - Medina. No hay en los pinares.
- 17-VI-50 - Encuentro uno ahogado (joven bien desarrollado, probablemente independizándose) en el río. Ver Coloeus en la misma fecha.
- 12-X-50 - Laguna. Grandes bandos, con P. domesticus en las borreras (Nota).
Burgos, anida en árboles y en colonias de Riparia (como aquí en el Cabildo). Anida en Suances. Julio. Tonono.
- 15-V-51 - Muy común por toda la carretera de la Laguna.
- 7-VI-51 - Una cría grande, con lazo, en la boca del nido en un olmo del soto.
Mediados de Junio. Nido con 4 huevos, en álamo junto al río, nido junto a Coracias. (Ver).
Anidan en Cortas de Blas.
- 28-X-51 - Laguna. Los veo en dos sitios, muy localizados, Huerta entre pinos, casita acequia del pinar, en bando de al menos 30, aunque no se si mas. Otro de mas de 100, (mezclado supongo con comunes, porque ascendian a 150 al menos) en las plantas amarillas de cerca de la charca crucíferas.
- 20-22-II-52 -Laguna. Notas. Grandes bandos no divididos aún.
Ver notas, Laguna, Diciembre y Enero.
- X
18-V-52 - Pinar, algunos anidan allí.

Passer montanus

- V-52 - Nido con huevos a punto de romper. Ooteca.
14-IX-52 - Dormida del sotillo, al atardecer. El dormitorio es un bosquecillo de olmos jóvenes, apretados, a orillas del río, finca chicos. Se posan sobre todo en los de cerca del arroyo. Hay otro dormitorio en los olmos (jóvenes y densos también) de la finca de al lado. Acuden también gorriones comunes. Cobrados hoy 10, montanus y 5 comunes. Algún detalle más, nota Sotillo 14-IX-52.

4 juvs. con el plumaje juvenil predominante, las diferencias con el plumaje ad. predominante en los otros 6, (creo son juvs. ya casi mudado.

Pico.

Pico.

No puede establecerse diferencia, en todos base amarillenta, y el resto de un color pardo-verdoso negrozuzco. Si los de librea de ad. fuesen de un año, - le tendrían negro ahora ?

Cabeza.

Sup. Pardo-verdoso pálido. En alguno una línea negruzca transversal en el extremo de cada pluma. La librea de ad. es -- muy diferente.

Manchas cabeza y cuello de un gris pálido y no negras, pero en uno alguno son más oscuras.

Dorso.

moteado desvaído y poco marcado. Infs. blanco sucio.

Muda.-

Cabeza. No ha empezado a mudar en ninguno de los 4.

Dorso. Pteril del manto con algún cañón, en uno predominan las plumas a medio crecer de librea ad. Pteril centro.

1ª - Ala primeras 7ª cañón, 8ª c-pluma, 3ª c-p. 10 c-p. 11 c-n. y los demás n. excepto las 5 primeras en V.

Cola

Pteriles, cañones en 1 y 2.

Passer montanus

14-IX-52 - Muda

- 2ª - Ala, primarias, las 7 primeras V. otras 4 en Cr. y las demás N. Cob. correspondiente.
Cola. En Cr. las dos 4ª
Pteriles C. en 3.
- 3ª - Ala, 1ªs, I-II-III-IV en V. V-VI-VII en Cr. Resto N. Cob. secund. en Cr. Pequeñas cob. casi todas nuevas.
Cola, Todas Cr. excepto 1ª 2ª y una 3ª. Cob. sup. e inf. en Cr.
- 4ª - Ala 1ªs, I+II-III-IV en V. V-VI-VII en Cr. Resto en N. Cob. secund. nuevas o en muda. Rem. secund. en V.
Cola, Cr. todas menos 1ª en V. Dorso, mucho plumaje nuevo.

En el ala cuento la 1ª primaria diminuta.

Juv. con librea de ad. predominante, terminada la muda.
En conjunto.

Ala, 1ªs. Mudan 2ª y 3ª y el más emplumado la 1ª. Secundarias. mudan unas 3 cada una, desde la 2ª a 4ª a la 4ª a 7ª.
Cob. grandes y chicas del ala todas las medidas. Ala bastante en cañones.

Cola, en Cr. 1ª, 2ª y 3ª en uno, en otro ya completa y las demás intermedio.

Dorso, conservan cañones, abdomen idem.

Cabeza, en uno completamente mudada, con solo algún cañón, los otros en plena muda conservando centro pileo, algunas plumas de juv.

Resumen,

Parece haber dos generaciones, una con librea ad. predominante, probablemente de la primera cria del año, y la 2ª, de la puesta última, apenas empezando a mudar. Sólo uno, puede considerarse intermedio.

Dividir la muda en los siguientes periodos.

Previo : Cuando apuntan cañones y empiezan a mudar las últimas primarias.

Medio: Cuando en el cuerpo se entremezclan ambos plumajes y no predominan uno sobre otro.

Avanzado: Predomina el plumaje nuevo, pero aún abundan cañones y la cola está en pleno crecimiento en parte.

Final: Apenas quedan cañones y solo crecen algunos 2ªs., 1ª primaria y quizá cola, y algo de cabeza.

Passer montanus. (Nude), # 14-IX-52.

Dormidos del solillo, al atardecer. El dormido es un borsucillo de
 algunos jóvenes, apretados, a orillas del río, pique chicos, se pican sobre todo en
 las de casa del arroyo. Hay otros dormidos en los álamos (jóvenes y adultos también)
 se se pican de al lado. También también piques comunes. Colados hoy. 10, montan-
 nes y 7 comunes. Algun detalles más, nota solillo 14-IX-52.

P. montanus.

JUV. 4. pies, con el plumaje juvenil predominante. las diferencias con el plumaje
 ad. predominante en los otros 6. ceros son pies ya casi mudados

Pico. No puede establecerse dif.; en todas bases amarillentas.

de un color pardo-verdoso negro. Si es de librea ad. fueren de un año, se tendrían negro
 ahora?



Calera. sup. Pardo-verdoso pálido. En algunos una línea negra transversal
 en el extremo de cada pluma. la librea de ad. es muy dif.

Muchas calera y cuello de un gris pálido y negro, pero en algunos son más oscu-
 ros.

Dorso. vistoso desmenuado y poco marcado. Inf. blanco sucio.

Muda. Calera. No ha empezado a mudar en ninguno de los 4.

Dorso. Pteril del manto con algún cañón, en uno predominan los plums
 a medio caer de librea ad. Pteril ~~ad.~~ centro

1^a ala. 7^a cañón, 8^a w-pluma.
 3^a e-p. 10 p-e 11 N.
 y los demás N; excepto los 6 tri-
 muros = V.

Cola
 Pteriles. cañones en 1, 2

2^a ala. pas los 3 primos V, otros
 4 en Cr. y los demás N; Col. amarillos
 cola, en Cr. las dos 4^a

Pteriles. C. en 3.

3^a ala. I-D-III-V. 2-III-III-Cr.
 mto. N. Col. igual de mud. en
 Cr. Pteriles col. casi todos me-
 vos.


Cola. todas Cr. excepto 1^a 2^a
 y una 3^a. Col. sup e inf p. Cr.

4^a ala. 10. I-II-III-V. V-II-III-Cr.
 Pteriles N. Col. ke. nuevos o en muda.

Res. Sec. av. Pe.

Cola. Cr. todos nuevos 1^a av.

Dorso, mltos plumaje nuevo,



Res. Sec. av. Pe.

En muda me hablo de...
 La ala, mto de 1^a primaria disminuida.
 e-p = cañón pluma. Cr. = crecimiento. N = nuevo. V = viejo

JAV

~~En~~ juv. con libros de ad. predominante, terminado muda.

En conjunto.

Ala. 1^{ra}, Nudo 2^o, 3^o y el más esplendido la 1^{ra}. Secundario, Nudo más
3 uds una desde la 2^a a 4^a a la 4^a a 7^a. Col. grandes y chicos del
de todos mudidos. Ala bastante en cantos.

Cola. En Cr. 1, 2^o y 3^o en uso, su otro ya completa y los deus intermedio.

Dorso. Conservan cantos. Abdomen idem.

Calera, en uso completamente mudada, con solo algún cantos otros en plena muda,
conservando centro pileo, algunos plums de juv.

Resumen.

Puede haber dos generaciones, una con libros ad. predominante,
juv. de la primera era del año, y la 2^a de las puesta últimas, apenas empezando
a mudar. Solo una, ~~esta~~ puede considerarse intermedio.

En Pajar domesticos. ~~reunión~~ 2^o del año, que con terminación de muda
y una ♀, aún no mudada.

Dividir la muda en los siguientes periodos.

Previo - Previo: cuando apuntan cantos y empieza a mudar los últimos plumos.

~~Previo~~ cuando en el cuerpo se entre mezclan algunos plumos y no predominan

Medio - Medio: cuando uno silva otro.

Avanzado - Avanzado. Predomina el plumaje ~~esto~~ nuevo, pero aún abundan cantos y la
cola está en plena mudamiento en parte.

Final. Apenas quedan cantos y solo crecen algunos 2^o, 1^o y 3^o y
y quita cola, y de la calera

Fringilla caelebs

Reunión. Una ♂ ad. muda en estado final, mudado e cuando
al día siguiente una ♀ ya mudada (apenas algún cantos calera).

Observación general que nunca se me había ocurrido antes; animal de mi

los Muscicapidos mudan mucho antes que los Fringilidos en general. Dado que
en las mismas partes, la llegada de Fringilidos sus muy posteris.

Ahora los Muscicapidos están todos mudados, y los Fringilidos termi-
nando la muda; pero en calera, los Muscicapidos y juv están
en plena muda (Pous ater, ^{littus} sus sus sin mudar) Regulus uiricapillus, Anthra-
cus (esto una empezando a cambiar libros juv.) aún sin mudar. o Pous, Sylv. caespitilla
y Sylv. communis, o unus ph.]. En caulio = ub. otulana, = cia, infecables
aún.